

环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第37卷 第2期

Vol.37 No.2

2016

中国科学院生态环境研究中心 主办
科学出版社 出版



目次

编者按 (403)

我国化学品的风险评价及风险管理 王铁宇,周云桥,李奇锋,吕永龙 (404)

土地利用回归模型在大气污染时空分异研究中的应用 吴健生,谢舞丹,李嘉诚 (413)

中国2000~2010年生态足迹变化特征及影响因素 黄宝荣,崔书红,李颖明 (420)

关中地区冬季PM_{2.5}中碳气溶胶的污染特征及来源解析 田鹏山,曹军骥,韩永明,张宁宁,张蓉,刘随心 (427)

利用SPAMS研究南宁市冬季单颗粒气溶胶化学成分 刘慧琳,宋红军,陈志明,黄炯丽,杨俊超,毛敬英,李宏姣,梁桂云,莫招育 (434)

南京夏季市区VOCs特征及O₃生成潜势的相关性分析 杨笑笑,汤莉莉,张运江,母应峰,王鸣,陈文泰,周宏仓,花艳,江蓉馨 (443)

北京城区气传花粉季节特征及与气象条件关系 孟龄,王效科,欧阳志云,任玉芬,王巧环 (452)

重庆垃圾焚烧厂汞的分布特征与大气汞排放因子研究 段振亚,苏海涛,王凤阳,张磊,王书肖,余斌 (459)

三峡库区腹地大气微量金属干湿沉降特征 张六一,刘源,乔保清,付川,王欢博,黄怡民,杨复沫 (466)

长沙近地面水汽中稳定同位素的监测与分析 谢宇龙,章新平,姚天次,黄煌 (475)

青藏高原内陆典型冰川区“冰川-径流”汞传输过程 孙学军,王康,郭军明,康世昌,张国帅,黄杰,丛志远,张强弓 (482)

西藏湖泊沉积物重金属元素特征及生态风险评估 郭泌汐,刘勇勤,张凡,侯居峙,张宏波 (490)

坦噶尼喀湖东北部入湖河流沉积物重金属分布特征与生态风险评价 余成,陈爽,张路 (499)

近百年来新疆博斯腾湖多环芳烃的组成及变化特征 沈贝贝,吴敬禄,赵中华,曾海鳌,金苗 (507)

舟山青浜岛不同环境介质中PAHs的分布特征 郑煌,邢新丽,顾延生,桂福坤,祁士华,黄煊芳 (513)

模拟排水沟渠非点源溶质氮迁移实验研究 李强坤,宋常吉,胡亚伟,彭聪,马强,姜正曦,琚艺萌 (520)

中田河流域景观异质性对水体总氮浓度影响研究 王晶萍,李兆富,刘红玉,王刚,辛强 (527)

江西香溪流域干湿季交替下底泥氮释放机制及其对流域氮输出的贡献 韩宁,郝卓,徐亚娟,高扬,于贵瑞 (534)

巢湖水体氮磷营养盐时空分布特征 奚姗姗,周春财,刘桂建,吴蕾,王培华 (542)

合肥城郊典型农田溪流生态系统沉积物磷形态及释放风险分析 裴婷婷,李如忠,高苏蒂,罗月颖 (548)

桑沟湾表层沉积物性质及对磷的吸附特征 朱佳美,曹晓燕,刘素美,王丽莎,杨桂朋,葛成凤,路敏 (558)

苏州市古城区降雨径流颗粒物粒径分布及污染物赋存形态 李淮,吴玮,田永静,黄天寅 (565)

洪泽湖有毒和无毒微囊藻丰度及其与环境因子之间的相关分析 李大命,张彤晴,唐晟凯,段翠兰,杨俊虎,穆欢,刘小维 (573)

三峡库区消落带水体CDOM中电荷转移配合物对其紫外-可见吸收光谱的影响 江韬,梁俭,张慕雪,王定勇,魏世强,卢松 (580)

pH对高锰酸钾氧化降解苯胺类化合物动力学的影响 王辉,孙波,关小红 (588)

EDTA对Pd/Fe体系还原脱氯2,4-D的影响 周红艺,聂亚中,陈勇,雷双健 (595)

镍铝层状氧化物薄膜电极的制备及其除盐性能 王婷,朱春山,胡承志 (602)

微生物对砷的氧化还原竞争 杨婷婷,柏耀辉,梁金松,霍咏,王明星,袁林江 (609)

处理水产养殖污水潜流湿地中的厌氧氨氧化菌群特征 曾宪磊,刘兴国,吴宗凡,时旭,陆诗敏 (615)

污水回用中主要病原菌解析及其紫外消毒效应 景明,王磊 (622)

异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 强化连续流反应器中微生物群落结构解析 邵基伦,曹刚,李紫惠,黄郑郑,罗恺,莫渊辉 (630)

基于新一代测序技术的A²O与BIOLAK活性污泥宏基因组比较分析 田美,刘汉湖,申欣 (638)

1株海洋异养硝化-好氧反硝化菌的分离鉴定及其脱氮特性 孙庆花,于德爽,张培玉,林学政,李津 (647)

纳米Ni/Fe用于去除染料生产废水二级生物处理出水中AOX和色度的研究 舒小铭,徐灿灿,刘锐,赵远,陈吕军 (655)

3BER-S工艺用于再生水深度脱氮同步去除PAEs的可行性 徐鹏程,郝瑞霞,张娅,王冬月,钟丽燕,徐浩丹 (662)

合成时间对钛酸盐纳米材料的影响及其吸附水中铅的性能研究 范功端,陈丽茹,林茹晶,林茜,苏昭越,林修咏 (668)

芦苇秸秆生物炭对水中菲和1,1-二氯乙烯的吸附特性 吴晴雯,孟梁,张志豪,罗启仕,杨洁 (680)

芦苇基和污泥基生物炭对水体中诺氟沙星的吸附性能 张涵瑜,王兆炜,高俊红,朱俊民,谢超然,谢晓芸 (689)

季节性温度升高对落干期消落带土壤氮矿化影响 林俊杰,张帅,刘丹,周斌,肖晓君,马慧燕,于志国 (697)

增温及秸秆施用对冬小麦田土壤呼吸和酶活性的影响 陈书涛,桑琳,张旭,胡正华 (703)

基于GIS的银川市不同功能区土壤重金属污染评价及分布特征 王幼奇,白一茹,王建宇 (710)

不同产地硅藻土原位控制土壤镉污染差异效应与机制 朱健,王平,林艳,雷明婧,陈仰 (717)

紫色土对邻苯二甲酸二甲酯的淋溶吸持特征及影响因素 王强,宋娇艳,曾微,王法 (726)

几种修复措施对Cd淋失及土壤剖面运移影响 刘孝利,曾昭霞,铁柏清,陈求稳,魏祥东 (734)

河北邯郸钢铁冶炼区周边麦田土和小麦籽粒的多环芳烃含量及其组分谱特征 吴迪,汪宜龙,刘伟健,陈源琛,付晓芳,陶澍,刘文新 (740)

湿生环境中丛枝菌根(AM)对香蒲耐Cd胁迫的影响 罗鹏程,李航,王曙光 (750)

溴酸盐对水生生物的急性毒性效应 王执伟,刘冬梅,张文娟,崔福义 (756)

自组装哑铃状Fe₃O₄微/纳米材料对十溴联苯的热催化降解 黄鑫辰,宗刚,刘焯焯,芦会杰,李倩倩,李宾克,赵彦辉,苏贵金 (765)

盐度对准好氧矿化垃圾生物反应器渗滤液处理及N₂O产生的影响 李卫华,孙英杰,刘子梁,马强,杨强 (775)

污泥直接干化尾气中恶臭污染物重要性评价:以指标权重评分法为例 丁文杰,陈文和,邓明佳,罗辉,李琳,刘俊新 (782)

《环境科学》征订启事(557) 《环境科学》征稿简则(594) 信息(419,442,781)

异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 强化连续流反应器中微生物群落结构解析

邵基伦¹, 曹刚^{1,2*}, 李紫惠¹, 黄郑郑¹, 罗恺¹, 莫测辉^{1,2}

(1. 暨南大学环境学院, 广州 510630; 2. 广东省污染控制与修复材料工程技术中心, 广州 510630)

摘要: 为揭示生物脱氮反应器中微生物群落结构随时间变化的动态演替过程, 以投加包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 建立的连续流反应器为研究对象, 利用 PCR-DGGE 技术获得了不同阶段下微生物群落结构的 DNA 特征图谱并对图谱进行了多元统计分析, 同时考察了微生物群落结构的变化与反应器中 pH、 NH_4^+ -N、 NO_2^- -N、 NO_3^- -N 及 COD 等环境因子的相关性. 结果表明, 反应器在 18 d 的运行期间微生物群落较为丰富, 各阶段群落结构的相似性并不随着反应器的运行而有序递减, 相邻阶段群落结构的相似性先下降后上升, 反应器内的菌群经演替最终形成了稳定的菌群结构. Shannon-Wiener 多样性指数变化与反应器的运行显著关联, 不同阶段多样性指数差异明显, 整体上呈先下降后上升的趋势, 运行后期出现了新的菌群. UPGMA 聚类分析大致将反应器的运行过程划分为 3 个时期, 且不同时期存在一定的演变关系. 对 DGGE 图谱进行主成分分析 (principal component analysis, PCA) 表明, 随着反应器的运行, 劣势菌被大量淘汰、优势菌株常驻, 运行后期形成以包埋菌 *Burkholderia* sp. YX02 为代表的新的菌群结构. 对微生物的群落结构与环境因子的相关性进行典范对应分析 (canonical correspondence analysis, CCA) 表明, NO_2^- -N 对微生物群落结构的影响最大, 其次为 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N 和 COD, pH 影响最小.

关键词: 包埋固定化; 异养硝化-好氧反硝化; 连续流反应器; PCR-DGGE; 微生物群落结构; 环境相关性

中图分类号: X172 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2016)02-0630-08 DOI: 10.13227/j.hjxx.2016.02.031

Analysis of the Microbial Community Structure in Continuous Flow Reactor Enhanced by Heterotrophic Nitrification and Aerobic Denitrification Bacterium *Burkholderia* sp. YX02

SHAO Ji-lun¹, CAO Gang^{1,2*}, LI Zi-hui¹, HUANG Zheng-zheng¹, LUO Kai¹, MO Ce-hui^{1,2}

(1. School of Environment, Jinan University, Guangzhou 510630, China; 2. Guangdong Engineering Center for Environment Contamination Control and Restorative Materials, Guangzhou 510630, China)

Abstract: To reveal the dynamic succession of microbial community structure along with time in bio-denitrification reactor, a continuous flow reactor containing immobilized heterotrophic nitrification-aerobic denitrification bacterium *Burkholderia* sp. YX02 was taken as a model. The microbial community structure in the bioreactor was analyzed by PCR-DGGE, and its correlations with environmental factors such as pH, NH_4^+ -N, NO_2^- -N, NO_3^- -N and COD were simultaneously investigated. The results showed that the microbial community was relatively rich during the early stage of 18 days. The similarity of community structure in different stages was not orderly declining with the operation. In addition, the structural similarity in adjacent stages firstly increased, then decreased, and eventually tended to be stable. Shannon-Wiener index firstly descended significantly, and then ascended with new microbial community emerging at the later stage. UPGMA clustering analysis roughly divided the process into three periods with certain relationship. Principal component analysis showed that during the operation of the bioreactor predominant bacterial community formed steadily and new microbial community dominated by *Burkholderia* sp. YX02 emerged at the later stage of the operation. Canonical correspondence analysis certificated that the structure of microbial community was most obviously affected by NO_2^- -N, followed by NO_3^- -N, NH_4^+ -N and COD, and pH had the least effect.

Key words: embedded and immobilized; heterotrophic nitrification and aerobic denitrification; continuous flow reactor; PCR-DGGE; microbial community structure; environmental correlation

近些年来, 高效去除水体氮素是当前的研究热点^[1]. 与传统生物脱氮技术相比, 异养硝化-好氧反硝化脱氮技术可同步去除氨氮和 COD, 有效缩短了反应途径, 且脱氮效率更高、反应速率更快, 因而受到更多的关注. 异养硝化-好氧反硝化菌强化系统脱氮效果较好, 在强化过程中系统运行状况决定处理效果的高低及出水水质的好坏, 而系统内微生物的

群落结构和多样性可在一定程度上反映系统的运行状况^[2,3]. 同时, 环境因子如温度、pH 和进水成分等会影响系统微生物群落结构的变化, 对处理效果影

收稿日期: 2015-07-10; 修订日期: 2015-10-13

基金项目: 广东省科技计划项目(2011B030800009)

作者简介: 邵基伦(1990~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为污水生物脱氮理论与技术, E-mail: 1063271368@qq.com

* 通讯联系人, E-mail: cao_g@163.com

响十分明显^[4-6]. 因此, 研究系统中微生物群落结构的演替过程及其与环境因子的关系, 对于阐明系统内微生物群落结构的组成及提高系统处理效率和稳定运行具有重要的现实意义.

近年来分子生物学发展迅速, 尤其是基于 16S rDNA 的分子生物学方法能有效克服传统微生物分离培养技术的局限, 为研究微生物群落结构提供了一个极其重要的手段^[7-11]. 国内外学者利用该技术对复杂环境中的微生物群落结构进行研究均取得了一定的成果^[12-14]. 然而, 目前以异养硝化-好氧反硝化菌为对象, 研究其群落结构的演替过程及其与环境因子之间的关系鲜见报道, 对反应器内异养硝化-好氧反硝化菌群结构动态变化的研究则更少. 因此, 本研究将前期实验制备所得的包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 投加到连续流反应器中建立生物强化系统, 利用 PCR-DGGE 技术分析不同阶段下反应器中微生物的群落结构及其动态演替过程, 并对不同阶段微生物结构进行聚类分析和主成分分析以及环境因子与群落结构的相关性分析, 以阐明微生物群落的演替与反应器运行状况的动态联系. 这对优化反应器运行及提高处理效果具有重要意义, 同时能更好地指导实际应用, 以为废水生物脱氮强化处理提供参考.

1 材料与方法


1.1 实验材料

包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 为前期实验制备所得^[15]. 包

埋球粒径约 3~4 mm, 同时球粒的硬度和机械强度也较高, 符合实验要求.

1.2 实验装置与运行

实验装置如图 1 所示, 直径为 8 cm、高为 40 cm、有效容积为 1.5 L, 采用向上流连续进水, 气水同向运行. 通过实验已确定其最佳运行条件: 进水 C/N 为 10、pH 为 7.0 左右、温度为 25℃ 左右、进气量为 4.5 L·min⁻¹、进水流量为 0.5 L·d⁻¹. 接种污泥取自广州市大坦沙污水处理厂好氧池, 投加量约为 0.5 L, 包埋固定化 *Burkholderia* sp. YX02 菌投加量为 80 g·L⁻¹. 启动时, 将包埋菌 *Burkholderia* sp. YX02 与污泥混匀后一并投加于反应器. 实验采用人工合成进水, 水质组分见表 1.



1. 进水槽; 2. 蠕动泵; 3. 流量计; 4. 气泵;
5. 反应器; 6. 排泥口; 7. 恒温棒; 8. 出水槽

图 1 实验装置示意

Fig. 1 Schematic diagram of experimental set-up

表 1 人工合成进水水质

Table 1 Characteristics of the artificially synthesized water fed to activated sludge reactor

进水项目	pH	NH ₄ ⁺ -N /mg·L ⁻¹	NO ₂ ⁻ -N /mg·L ⁻¹	NO ₃ ⁻ -N /mg·L ⁻¹	TP /mg·L ⁻¹	COD /mg·L ⁻¹
范围	7.0	90~100	50~60	50~60	10~20	900~1000

1.3 样品取样时间

反应器保持连续运行, 且每隔两天取污泥样品用于细菌 DNA 的提取, 期间共取样品 9 份, 分别记为 S1~S9. 相应地采集反应器出水, 并测定 pH、NH₄⁺-N、NO₂⁻-N、NO₃⁻-N 和 COD 的值.

1.4 细菌基因组 DNA 的提取

取 25 mL 活性污泥加入到 100 mL 锥形瓶中, 120 r·min⁻¹ 下振荡 10 min 以使污泥被打散均匀. 取污泥 10 mL 于 15 mL 的离心管内, 8 000 r·min⁻¹ 下

离心 10 min, 弃去上清液, 收集沉淀污泥. 重复上述操作一次, 取 5 mL 污泥进行细菌总 DNA 提取. 具体提取步骤参考文献^[16, 17]提出的方法, 所用试剂盒购自上海生工. 将提取的细菌总 DNA 一部分于 -20℃ 保存, 另一部分在 0.7% 的琼脂糖凝胶中做电泳检测, 并将电泳条带进行扫描拍照.

1.5 PCR-DGGE

PCR 引物的选择采用对大多数细菌和古细菌 16S rDNA 基因 V3 区具有特异性的引物对^[18], 即

F357-GC 和 R518. PCR 反应体系和反应条件参照陈谊等^[19]提出的方法确定. 建立 50 μL PCR 反应体系: 1.5 μL dNTP (25 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$), 1.5 μL 引物 F357-GC, 1.5 μL 引物 R518, 2.5 μL *Taq* 酶, 5 μL 10 \times buffer (含 Mg^{2+}), 1 μL DNA 模板, 37 μL ddH_2O . PCR 反应条件: 94 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 5 min. 进行前 20 个循环: 94 $^{\circ}\text{C}$, 1 min; 65~55 $^{\circ}\text{C}$, 1 min; 72 $^{\circ}\text{C}$, 1 min (其中每个循环后退火温度下降 0.5 $^{\circ}\text{C}$). 其次进行后 10 个循环: 94 $^{\circ}\text{C}$, 1 min; 55 $^{\circ}\text{C}$, 1 min; 72 $^{\circ}\text{C}$, 1 min. 最后 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 8 min. PCR 产物用 1.5% 琼脂糖凝胶电泳检测, 并将电泳条带扫描拍照.

采用变性梯度凝胶电泳 (DGGE) 系统对总细菌 PCR 产物进行电泳分离. 选用的聚丙烯酰胺凝胶浓度 (丙烯酰胺: 双丙烯酰胺为 37.5:1) 为 10%, 变性梯度为 40%~60% (其中 100% 的变性剂为 7 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的尿素和 40% 的去离子甲酰胺的混合物). 首先制备 DGGE 凝胶, 待胶完全凝固后, 将胶板放入装有电泳缓冲液的电泳槽. 其次, 取 20 μL 左右的 PCR 产物与 5 μL 左右的 10 \times buffer 混合均匀后进行上样, 在每个加样孔加入含有 10% 的加样缓冲液的 PCR 样品 25 μL . 最后于 60 $^{\circ}\text{C}$ 、150 V 下, 电泳 6 h. 电泳完毕后, 将凝胶进行 SYBR Green I 避光染色 30 min 左右并用超纯水润洗, 其后将胶放入凝胶成像系统中拍照观察.

1.6 DGGE 图谱分析

利用 Quantity One 7.0 软件对 DGGE 图谱条带进行量化. 采用 Shannon-wiener 指数 (H) 评价不同阶段下连续流反应器中微生物群落的多样性. Shannon-wiener 指数可用于反映群落种类的多样性, 即群落种类越多, Shannon-Wiener 指数值愈大, 表示群落所含信息量就愈多. 将图谱中包含的信息以二进制格式输出, 利用 Bio-dap 软件计算 Shannon-

Wiener 多样性指数. Shannon-Wiener 指数的计算公式参考文献[20]提出的方法. 具体如下:

$$H = - \sum P_i \lg P_i$$

H 的计算是基于电泳条带的位置和强度, 而条带的峰面积可表示条带的强度. 式中 $P_i = n_i/N$, 其中, n_i 为峰面积, N 为所有峰的总面积.

用 SPSS 21.0 对 DGGE 图谱进行聚类分析和主成分分析, 以了解不同阶段下反应器中微生物的群落结构及其相似性.

1.7 微生物群落结构与环境因子的相关性分析

典范对应分析 (CCA) 又称多元直接梯度分析, 是基于对应分析发展而来的一种排序方法^[21]. 将 DGGE 图谱中条带出现的地方标记为 1, 未出现的地方标记为 0, 对微生物群落结构与 COD、pH、 NH_4^+-N 、 NO_2^--N 和 NO_3^--N 等环境因子的相关性进行典范对应分析. 分析结果要借助国际通用软件 Canoco 4.5 进行排序. 此外, 在分析过程中需对所有环境因子进行标准化处理^[22].

2 结果与讨论

2.1 反应器的运行

图 2 为反应器连续运行过程中各项出水指标的去除效果. 从中可知, 随着反应器的运行, COD、 NH_4^+-N 、 NO_2^--N 和 NO_3^--N 的去除率不断降低, 18 d 后各指标的去除率分别为 98.1%、96.4%、92.0% 和 93.2%. 其中 6~14 d 范围内各指标的去除速率均最快, 分别达到 67.3、6.4、2.5 和 1.9 $\text{mg}\cdot(\text{L}\cdot\text{d})^{-1}$. 之后各指标的去除率均维持稳定. 期间 pH 在 7.1~7.3 范围内波动, 整体上呈微碱性, 这可能与体系微生物代谢活动的硝化反硝化作用密切相关^[23]. 总体来说, 经过 18 d 的运行反应器维持了较为稳定的去除效果. 因此, 选取前 18 d 运行




图 2 运行期间各出水指标的变化

Fig. 2 Change in indexes of outflow water during the operation

周期内系统状态作为研究反应器从启动到稳定运行阶段系统内微生物群落结构的动态演替过程是适合的。

2.2 DGGE 指纹图谱分析

采用试剂盒提取样品总 DNA, 经琼脂糖凝胶电泳检测后各样品总 DNA 的纯度和亮度较好, 大小在 23 kb 左右, 适合于下一步的 PCR。采用细菌通用引物 F357-GC、R518 对菌株 16S rDNA V3 区进行 PCR 扩增, 将一部分扩增后的产物进行 2.0% 的琼脂糖凝胶电泳检测。通过对比, 其分子量大小约在 240 bp 左右, 确为扩增的目的条带。将另一部分扩增后的产物进行 DGGE 分析, 结果如图 3 所示。




图 3 污泥样品 PCR 产物变性梯度凝胶电泳
Fig. 3 DGGE profile of different PCR samples

图 3 给出了反应器连续运行 18 d 期间污泥样品的微生物群落结构。整个过程中微生物群落较为丰富, 不同阶段之间微生物群落结构存在一定的差异性。其中 S1 有 30 条带、S2 有 37 条带、S3 有 35 条带, 条带的数量波动不大, 说明反应器运行的初期并没有立即造成群落多样性急剧降低。S4 有 28 条带、S5 有 18 条带、S6 有 36 条带, 条带的数量波动较大, 表明体系内菌群发生了剧烈的竞争、群落演替迅速, 不适应环境的劣势菌群被大量淘汰, 优势菌群开始出现并生长。S7 有 21 条带、S8 有 23 条带、S9 有 32 条带, 群落多样性有所回升, 说明随着反应器的运行, 体系内形成了新的菌群结构。此外, 条带 a、d、e、k、l 随着反应器的运行, 逐渐沦为劣势种群。条带 c、f、i、j 出现在后期, 为后续出现的新菌属。条带 b、g 和 h 几乎始终存在于反应器中并在后

期有所加强, 所代表的是系统的优势菌群, 这些菌株适应环境的能力较强, 对反应器的稳定运行至关重要, 筛选出这类优势菌对于加快反应器的启动、提高反应器的容积负荷和处理效果均具有重要意义。其他条带变化没规律, 对系统的稳定运行影响不大。这说明反应器的处理效果及稳定运行很大程度上与系统内微生物群落结构变化及演替过程有关。

图 4 显示了以 S1 作为标准时各样品的 DGGE 图谱相似性分布。从中可知, 各样品的相似性并不随着反应器的运行而呈比较有序的递减, 微生物群落结构在运行期间经历了较大的变化。S6、S7、S8、S9 与 S1 相比, 差别较大, 相似性分别只有 37.1%、31.2%、39.4% 和 41.9%, 说明随着反应器的运行, 微生物群落结构发生了较大的变化, 这可能与反应器运行环境和条件的变化有一定联系。




图 4 污泥样品总细菌电泳条带相似性比较

Fig. 4 Similarity diagram of electrophoresis bands of total bacteria in different samples

表 2 给出了各阶段下污泥样品间菌群的相似性系数。从中可知, S1-S2、S2-S3 至 S8-S9, 相邻阶段彼此间的相似性系数呈先上升后下降再上升的趋势。反应器启动时, 体系内菌群结构因外界环境的冲击而受到一定的影响, S1-S2 相似性仅为 49.9%。随着反应器的运行, S2-S3 相似性升高到 62.5%, 之后 S3-S4 相似性降低, 其后继续下降, S5-S6 相似性则降到最低, 这可能是由于体系内菌群间的竞争作用, 导致群落结构发生了剧烈的变化, 劣势菌被大量淘汰, 相邻阶段相似性出现急剧下降。运行后期相邻阶段相似性有所回升, S7-S8

和 S8-S9 相似性分别恢复到 49.4% 和 56.8%, 说明反应器经过 18 d 的运行, 微生物群落结构趋于稳定, 接入的包埋菌可能适应了该体系并成为常驻优势菌. 这也表明不同运行阶段下体系内微生

物群落结构变化较大, 污泥内菌群更替剧烈, 劣势菌被大量淘汰. 总的来说, DGGE 图谱的相似性分布比较好地反映了微生物群落结构随反应器运行的变化关系.

表 2 各阶段污泥样品间菌群结构的相似性系数/%

Table 2 Similarity coefficient of profiles of the bacterial community structure in different stages/%

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
S1	100	49.9	33.5	32.6	39.9	37.1	31.2	39.4	41.9
S2	49.9	100	62.5	36.8	29.5	38.8	33.1	51.4	49.2
S3		62.5	100	46.3	33.8	34.3	33.7	44.9	48.1
S4			46.3	100	40.7	33.1	27	40.1	43.2
S5				40.7	100	29.4	35.7	35.2	35.9
S6					29.4	100	41.4	31.6	36.8
S7						41.4	100	49.4	44.7
S8							49.4	100	56.8
S9								56.8	100

2.3 微生物群落结构的多样性分析

通过 Quantity One 软件对 DGGE 图谱中条带的强度进行分析, 再根据 Shannon-Wiener 多样性指数计算公式可得到总细菌的 Shannon-Wiener 多样性指数, 结果见图 5. 从中可知, 在反应器的整个运行过程中, Shannon-Wiener 指数的变化与反应器的运行有很大的关联, 各阶段样品间多样性指数差异显著. 整体上呈先下降后上升的趋势, 反应器初始运行阶段, 包埋菌在运行过程中要主动适应外界环境和营养条件, 此时群落结构并未开始发生明显的变化, 细菌群落多样性指数较高, S2 最高可达到 3.55. 随着反应器的继续运行, 菌株要不断融入新环境, 彼此间的竞争加剧, 多样性不断降低, 群落结构发生根本性的变化, 劣势菌大量死亡, 包埋菌开始增殖. 运行后期多样性呈上升的趋势, 可能是由于体系中出现了




图 5 各样品细菌的 Shannon-Wiener 多样性指数

Fig. 5 Shannon-Wiener index of the bacteria in different sludge samples

其它新的菌属, 也可能是包埋菌已适应外部环境并成为优势菌, 体系内形成了新的菌群结构, 多样性指数得到恢复. 这表明不同运行阶段对微生物群落多样性有较大的影响, 但微生物群落能通过自我调整来适应环境的变化.

2.4 微生物群落结构的聚类分析

不同统计学分析模型有时会导致得到的结果不一致. 因此, 选择合适的统计学方法是能否正确分析问题的关键^[24]. 对不同阶段下污泥样品进行聚类分析能较好地反映微生物群落结构的变化与反应器运行的联系.

由图 6 可知, 通过 UPGMA 聚类分析可将 DGGE 图谱分为 3 类独立的群, 其中 S7、S8 和 S9 为第一族群, S1 和 S2 为第二族群, S3、S4、S5 和 S6 为第三族群. 这大致可将反应器的运行过程划分为 3 个时期, 即初始期、竞争期和后期. 说明随着反应器的运行, 体系内的群落结构呈现有序的演替, 这与张斌等的研究结论^[25]相似. S1 和 S2 作为运行初期, 所




图 6 总细菌 DGGE 图谱的 UPGMA 聚类分析

Fig. 6 Cluster analysis of bacterial DGGE by UPGMA

含条带数较为接近,且菌群结构与其它时期有较大的区别,所以独立为一族. S3、S4、S5 和 S6 单独作为一族,此阶段体系内菌群竞争加剧,使得演替过程最为激烈,菌群结构发生了根本性的变化. 而 S7、S8 和 S9 聚为一个族,处于运行后期,彼此间的相似性较高. 此外,初始期和竞争期均处于不稳定运行阶段,与运行后期的相似性仅为 0.37,说明不同运行阶段存在一定的演变关系,微生物群落经演替最终会形成稳定的菌群结构.

2.5 不同阶段微生物群落结构的主成分分析

将 DGGE 图谱标准化后作主成分分析,主成分分析能反映微生物群落结构和功能的多样性变化^[26,27]. 经分析(见表 3),共提取出 3 个主成分,其所占的贡献率为 83.1%,基本上能把不同阶段下的污泥样品中微生物群落结构区分开来. 其中, S9 与主成分一呈高度的正相关, S1、S5 和 S7 与主成分二呈高度的正相关, S2、S3、S4、S6 和 S8 与主成分三呈高度的正相关.

表 3 不同阶段微生物群落结构的主成分得分

Table 3 Principal component scores of microbial community structure in different stages

样品	主成分		
	第一主成分	第二主成分	第三主成分
S1	-1.10	1.15	0.81
S2	-0.36	0.18	-1.30
S3	-0.15	-0.06	-1.11
S4	-0.70	0.72	1.51
S5	0.15	-2.12	1.14
S6	-0.39	0.23	-0.65
S7	0.08	-0.78	-0.25
S8	0.04	-0.25	-0.56
S9	2.44	0.95	0.39

图 7 显示了每个条带在主成分上的因子载荷,条带(a、c、e、f、i、j)在主成分一上的得分较高,主成分一是它们的代表因子,其中条带(c、f、i、j)表征的是体系内出现的新菌群,说明反应器运行后期,体系内出现了新菌群,导致微生物菌群的数量在不断增多,多样性指数不断上升. 条带(b、g、h)在主成分二上的载荷值较高,主成分二是它们的代表因子,这些条带几乎始终存在于反应器中并在后期有所加强,代表的是体系内的优势菌群(可能是包埋菌 *Burkholderia* sp. YX02,也可能是体系内的土著优势菌),说明在反应器运行的整个过程中,这些菌株适应环境的能力较强,能够始终维持较旺盛的生命力,对反应器的稳定高效运行至关重要. 条带(d、k、l)在主成分三上的载荷值较高,主成分三是它们的

代表因子,这些条带代表的是体系内的劣势种群,随着反应器的运行,这些菌株会逐渐被淘汰,尤其在竞争期该现象将更加明显. 因此,综合主成分分析的结果可知,随着反应器的运行,劣势菌被大量淘汰、优势菌常驻,运行后期形成以包埋菌 *Burkholderia* sp. YX02 为代表的新的菌群结构.




图 7 不同样品中条带的载荷因子贡献

Fig. 7 PCA showing loading values for different samples

2.6 微生物群落结构与环境因子的相关性分析

采用典范对应分析法分析了微生物群落结构与环境因子的相关性. 微生物群落结构与环境因子的相关性结果分别见表 4 和图 8.

表 4 典范对应分析结果

Table 4 Results of Canonical correspondence analysis

排序轴	1	2	3	4
特征值	0.067	0.043	0.033	0.022
种与环境因子的相关系数	0.968	0.905	0.734	0.894
种累积百分比变化率/%	22.1	36.1	46.9	54.1
种-环境累积百分比变化率/%	39.5	64.6	83.9	96.7

由表 4 可知, CCA 分析前两轴的特征值分别为 0.067 和 0.043,种与环境因子前两个排序轴的相关系数分别高达 0.968 和 0.905,说明微生物群落结构和所选的环境因子间存在着很强的相关性. 同时,第一排序轴解释了样本中 22.1% 的变异,第二和第三排序轴分别解释了样本中 14% 和 10.8% 的变异,前 4 个排序轴共解释了样本总变异的 54.1%. 而根据 Gauch^[28]的解释,虽然排序图仅能解释一小部分总变异,但也蕴涵丰富的信息. 因此,该排序图基本能反映细菌群落与环境因子之间的关系. 由图 8 可知,在所有的环境因子中,NO₂⁻-N 与第 1 排序轴呈负相关且相关程度最大,相关系数为 -0.8163,其次是 NO₃⁻-N、NH₄⁺-N、COD. 所有变量均与第 2 排序轴正相关,与第二排序轴相关性最大的是 NH₄⁺-N,相




图8 菌群结构多样性分布与环境因子的 CCA 排序

Fig. 8 CCA biplot of distribution of the bacterial structure diversity and environmental variables

关系数为0.475 4,其次是 COD、 NO_2^- -N、 NO_3^- -N,而 pH 与第 1、2 排序轴的相关系数均最小,分别为 0.429 5和0.212 5. 因此,对体系中微生物群落结构影响最大的是 NO_2^- -N,其次是 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N、COD, pH 影响最小. 范艳君等^[29]的研究结果表明氮素对水体中微生物群落结构影响很大. 有研究结果也表明限制淡水湖泊中微生物群落结构主要因素既含无机的营养物也含有机碳^[30,31]. 因此,微生物的群落结构不仅受到生物因素的调控,也与非生物因素(如环境因子等)的影响密不可分^[32,33]. 该结论启示人们在反应器实际运行的过程中,有效控制进水中含氮物质和 COD 的浓度对于反应器的稳定运行和提高处理效率具有重要的指示意义.

3 结论

(1) 包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 强化连续流反应器在运行期间微生物群落较为丰富,不同阶段群落结构存在一定的差异性,运行期间体系内菌群处于动态变化中并最终形成稳定的结构. 不同阶段群落结构的相似性并不随着反应器的运行而有序递减,群落结构经历了较大的变化,相邻阶段群落结构的相似性先下降后上升,群落结构经剧烈竞争后趋于稳定. 多样性指数的变化与反应器的运行显著关联,各阶段之间多样性指数差异明显,运行后期出现了新的菌群.

(2) 包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 强化连续流反应器运行全过程大致可划分为 3 个时期,且不同时期存在一定的演变关系. 随着反应器的运行,劣势菌大量淘汰、优

势菌常驻,运行后期形成以包埋菌 *Burkholderia* sp. YX02 为代表的新的菌群结构.

(3) 不同环境因子对包埋固定化异养硝化-好氧反硝化菌 *Burkholderia* sp. YX02 强化连续流反应器中微生物群落结构的影响不同,其中 NO_2^- -N 的影响最大,其次为 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N、COD, pH 影响最小. 在连续流反应器实际运行过程中,有效控制进水中含氮物质和 COD 的浓度可使反应器稳定运行及提高处理效果.

参考文献:

- [1] 张光明, 杜锋伟, 朱易春, 等. A^2/O 生物同步脱氮除磷及其改良工艺进展[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2010, 27(6): 739-742.
- [2] 张嘉超, 曾光明, 喻曼, 等. 农业废物好氧堆肥过程因子对细菌群落结构的影响[J]. 环境科学学报, 2010, 30(5): 1002-1010.
- [3] Miyatake F, Iwabuchi K. Effect of high compost temperature on enzymatic activity and species diversity of culturable bacteria in cattle manure compost[J]. Bioresource Technology, 2005, 96(16): 1821-1825.
- [4] 高孟春, 梁方圆, 杨丽娟, 等. PCR-DGGE 解析阴离子交换膜生物反应器反硝化过程中微生物群落结构变化[J]. 中国海洋大学学报, 2010, 40(4): 79-84.
- [5] 郭昱廷, 彭剑峰, 宋永会, 等. 温度对 ABR 反应器处理效果和微生物群落结构的影响[J]. 环境科学学报, 2012, 32(7): 1542-1548.
- [6] 高秀红. A/O 膜生物反应器中微生物群落的演替及对膜污染的影响[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2011.
- [7] 满鹏, 齐鸿雁, 呼庆, 等. 利用 PCR-DGGE 分析未开发油气田地表微生物群落结构[J]. 环境科学, 2012, 33(1): 305-313.
- [8] 李海红, 巴琦玥, 闫志英, 等. 不同原料厌氧发酵及其微生物种群的研究[J]. 中国环境科学, 2015, 35(5): 1449-1457.
- [9] Wirth R, Kovács E, Maróti G, et al. Characterization of a biogas-producing microbial community by short-read nextgeneration DNA sequencing[J]. Biotechnology for Biofuels, 2012, 5: 41.
- [10] Ács N, Kovács E, Wirth R, et al. Changes in the archaea microbial community when the biogas fermenters are fed with protein-rich substrates[J]. Bioresource Technology, 2013, 131: 121-127.
- [11] 韩睿, 陈来生, 李莉, 等. PCR-DGGE 研究青海农村户用沼气池微生物群落结构[J]. 中国环境科学, 2015, 35(6): 1794-1804.
- [12] Calli B, Mertoglu B, Roest K, et al. Comparison of long-term performances and final microbial compositions of anaerobic reactors treating landfill leachate[J]. Bioresource Technology, 2006, 97(4): 641-647.
- [13] Rowan A K, Snape J R, Fearnside D, et al. Composition and

- diversity of ammonia-oxidising bacterial communities in wastewater treatment reactors of different design treating identical wastewater[J]. *FEMS Microbiology Ecology*, 2003, **43**(2): 195-206.
- [14] 孙寓姣, 左剑恶, 李建平, 等. 厌氧颗粒污泥中微生物种群变化的分子生物学解析[J]. *中国环境科学*, 2006, **26**(2): 183-187.
- [15] 邵基伦, 曹刚, 李紫惠, 等. 包埋固定化异养硝化菌强化处理氨氮有机废水[J]. *中国给水排水*, 2015, **31**(1): 5-9.
- [16] Zhou J, Bruns M A, Tiedje J M. DNA recovery from soils of diverse composition [J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 1996, **62**(2): 316-322.
- [17] 孙宝盛, 张斌, 吴卿, 等. 应用 PCR-DGGE 技术解析 MBR 中微生物群落多样性[J]. *天津大学学报*, 2008, **41**(3): 356-361.
- [18] Muyzer G, de Waal E C, Uitterlinden A G, *et al.* Profiling of complex microbial populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction amplified genes coding for 16S rRNA [J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 1993, **59**(3): 695-700.
- [19] 陈谊, 孙宝盛, 黄兴, 等. 膜生物反应器中不同阶段微生物群落结构演变的研究[J]. *环境工程学报*, 2009, **3**(6): 1023-1028.
- [20] Shannon C E, Weaver W. *The mathematical theory of communication*[M]. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1963.
- [21] 李永念, 左丽, 唐俊杰, 等. 贵阳市区及近郊三条主要河流细菌污染调查[J]. *贵阳医学院学报*, 1997, **22**(3): 246-248.
- [22] 虞泳, 曾光明, 陈耀宁, 等. 农业废物好氧堆肥中氨氧化细菌的群落结构[J]. *环境科学*, 2011, **32**(10): 3067-3072.
- [23] Yannarell A C, Triplett E W. Geographic and environmental sources of variation in lake bacterial community composition[J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 2005, **71**(1): 227-239.
- [24] 储昭瑞. 厌氧氨氧化反应器启动及微生物群落结构解析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2012.
- [25] 张斌, 孙宝盛, 季民, 等. MBR 中微生物群落结构的演变与分析[J]. *环境科学学报*, 2008, **28**(11): 2192-2199.
- [26] 郑华, 欧阳志云, 方治国, 等. BIOLOG 在土壤微生物群落功能多样性研究中的应用[J]. *土壤学报*, 2004, **41**(3): 456-461.
- [27] Glimm E, Heuer H, Engelen B, *et al.* Statistical comparisons of community catabolic profiles [J]. *Journal of Microbiology Methods*, 1997, **30**(7): 71-80.
- [28] Gauch H G Jr. *Multivariate analysis in community ecology*[M]. New York: Cambridge University Press, 1982.
- [29] 范艳君, 朱玲, 朱伟, 等. 珠江口颗粒附着微生物群落沿环境梯度的演替[J]. *渔业科学进展*, 2012, **33**(3): 8-14.
- [30] Rivkin R B, Anderson M R. Inorganic nutrient limitation of oceanic bacterioplankton [J]. *Limnology and Oceanography*, 1997, **42**(30): 730-740.
- [31] Øvreås L, Bourne D, Sandaa R A. Response of bacterial and viral communities to nutrient manipulations in sea-water mesocosms[J]. *Aquatic Microbial Ecology*, 2003, **31**(2): 109-121.
- [32] 王丽梅. 环境因子对抗性基因消长动力学及耐药微生物群落结构变化的影响研究[D]. 天津: 南开大学, 2011.
- [33] 章燕平. 环境因素对菜地土壤氮素转化及其生物学特性的影响[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.

CONTENTS

Editor's comment	(403)
Risk Assessment and Risk Management of Chemicals in China	WANG Tie-yu, ZHOU Yun-qiao, LI Qi-feng, <i>et al.</i> (404)
Application of Land-use Regression Models in Spatial-temporal Differentiation of Air Pollution	WU Jian-sheng, XIE Wu-dan, LI Jia-cheng (413)
Ecological Footprint Evolution Characteristics and Its Influencing Factors in China from 2000 to 2010	HUANG Bao-rong, CUI Shu-hong, LI Ying-ming (420)
Pollution Characteristics and Sources of Carbonaceous Aerosol in PM _{2.5} During Winter in Guanzhong Area	TIAN Peng-shan, CAO Jun-ji, HAN Yong-ming, <i>et al.</i> (427)
Chemical Composition of the Single Particle Aerosol in Winter in Nanning Using SPAMS	LIU Hui-lin, SONG Hong-jun, CHEN Zhi-ming, <i>et al.</i> (434)
Correlation Analysis Between Characteristics of VOCs and Ozone Formation Potential in Summer in Nanjing Urban District	YANG Xiao-xiao, TANG Li-li, ZHANG Yun-jiang, <i>et al.</i> (443)
Seasonal Dynamics of Airborne Pollens and Its Relationship with Meteorological Factors in Beijing Urban Area	MENG Ling, WANG Xiao-ke, OUYANG Zhi-yun, <i>et al.</i> (452)
Mercury Distribution Characteristics and Atmospheric Mercury Emission Factors of Typical Waste Incineration Plants in Chongqing	DUAN Zhen-ya, SU Hai-tao, WANG Feng-yang, <i>et al.</i> (459)
Characteristics of Atmospheric Dry and Wet Deposition of Trace Metals in the Hinterland of the Three Gorges Reservoir, China	ZHANG Liu-yi, LIU Yuan, QIAO Bao-qing, <i>et al.</i> (466)
Monitoring and Analysis of Stable Isotopes of the Near Surface Water Vapor in Changsha	XIE Yu-long, ZHANG Xin-ping, YAO Tian-ci, <i>et al.</i> (475)
Mercury Transport from Glacier to Runoff in Typical Inland Glacial Area in the Tibetan Plateau	SUN Xue-jun, WANG Kang, GUO Jun-ming, <i>et al.</i> (482)
Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals in Core Sediments from Lakes of Tibet	GUO Bi-xi, LIU Yong-qin, ZHANG Fan, <i>et al.</i> (490)
Distribution and Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Sediments of Inflow Rivers to Northeastern Lake Tanganyika	YU Cheng, CHEN Shuang, ZHANG Lu (499)
Over One Hundred Year Sediment Record of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Lake Bosten, Xinjiang	SHEN Bei-bei, WU Jing-lu, ZHAO Zhong-hua, <i>et al.</i> (507)
Distribution Characteristics of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Different Environmental Media from Qingbang Island, Zhoushan, China	ZHENG Huang, XING Xin-li, GU Yan-sheng, <i>et al.</i> (513)
Transformation of Non-point Source Soluble Nitrogen in Simulated Drainage Ditch	LI Qiang-kun, SONG Chang-ji, HU Ya-wei, <i>et al.</i> (520)
Influence of Landscape Heterogeneity on Total Nitrogen Concentration in Zhongtian River Watershed	WANG Jing-ping, LI Zhao-fu, LIU Hong-yu, <i>et al.</i> (527)
Nitrogen Release from Sediment Under Dry and Rainy Season Alternation and Its Contribution to N Export from Xiangxi Watershed in Jiangxi Province	HAN Ning, HAO Zhuo, XU Ya-juan, <i>et al.</i> (534)
Spatial and Temporal Distributions of Nitrogen and Phosphate in the Chaohu Lake	XI Shan-shan, ZHOU Chun-cai, LIU Gui-jian, <i>et al.</i> (542)
Phosphorus Fractions and Release Risk in Surface Sediments of an Agricultural Headwater Stream System in Hefei Suburban, China	PEI Ting-ting, LI Ru-zhong, GAO Su-di, <i>et al.</i> (548)
Surface Property and Sorption Characteristics of Phosphorus onto Surface Sediments in Sanggou Bay	ZHU Jia-mei, CAO Xiao-yan, LIU Su-mei, <i>et al.</i> (558)
Particle Size Distribution and Pollutant Speciation Analyses of Stormwater Runoff in the Ancient Town of Suzhou	LI Huai, WU Wei, TIAN Yong-jing, <i>et al.</i> (565)
Abundance of Toxic and Non-toxic <i>Microcystis</i> sp. in Lake Hongze and Its Correlation with Environmental Factors	LI Da-ming, ZHANG Tong-qing, TANG Sheng-kai, <i>et al.</i> (573)
Effect of Charge-Transfer Complex on Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Absorption Property of Chromophoric Dissolved Organic Matter (CDOM) in Waters of Typical Water-Level Fluctuation Zones of the Three Gorges Reservoir Areas	JIANG Tao, LIANG Jian, ZHANG Mu-xue, <i>et al.</i> (580)
Influence of pH on Kinetics of Anilines Oxidation by Permanganate	WANG Hui, SUN Bo, GUAN Xiao-hong (588)
Effects of EDTA on the Reductive Dechlorination of 2,4-D by Pd/Fe	ZHOU Hong-yi, NIE Ya-zhong, CHEN Yong, <i>et al.</i> (595)
Preparation of NiAl-MMO Films Electrode and Its Capacitive Deionization Property	WANG Ting, ZHU Chun-shan, HU Cheng-zhi (602)
Competitive Microbial Oxidation and Reduction of Arsenic	YANG Ting-ting, BAI Yao-hui, LIANG Jin-song, <i>et al.</i> (609)
Community Characteristics of ANAMMOX Bacteria in Subsurface Flow Constructed Wetland (SSFCW) for Processing of Aquaculture Waster Water	ZENG Xian-lei, LIU Xing-guo, WU Zong-fan, <i>et al.</i> (615)
Analysis of Pathogenic Bacteria in Reclaimed Water and Impact of UV Disinfection on the Removal of Pathogenic Bacteria	JING Ming, WANG Lei (622)
Analysis of the Microbial Community Structure in Continuous Flow Reactor Enhanced by Heterotrophic Nitrification and Aerobic Denitrification Bacterium <i>Burkholderia</i> sp. YX02	SHAO Ji-lun, CAO Gang, LI Zi-hui, <i>et al.</i> (630)
Comparative Metagenomics of BIOLAK and A ² O Activated Sludge Based on Next-generation Sequencing Technology	TIAN Mei, LIU Han-hu, SHEN Xin (638)
Identification and Nitrogen Removal Characteristics of a Heterotrophic Nitrification-Aerobic Denitrification Strain Isolated from Marine Environment	SUN Qing-hua, YU De-shuang, ZHANG Pei-yu, <i>et al.</i> (647)
Removal of AOX and Chroma in Biologically Treated Effluent of Chemical Dyestuff Wastewater with Nanoscale Ni/Fe	SHU Xiao-ming, XU Can-can, LIU Rui, <i>et al.</i> (655)
Feasibility of 3BER-S Process for the Deep Denitrification in Synch with the Removal of PAEs from Reclaimed Water	XU Peng-cheng, HAO Rui-xia, ZHANG Ya, <i>et al.</i> (662)
Influence of Reaction Time on Titanate Nanomaterials and Its Adsorption Capability for Lead in Aqueous Solutions	FAN Gong-duan, CHEN Li-ru, LIN Ru-jing, <i>et al.</i> (668)
Sorption Characteristics of Phenanthrene and 1,1-Dichloroethene onto Reed Straw Biochar in Aquatic Solutions	WU Qing-wen, MENG Liang, ZHANG Zhi-hao, <i>et al.</i> (680)
Adsorption Characteristics of Norfloxacin by Biochars Derived from Reed Straw and Municipal Sludge	ZHANG Han-yu, WANG Zhao-wei, GAO Jun-hong, <i>et al.</i> (689)
Effect of Seasonal Temperature Increasing on Nitrogen Mineralization in Soil of the Water Level Fluctuating Zone of Three Gorge Tributary During the Dry Period	LIN Jun-jie, ZHANG Shuai, LIU Dan, <i>et al.</i> (697)
Effects of Warming and Straw Application on Soil Respiration and Enzyme Activity in a Winter Wheat Cropland	CHEN Shu-tao, SANG Lin, ZHANG Xu, <i>et al.</i> (703)
Distribution of Urban Soil Heavy Metal and Pollution Evaluation in Different Functional Zones of Yinchuan City	WANG You-qi, BAI Yi-ru, WANG Jian-yu (710)
Differential Effect and Mechanism of <i>in situ</i> Immobilization of Cadmium Contamination in Soil Using Diatomite Produced from Different Areas	ZHU Jian, WANG Ping, LIN Yan, <i>et al.</i> (717)
Characteristics of Adsorption Leaching and Influencing Factors of Dimethyl Phthalate in Purple Soil	WANG Qiang, SONG Jiao-yan, ZENG Wei, <i>et al.</i> (726)
Cd Runoff Load and Soil Profile Movement After Implementation of Some Typical Contaminated Agricultural Soil Remediation Strategies	LIU Xiao-li, ZENG Zhao-xia, TIE Bai-qing, <i>et al.</i> (734)
Concentrations and Component Profiles PAHs in Surface Soils and Wheat Grains from the Cornfields Close to the Steel Smelting Industry in Handan, Hebei Province	WU Di, WANG Yi-long, LIU Wei-jian, <i>et al.</i> (740)
Effect of Arbuscular Mycorrhiza (AM) on Tolerance of Cattail to Cd Stress in Aquatic Environment	LUO Peng-cheng, LI Hang, WANG Shu-guang (750)
Acute Toxic Effects of Bromate on Aquatic Organisms	WANG Zhi-wei, LIU Dong-mei, ZHANG Wen-juan, <i>et al.</i> (756)
Development of Self-assembled Dumbbell-like Fe ₃ O ₄ Micro/nanomaterial for Application in Thermocatalytic Degradation of Polybrominated Biphenyls	HUANG Xin-chen, ZONG Gang, LIU Ye-xuan, <i>et al.</i> (765)
Impact of Salinity on Leachate Treatment and N ₂ O Releases from Semi-aerobic Aged-refuse Bioreactor	LI Wei-hua, SUN Ying-jie, LIU Zi-liang, <i>et al.</i> (775)
Evaluating the Significance of Odor Gas Released During the Directly Drying Process of Sludge: Based on the Multi-index Integrated Assessment Method	DING Wen-jie, CHEN Wen-he, DENG Ming-jia, <i>et al.</i> (782)

《环境科学》第6届编辑委员会

主 编: 欧阳自远

副主编: 赵景柱 郝吉明 田 刚

编 委: (按姓氏笔画排序)

万国江 王华聪 王凯军 王绪绪 田 刚 田 静 史培军
朱永官 刘志培 刘 毅 汤鸿霄 孟 伟 周宗灿 林金明
欧阳自远 赵景柱 姜 林 郝郑平 郝吉明 聂永丰 黄 霞
黄 耀 鲍 强 潘 纲 潘 涛 魏复盛

环 境 科 学

(HUANJING KEXUE)

(月刊 1976年8月创刊)

2016年2月15日 第37卷 第2期

ENVIRONMENTAL SCIENCE

(Monthly Started in 1976)

Vol. 37 No. 2 Feb. 15, 2016

主 管	中国科学院	Superintended	by	Chinese Academy of Sciences
主 办	中国科学院生态环境研究中心	Sponsored	by	Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences
协 办	(以参加先后为序) 北京市环境保护科学研究院 清华大学环境学院	Co-Sponsored	by	Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection School of Environment, Tsinghua University
主 编	欧阳自远	Editor-in -Chief		OUYANG Zi-yuan
编 辑	《环境科学》编辑委员会 北京市2871信箱(海淀区双清路 18号, 邮政编码:100085) 电话:010-62941102, 010-62849343 传真:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn	Edited	by	The Editorial Board of Environmental Science (HUANJING KEXUE) P. O. Box 2871, Beijing 100085, China Tel:010-62941102, 010-62849343; Fax:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn
出 版	科 学 出 版 社 北京东黄城根北街16号 邮政编码:100717	Published	by	Science Press 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷 装 订	北京北林印刷厂	Printed	by	Beijing Bei Lin Printing House
发 行	科 学 出 版 社 电话:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com	Distributed	by	Science Press Tel:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com
订 购 处	全国各地邮电局	Domestic		All Local Post Offices in China
国外总发行	中国国际图书贸易总公司 (北京399信箱)	Foreign		China International Book Trading Corporation (Guoji Shudian), P. O. Box 399, Beijing 100044, China

中国标准刊号: ISSN 0250-3301
CN 11-1895/X

国内邮发代号: 2-821

国内定价: 120.00元

国外发行代号: M 205

国内外公开发行