

方知库
Eco-Environmental
Knowledge Web

环境科学

ENVIRONMENTAL SCIENCE

ISSN 0250-3301 CODEN HCKHDV
HUANJING KEXUE

■ 主办 中国科学院生态环境研究中心
■ 出版 科学出版社



2020

Vol.41 No.9
第41卷 第9期

目次

2020年天津市两次重污染天气污染特征分析·····	肖致美,徐虹,蔡子颖,李鹏,刘彬,元洁,郑乃源,唐遨,陈魁,邓小文(3879)
基于高分辨率MARGA分析成都市PM _{2.5} 中水溶性离子污染特征·····	尹寒梅,陈军辉,冯小琼,姜涛,钱骏,刘政(3889)
宿迁市PM _{2.5} 中水溶性无机离子的季节特征和来源分析·····	马红璐,赵欣,陆建刚,王辉,许纯领,欧阳琰,朱新胜,殷堂兵,漆丹,陆亚秋,汪玖阳,陆声兴(3899)
鼎湖山大气颗粒物中OC与EC的浓度特征及粒径分布·····	李安娜,温天雪,华维,杨员,孟泽,胡波,辛金元(3908)
鞍山市道路扬尘碳组分特征及来源解析·····	林孜,姬亚芹,林宇,国纪良,马妍,赵静琦(3918)
西安市冬季PM _{2.5} 中WSOC的光谱特性和来源解析·····	杨毅,张亚楠,刘焕武,田萍萍,李亚飞,雷颖,王一博(3924)
长三角地区气溶胶光学性质与新粒子生成观测·····	杜盈盈,陈军,张家洛,甘桂城,刘瑜存,苏明旭,楼晟荣,周敏,陶士康,乔利平(3932)
连云港市挥发性有机化合物的组分特征及来源解析·····	崔金梦,王体健,李秋潼,董立文,黄丛丞,曹云擎(3941)
成都市城区大气VOCs季节污染特征及来源解析·····	王成辉,陈军辉,韩丽,徐晨曦,王波,李英杰,刘政,钱骏(3951)
德州市夏季臭氧敏感性特征及减排方案·····	严茹莎(3961)
超低改造下中国火电排放清单及分布特征·····	屈加豹,王鹏,伯鑫,薛晓达,董广霞,崔磊,康明雄,王彤,汤铃,朱法华,李时蓓(3969)
浙江省人为源氨排放清单建立及分布特征·····	赵睿东,于兴娜,侯新红,沈丽(3976)
垃圾焚烧烟气中二噁英控制技术的评估与筛选·····	赵思岚,奚鹏飞,郭凤艳,邓双,贾建丽(3985)
兰州市两场典型降水事件稳定同位素特征及其水汽来源·····	韩婷婷,张明军,王圣杰,杜勤勤,马转转,郭蓉,曹晏风(3993)
然乌湖流域地表水水化学特征及控制因素·····	张涛,王明国,张智印,刘廷,何锦(4003)
河套灌区地下水化学演变特征及形成机制·····	崔佳琪,李仙岳,史海滨,孙亚楠,安海军,邢进平(4011)
石期河流域地下水化学特征及物质来源分析·····	李笑,于爽,李亮,郭永丽(4021)
长江中下游湖泊水体氮磷时空变化特征及其影响因素·····	季鹏飞,许海,詹旭,朱广伟,邹伟,朱梦圆,康丽娟(4030)
2016~2017年长荡湖流域湖库系统营养盐时空分布机制分析·····	李新艳,李恒鹏,姜三元,马培,赖锡军,邓建才,陈东强,耿建伟(4042)
菹草对湖泊水质及浮游植物群落结构的影响·····	康丽娟,许海,邹伟,朱广伟,朱梦圆,季鹏飞,陈洁(4053)
金泽水库库区细菌群落构建过程与关键驱动因子分析·····	刘明坤,童俊,朱慧峰,白晓慧(4062)
典型氟工业园周边河流沉积物中全(多)氟化合物的分布特征·····	孙琳婷,赵祯,唐建辉(4069)
微塑料对河水抗生素抗性基因的影响·····	周昕原,王言仔,苏建强,黄福义(4076)
莲花水库水体中抗生素污染特征及生态风险评价·····	廖杰,魏晓琴,肖燕琴,李青松,范洪勇,刘学军,庄马展,刘超翔(4081)
拟柱孢藻生长及碱性磷酸酶活性对不同磷浓度和磷形态响应的株系间差异·····	叶金梅,赵莉,罗旭,彭亮,雷腊梅(4088)
奶水河湿地植物作用及调水水质响应模拟·····	李亚娟,杜彦良,毕二平,王亮,陈翠柏(4095)
浅基质层干植草沟运行效果的现场实验·····	张佳炜,李田,张庭秀(4105)
海绵城市地块汇水区颗粒污染物的传输·····	李佳,谢文霞,姜智绘,单溪环,廖云杰,赵洪涛,李叙勇(4113)
天然黄铁矿吸附去除水中Sb(V):性能与机制·····	石松,吴乾元,李新正,黄满红(4124)
过硫酸盐氧化处理含苯磺酸废水·····	章晋门,卢钧,刘晓琛,陈泉源(4133)
温度对城市污水厌氧生物滤池运行效果与菌群结构的影响·····	刘智斌,刘秀红,周桐,章世勇,李健敏,杨庆(4141)
ABR-MBR耦合工艺启动及优化反硝化除磷性能·····	缪新年,汪倩,郭凯成,刘文如,沈耀良(4150)
低温下全自养脱氮颗粒污泥适应低基质效能·····	刘雨馨,王建芳,钱飞跃,陈倩苗,乔伟,沈聪(4161)
雄安新区土壤重金属地球化学监测关键问题探讨·····	郭志娟,周亚龙,杨峥,赵传冬,成杭新,孔牧,彭敏(4169)
基于土壤重金属及PAHs来源的人体健康风险定量评价:以北京某工业污染场地为例·····	吴志远,张丽娜,夏天翔,贾晓洋,李慧颖,王世杰(4180)
基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价·····	张富贵,彭敏,王惠艳,马宏宏,徐仁廷,成晓梦,侯召雷,陈子万,李括,成杭新(4197)
云南兰坪铅锌矿区优势植物重金属富集特性及应用潜力·····	张龙,张云霞,宋波,吴勇,周子阳(4210)
水培试验下水稻Pb吸收累积关键生育期·····	胡雨丹,周航,辜娇峰,霍洋,邓鹏辉,魏宾纭,刘俊,廖柏寒(4218)
田间条件下养分调控八宝景天Cd修复效率·····	郭俊梅,杨俊兴,杨军,郑国砥,周小勇,陈同斌,卞建林,孟晓飞,李玉峰(4226)
桉树枝条生物炭输入对桂北桉树人工林酸化土壤的作用效果·····	段春燕,沈育伊,徐广平,滕秋梅,张德楠,何成新,张中峰,周龙武,孙英杰(4234)
秸秆直接还田和炭化还田对红壤酸度、养分和交换性能的动态影响·····	杨彩迪,卢升高(4246)
土壤微生物群落结构对生活源和工业源再生水灌溉的差异化响应·····	王燕,程东会,檀文炳,余红,席北斗,姜永海,党秋玲(4253)
粪肥和有机肥施用对稻田土壤微生物群落多样性影响·····	理鹏,吴建强,沙晨燕,叶春梅,黄沈发(4262)
松花江下游沿江湿地土地利用变化对土壤细菌群落多样性的影响·····	张拓,徐飞,怀宝东,杨雪,隋文志(4273)
黄土高原草地土壤细菌群落结构对于降水变化的响应·····	李娜,王宝荣,安韶山,焦峰,黄倩(4284)
土地利用方式对会仙岩溶湿地土壤真菌群落和功能类群的影响·····	程跃扬,靳振江,王晓彤,贾远航,袁武,周军波(4294)
黑土真菌群落互作及其与梯度有机质碳分子结构的关系·····	尚秋彤,黄瑞林,倪浩为,隋跃宇,孙波,梁玉婷(4305)
贵州茂兰喀斯特森林不同演替下土壤真核微生物多样性·····	王显,龙健,李娟,刘灵飞,廖洪凯,李宜蓉,杨睿(4314)
玉米秸秆生物炭固化细菌对镉砷吸附·····	刘玉玲,朱虎成,彭鸥,李丹阳,杨蕊嘉,彭晶,铁柏清(4322)
无机态氮素转化机制及水土体氮源识别方法·····	梁杏,孙立群,张鑫,张洁,付鹏宇(4333)
《环境科学》征订启事(4061)	《环境科学》征稿简则(4132)
信息(4233, 4293, 4304)	

菹草对湖泊水质及浮游植物群落结构的影响

康丽娟^{1,2}, 许海^{1*}, 邹伟^{1,2}, 朱广伟¹, 朱梦圆¹, 季鹏飞³, 陈洁³

(1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 湖泊与环境国家重点实验室, 南京 210008; 2. 中国科学院大学, 北京 100049; 3. 江南大学环境与土木工程学院, 无锡 214122)

摘要: 沉水植物的季节性死亡分解会引起水体环境的巨大改变, 如大量释放有机碳和氮磷等植物营养元素, 进而可能引起浮游植物群落结构的显著变化。本文以菹草为例, 调查了我国江淮中下游平原 14 个浅水湖泊中该物种春季生长期和夏季衰亡期水环境物理化学指标和浮游植物相关参数, 并量化了菹草衰亡对水质和浮游植物群落结构的影响。结果表明, 在春季, 菹草的生长显著抑制了沉积物的悬浮, 提高了水体的透明度, 同时菹草在生长过程中, 吸收了水体中的营养元素并将其储存在植株体内或输送到沉积物中, 菹草的光合作用还显著提高了水体的溶解氧和 pH。然而, 夏季菹草的衰亡使得湖水变得十分浑浊, 水体有机质含量显著上升。此外, 本研究还发现夏季有草区与无草区浮游植物组成和蓝藻生物量差异显著, 对应的蓝藻占总藻生物量的比值分别为 18.96% 和 34.05%。菹草衰亡区的蓝藻表现出更大生物量的原因如下: 一是植株体的分解为蓝藻提供了充足的有机质和氮磷物质, 为蓝藻的增殖提供了营养来源; 二是夏季菹草衰亡导致水体浊度增加, 使得蓝藻在竞争中占据了更好生态位, 使其具备更大的氮、磷营养盐利用效率。

关键词: 沉水植物; 水环境; 蓝藻; 有机质; 营养盐利用率

中图分类号: X171 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2020)09-4053-09 DOI: 10.13227/j.hjxx.202002006

Influence of *Potamogeton crispus* on Lake Water Environment and Phytoplankton Community Structure

KANG Li-juan^{1,2}, XU Hai^{1*}, ZOU Wei^{1,2}, ZHU Guang-wei¹, ZHU Meng-yuan¹, JI Peng-fei³, CHEN Jie³

(1. State Key Laboratory of Lake Science and Environment, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. School of Environment and Civil Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: The decomposition of submerged macrophytes is generally associated with dramatic changes in the water environment, such as the large release of nutrients (e.g., nitrogen and phosphorus) and organic carbon to the surrounding waters, which may result in significant changes in phytoplankton community structure. In this study, *Potamogeton crispus*, physicochemical variables, and phytoplankton samples were collected in 14 shallow lakes in the middle and lower Jianghuai Plain in spring (growing period of *P. crispus*) and summer (decomposition phase of *P. crispus*) of 2018. The effects of the decline of *P. crispus* on water quality and phytoplankton community structure were quantified. The results showed that water transparency increased significantly in spring because the growth of *P. crispus* inhibits sediment resuspension and macrophytes can transport the nutrients from the water column to the sediment. The values of dissolved oxygen and pH also increased significantly due the photosynthesis by macrophytes. In contrast, the decomposition of *P. crispus* during summer months caused a significant increase in water turbidity and organic matter. There were considerable differences in phytoplankton biomass and cyanobacterial biomass in the sites with or without *P. crispus*, and the corresponding ratios of cyanobacterial biomass to the total algal biomass were 18.96% and 34.05%, respectively. Higher values of cyanobacterial biomass were observed with the decomposition of *P. crispus* than its counterpart in summer because ① the decomposition of macrophytes provided sufficient organic matter and nutrient (nitrogen and phosphorus) resources for cyanobacterial growth; ② *P. crispus* decline in summer significantly increased water turbidity, which makes cyanobacteria occupy a better ecological niche and more efficiently utilize nitrogen and phosphorus.

Key words: submerged plants; water environment; cyanobacteria; organic matter; available of nutrients

在浅水湖泊中,湖水与底泥间物质交换强烈,对污染响应比较敏感,因此浅水湖泊极易发生富营养化。而沉水植物作为浅水湖泊中的重要生产者,在湖泊生态系统的物质循环和能量流动方面发挥着重要作用,不仅可与浮游藻类竞争水中的光、能源和营养物质^[1],对藻类生长起到抑制作用^[2,3];还可以有效抑制沉积物再悬浮过程^[1,2],并为浮游动物、底栖动物以及鱼类等提供适宜的栖息地。因此,沉水植物丰富的区域往往具有更高的水体透明度^[3]和生物多

样性^[4]。丰富的沉水植物也被认为是健康水生生态系统的重要表征^[5],恢复水生植被成为浅水湖泊富营养化生态修复的重要措施^[6]。

收稿日期: 2020-02-01; 修订日期: 2020-03-19

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFC0405201); 国家自然科学基金项目(41573076, 41671494); 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07203-001); 中国科学院南京地理与湖泊研究所“一三五”战略发展规划项目(NIGLAS2017GH04)

作者简介: 康丽娟(1997~),女,硕士研究生,主要研究方向为湖泊生态学, E-mail: kanglijuan18@mails.ucas.ac.cn

* 通信作者, E-mail: hxu@niglas.ac.cn

然而,沉水植物对湖泊生态系统的影响并不一定都是积极的.沉水植物的生长具有一定的周期性,如果没有合适的群落演替或是不能在其死亡前做到及时有效的收割,其腐烂分解会向水体中大量释放氮、磷等生源要素^[7~11]、改变水体光环境^[12]并可能为藻类水华暴发或湖泛的发生提供物质和环境条件^[13],进一步增加湖泊的富营养化程度.尤其是对于死亡分解过程发生在夏季的水生植物,高温环境可能会促使蓝藻门的部分种属(如微囊藻)占据优势和大量繁殖^[12],进而威胁饮用水安全和水生生态系统的服务功能.

菹草(*Potamogeton crispus*)隶属于眼子菜科,就是一种夏季死亡的沉水植物.其在秋冬发芽,4月和5月达到最大现存量,到6月开始大量死亡并腐烂分解^[14].菹草在我国的浅水富营养化湖泊中广泛分布^[15].此外,该物种对弱光具有较强的耐受性^[16],常被用作富营养化湖泊生态恢复的先锋种.已有研究表明,生长期的菹草能有效吸附水体中的总磷等营养元素^[17]及金属元素^[18],明显改善水质;相对地,菹草衰亡时,茎叶中吸附的营养物质会重新进入水体,造成水体溶解氧下降、氮磷浓度升高的现象,引发二次污染.然而,已有的研究多集中于室内控制实验,控制体系较为单一,对湖泊自然环境下菹草的环境效益研究较少^[19],尤其是菹草对浮游植物群落结构的影响明显缺乏,而后者对于浅水湖泊,尤其是富营养化的湖泊研究是

极为重要的.

因此,本文以菹草为例,选取了我国江淮平原湖群14个水文背景相似的浅水湖泊,在5月菹草生长季节和7月死亡分解阶段分别对湖泊水体的理化指标和浮游植物群落结构进行调查,通过探讨菹草的生长与衰亡对水环境和浮游植物生物量与群落结构的影响,尤其是对蓝藻种属的影响,以期对菹草这一常见沉水植物的生态管控提供科学建议.

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

本文以我国江淮中下游平原地区的14个浅水湖泊为研究对象(图1).江淮中下游平原湖区包括我国长江及淮河中下游、黄河下游等地区的自然湖泊,是我国五大湖区之一.据统计,该区域面积大于1 km²的自然湖泊面积约占全国湖泊总面积为23.3%,是我国湖泊分布密度最大的地区之一^[20].该区气候以亚热带季风与季风性湿润气候为主,夏季高温多雨.湖泊多由河流水系演变或者海岸线变迁形成,具有相似的水文地质背景,湖泊较浅,换水周期较长,降水和河川径流是其主要的水源.同时该区是我国人口最密集的地区之一,湖泊具有重要的经济和生态价值,是周围城市 and 地区的工业用水、调蓄灌溉、航运水产和生活取水的重要来源;但近年来受人类活动影响强烈,该区大部分湖泊都处于不同程度的富营养化程度.




图1 采样湖泊空间分布示意

Fig. 1 Spatial distribution of the study lakes

1.2 样品采集与分析

在菹草的生长阶段(春季,2018年4月27日~

5月11日)和死亡阶段(夏季,2018年7月5~20日),调查了我国江淮平原生态区的14个浅水湖泊

(图 1) 的 64 个点位, 包括在春季有菹草生长的 26 个有草点和没有水生植被覆盖的 38 个无草点. 其中东平湖和梁子湖所有采样点在春季均被菹草所覆盖, 武昌湖、黄大湖、龙感湖、武山湖、珠湖、军山湖、武昌东湖和岳阳南湖这 8 个湖的采样点未出现任何水生植被生长现象; 而南四湖、洪湖、阳澄湖和白马湖, 既包括有菹草生长的生境也包括无菹草生境. 所有的湖中采样点均匀分布, 在有菹草点, 菹草是春季水生植物群落的绝对优势种, 目测估计菹草覆盖度达 95% 以上; 除了阳澄湖在夏季出现了演替种荷花和菱角, 其余湖泊在夏季均未出现其它水生植物.

利用便携式多参数水质分析仪 (YSI, 6600V2) 原位测定了水面表层的水温 (WT)、溶解氧 (DO) 和 pH. 使用 Secchi 盘在现场测量各点位的透明度 (SD). 在每个点位收集表层 50 cm 水样 300 mL, 并立即冷藏带回实验室用以分析总氮 (TN)、总磷 (TP) 和高锰酸盐指数. 其中, TN 采用过硫酸钾紫外分光光度法测定, TP 采用钼酸铵分光光度法测定; 高锰酸盐指数采用酸性高锰酸盐滴定法测定. 叶绿素 a (Chl-a) 采用热乙醇萃取分光光度法测量, 在每个点采集定量水通过 0.45 μm 孔径的玻璃纤维滤膜 (Whatman GF/F), 并用铝箔纸收集滤膜, 包好冷藏送回实验室, 用于提取 Chl-a; 同时收集滤膜后的水, 用于测定溶解性总氮 (DTN)、溶解性总磷 (DTP) 和氨氮 (NH_4^+-N). 此外, 在每个点位另外采集 1 L 水, 现场加入 1% 的酸性鲁哥溶液 (即 10 mL) 用于浮游植物的固定, 然后带回实验室后沉淀 48 h 并浓缩后, 再在显微镜下参照文献 [21] 对样品浮游植物的种类进行镜检鉴定和计数. 各种属藻类生物量是由该种属藻细胞数量和其对应的细胞重量乘积计算所得.

1.3 蓝藻对营养盐利用性

氮磷元素是限制湖泊中浮游植物生长的重要因子之一 [22], 水体的 TN、TP 浓度与浮游植物的生物量或叶绿素 a 浓度常呈现显著的正相关关系 [23]. 但环境因子, 如温度、光照等气象因子和地理位置的变化会强烈影响营养盐与藻类生产力的关系 [24]. Chl-a/TP 的比值常常被用来衡量和评估指定水体环境中营养盐被蓝藻的利用效率 [23, 25]. 因此, 本文分别计算了有草区和无草区的蓝藻生物量与 TP 和 TN 的比值 (Cyano/TP 和 Cyano/TN), 用以比较两种环境下蓝藻生长的适宜性大小. 即利用不同环境下蓝藻生物量与所利用的营养盐浓度比值来评估该环境下蓝藻生长的潜力, 对于越适宜蓝藻生长的环境, 这一比值越大.

1.4 统计分析

利用 Kolmogorov-Smirnov 和 Levene 检验对所获

取的数据进行正态和方差齐性检验, 对通过检验的数据采用单因素方差分析 (one-way ANOVA) 的方法对有无菹草生长区之间的 SD、DO、TN、TP 和高锰酸盐指数进行比较; 采用配对样本检验 (Paired-samples *T* test) 的方法对春夏季节间同区的水质参数差异进行分析. 所有样本的相关性通过 Pearson 相关分析进行检验. 对于不符合正态分布和方差齐性的数据, 使用 Wilcoxon 秩和检验 [26] 的方法进行非参数比较. 选用浮游植物和蓝藻生物量的质量数据进行分析.

利用相似性分析 (analysis of similarities, ANOSIM) 对浮游植物和蓝藻门各属的细胞密度数据进行分析, 以量化无草区和有草区两者间浮游植物群落结构和蓝藻种属的差异. 并利用非度量多维标度 (nonmetric multidimensional scaling, NMDS) 对差异性并进行比较; NMDS 的特点是根据样品中包含的物种信息, 以点的形式反映在多维空间上; 通过点与点间的距离 (Bray-curtis 相异性矩阵距离) 体现不同样品间的差异程度, 以减少优势类群的影响 [27]. 同时利用公式 (1) 对所获浮游植物样本的优势种进行计算.

$$Y = (n_i/N) \times F_i \quad (1)$$

式中, n_i 为第 i 种的个体数, N 为样品中的个体总数, F_i 为样品中第 i 种个体在总样本中出现的频率, 当优势度 $Y > 0.02$ 时, 判定该种为优势种 [28].

2 结果与分析

2.1 水质物理化学参数

有菹草生长区 (有草区) 和无草区的水质理化参数如表 1 所示. 结果表明, 菹草的生长提升了水体的 SD、DO 和 pH. 具体表现为春季有草区 SD 达 (114 ± 43) cm, 显著高于无草区 (74 ± 53) cm ($P = 0.001$). 有草区的 DO 为 (12.24 ± 2.82) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 也高于无草区 (9.88 ± 2.26) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ($P < 0.001$); pH 也表现为有草区显著较高 ($P < 0.001$). 而在夏季, 有菹草衰亡区的 SD 为 (66 ± 35) cm, 在均值上低于无草区的 (86 ± 75) cm ($P = 0.34$), DO、pH 在有草区和无草区间也不存在统计上的差异.

配对样本检验的结果表明, 从春季菹草生长期到夏季死亡期的过程中, 有草区的 SD 显著下降 ($P < 0.001$, $n_1 = n_2 = 26$), 而无草区的 SD 在季节间不存在显著差异 ($P = 0.34$, $n_1 = n_2 = 38$). 对于 DO, 有草区的 DO 从春季的 (12.24 ± 2.82) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至夏季的 (9.27 ± 3.36) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 表明菹草在春季的生长, 光合作用大大提升了水体的溶解氧水平 ($P <$

0.001, $n_1 = n_2 = 26$); 有草区春夏季的高锰酸盐指数分别为 $(5.26 \pm 2.05) \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $(6.20 \pm 1.64) \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 表现出显著的上升 ($P = 0.028, n_1 = n_2 = 26$), 说明在菹草分解阶段, 水中的有机质含量增加. 而无草区的 DO、pH 和高锰酸盐指数在季节间均未表现出较大差异.

表 1 有无菹草对水环境参数值的影响¹⁾

Table 1 Influence of the presence or absence of <i>P. crispus</i> on water environment parameters										
季节	菹草	WT/℃	SD/cm	pH	DO /mg·L ⁻¹	TP /μg·L ⁻¹	TN /mg·L ⁻¹	NH ₄ ⁺ -N /μg·L ⁻¹	Chl-a /μg·L ⁻¹	高锰酸盐指数 /mg·L ⁻¹
春季	无($n=38$)	22.6 ± 1.7	74 ± 53	8.03 ± 0.55	9.88 ± 2.26	96.44 ± 74.18	1.09 ± 0.60	38.50 ± 61.03	25.83 ± 39.39	4.64 ± 1.99
	有($n=26$)	21.3 ± 2.1	114 ± 43	8.96 ± 0.70	12.24 ± 2.82	68.77 ± 37.85	1.07 ± 0.54	31.77 ± 55.49	11.86 ± 16.09	5.26 ± 2.05
	<i>P</i>	0.006	0.001	<0.001	<0.001	0.11	0.49	0.44	0.06	0.23
夏季	无($n=38$)	31.0 ± 1.4	86 ± 75	8.31 ± 0.41	8.57 ± 2.14	97.90 ± 119.21	1.01 ± 0.64	59.72 ± 152.28	46.99 ± 39.55	4.50 ± 1.71
	有($n=26$)	29.9 ± 1.5	66 ± 35	8.43 ± 0.41	9.27 ± 3.36	60.97 ± 30.44	1.19 ± 0.46	67.92 ± 37.14	45.66 ± 25.96	6.20 ± 1.64
	<i>P</i>	0.003	0.3	0.24	0.35	0.30	0.06	<0.001	0.27	0.007

1) 水环境参数具体包括水温 (WT)、透明度 (SD)、pH、溶解氧 (DO)、总磷 (TP)、总氮 (TN)、氨氮 (NH₄⁺-N)、叶绿素 (Chl-a) 和高锰酸盐指数

2.2 浮游植物
2.2.1 Chl-a 和蓝藻生物量

在春季, 无草区和有草区的 Chl-a 浓度分别为 $(25.83 \pm 39.39) \text{ μg} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $(11.86 \pm 16.09) \text{ μg} \cdot \text{L}^{-1}$ (表1), 有草区的 Chl-a 浓度略低于无草区 ($P = 0.06$). 浮游植物和蓝藻生物量的结果表明 (图2), 春季的浮游植物种类鉴定出 7 门 31 属, 其中无草区浮游植物的总生物量为 $0.60 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 优势种包括鱼腥藻、束丝藻、颤藻、直链藻和栅藻, 其中蓝藻生物量 $0.10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 占总生物量的 17.02%. 有草区的浮游植物的总生物量为 $0.43 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 与无草区间没有显著差异 ($P = 0.49$); 主要优势种为席藻和直链藻, 其中蓝藻生物量分别为 $0.06 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 占总生物量的比例为 13.93%, 显著低于无草区 ($P = 0.05$).

夏季, 两点位的 Chl-a 浓度间没有明显差异 (P

考虑到不同湖泊本身的水文背景的不同, 以及受人类活动的影响, 不同点位营养负荷的差异, 各样本的营养数据间的差异较大. 但对于 TP, 不管是春季还是夏季, 均表现为有草区的 TP 较低. 而 TN 在区位间和季节间均没有表现出显著的差异; 但在夏季有草区的 NH₄⁺-N 显著高于无草区 ($P < 0.001$).

$= 0.27$), 分别为 $(45.66 \pm 25.96) \text{ μg} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $(46.99 \pm 39.55) \text{ μg} \cdot \text{L}^{-1}$. 但浮游植物的总生物量在统计上表现出显著差异 ($P = 0.014$), 有草区的浮游植物总生物量为 $2.68 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 高于无草区的生物量 $2.29 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$; 相对应的有草区蓝藻生物量高达 $0.91 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 与无草区蓝藻生物量 $0.44 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 间差异极显著 ($P < 0.001$), 两者各占总生物量的 34.05% 和 18.96%, 有草区的浮游植物优势种为鱼腥藻、平裂藻、束丝藻和颤藻, 均属于蓝藻门, 无草区的优势种包括束丝藻、颤藻、席藻、鱼腥藻、微囊藻和直链藻多种. 可以看出, 尽管浮游藻类的总生物量和蓝藻的生物量在季节间存在较大的增加, 但对于无草区, 蓝藻占总生物量的比例并没有增长的趋势, 而有草区, 夏季蓝藻所占的比例有较大幅度的增长. 相似性分析的结果显示, 造成夏季藻类种群明显不同的是蓝藻中的颤藻, 颤




图 2 有无菹草区浮游植物总生物量和蓝藻生物量 (Mean ± SE)

Fig. 2 Histogram of phytoplankton and cyanobacteria biomass under *P. crispus* presence or absence (mean biomass ± SE)

藻在夏季有草区的生物量显著增加.

2.2.2 蓝藻对营养盐的利用效率

利用蓝藻生物量和营养盐(TN 和 TP)的比值来量化指定环境下蓝藻对营养盐的利用效率(表 2). 在春季,有草区和无草区的 Cyano/TP 分别为(1.05 ± 2.71)和(0.97 ± 2.21) ($P = 0.07$), Cyano/TN 分别为(0.05 ± 0.15)和(0.06 ± 0.12) ($P = 0.38$),均没有表现出显著差异. 而夏季两者的 Cyano/TP 比值分别为

(16.20 ± 15.55)和(7.46 ± 9.59) ($P < 0.001$),表明有草区蓝藻对 TP 的利用效率极显著高于无草区蓝藻对 TP 的利用效率;类似的结果也出现在蓝藻对 TN 的利用上,夏季 Cyano/TN 在无草区为(0.44 ± 0.50),而在有草区高达(0.78 ± 0.60),显著高于无草区蓝藻对 TN 的利用率($P = 0.002$). 表明在菹草死亡的环境下更适宜蓝藻的大量增殖,此时的蓝藻能够对 TN 具更高的吸收转化率.

表 2 有/无菹草区蓝藻生物量和营养盐(TN 和 TP)的比值

Table 2 Ratio of <i>Cyanophyta</i> biomass and nutrients (total phosphorus and total nitrogen) under <i>P. crispus</i> presence or absence				
蓝藻和营养盐比值	季节	无草区	有草区	<i>P</i>
Cyano/TP	春季	0.97 ± 2.21	1.05 ± 2.71	0.07
	夏季	7.46 ± 9.59	16.20 ± 15.55	<0.001
Cyano/TN	春季	0.06 ± 0.12	0.05 ± 0.15	0.38
	夏季	0.44 ± 0.50	0.78 ± 0.60	0.002

3 讨论

3.1 菹草的生长与衰亡过程对水环境的影响

已有研究发现,菹草在生长阶段有改善水体光环境、降低水相中营养盐水平的作用^[29]. 本研究通过较大空间尺度的现场调研,结果表明,菹草对水体透明度的改善主要因为两方面的原因. 第一,菹草特殊的波浪式叶片,能加快水体中悬浮颗粒物和泥沙的絮凝作用,可快速降低外源非藻类浊度. 室内实验表明,在 24 h 的水力停留时间下,菹草可使输入水体的悬浮泥沙质量浓度降低约 70%^[30]. 第二,沉水植物的大量生长可以很好地抑制沉积物再悬浮的过程,从而降低内源无机颗粒物对透明度的影响^[4]. 此外,植物的光合作用提升了水体的溶解氧,植株的茎叶能为附生微生物的生存提供环境,增加细菌的多样性^[31],促进水中有机质的降解.

而在夏季,菹草的死亡分解造成了水体 SD、pH 值和 DO 的显著下降,有机质含量显著升高. 其主要原因是菹草死亡后,沉积物的再悬浮过程加剧;并且失去菹草对光的竞争作用,浮游植物获得了更好地光照条件并得以快速生长^[24],使水体浊度上升. 此外,菹草植株的分解也会在一定程度上对水体的光照条件造成影响,使水体浊度快速下降,并破坏底栖生物的生境. 因为菹草植株由大量的有机物组成,其中干植株的有机物含量可占 84%^[32];在菹草死亡时,植株快速腐烂,研究表明半数生物量的分解完成的时间约 25 d^[14],80% 左右的初始干重在 40 d 后消失^[18];且开始分解速率较高,后逐渐降低. 根叶的凋零和分解生成有机物溶入水体中,会释放大量的有机物. 高锰酸盐指数作为水中还原性有机物的指示量,与水中碳源含量密切正相关^[33],本研

究中也发现,有草区的高锰酸盐指数值在夏季明显升高,显著高于无草区的这一数值. 表明菹草植株的分解,在一定程度上使水体中的有机质含量增加,从而能为浮游植物的生长提供了更多的能量.

此外,植株有机碎屑的分解过程中,会大量消耗水中的 DO,使水体底部处于短时的缺氧状态^[34],影响水下底栖生物和微生物的群落结构,甚至诱发湖泛的出现^[13],在本研究中也观察到水体 DO 的降低,但未出现明显的缺氧环境,可能是因为浅水湖泊受到风浪的扰动较大. 水体的扰动不仅会影响营养盐和有机物的释放的过程与速率^[32],还会增加水体的复氧情况. 微生物在分解菹草的过程中,同时也会代谢产生 CO₂ 释放回水体中,降低水体 pH 值^[34].

营养盐方面,菹草的生长显著降低了水相的磷水平. 不论是春季还是夏季,TP 的浓度均表现为有草区低于无草区. 茂盛生长期的菹草可以从水体和沉积物中大量吸收磷等营养物质^[17],并将其储存到植株体或者转移至沉积物中^[35,36],从而显著降低水相的 TP 水平. 其次,对于浅水湖泊来说,沉积物再悬浮过程一直是内源磷释放的重要途径之一,沉水植被生长改变底泥氧化还原条件,抑制底泥磷的释放,进一步降低了水相 TP,从而限制藻类的生长. 而在夏季时,沉水植物的分解使大量磷得以重新释放^[9,10],促进磷酸盐酶的活性,常常使上覆水中 TP 浓度出现较大的增加趋势^[7,37].

理论上来说,菹草的生长也会显著降低水相氮的水平. 比如,有研究表明太湖表层沉积物中 TN 和总有机碳含量都与水生植物的现存量间存在显著的正相关关系^[38],说明湖水中的氮和有机碳很可能是经过水生植物的沉积作用,被传输到了底泥之中. 此外,除了植物吸收,沉积物的吸附和微生物的反硝化

作用都是水体氮素去除的重要途径^[7],直接影响水相中的 TN 浓度. 因此,在水生植物生物量较低时,沉水植物分解过程中也会出现上覆水的 TN 和 TP 比初始浓度低的情况^[7]. 本研究中菹草对 TN 和 TP 的浓度影响在统计上就不显著,但伴随夏季蓝藻的产生, NH_4^+ -N 浓度明显升高,与前人的研究结果一致^[39]. 基于野外实地观测,湖泊面积广阔和蓄水量大,不同于室内实验所设定的水体体积,营养盐有足够的空间进行转化和吸附是重要的原因. 另一方面,野外环境中,营养盐浓度与水文等多因素密切相关. 比如水位,水位对营养盐调节具有复杂性,既可以通过增加径流带来流域上的营养物质的输入,又可以对湖水有一定的稀释作用,改变氮磷比^[40],在一定程度上能够缓冲菹草分解时释放的氮磷营养盐浓度.

3.2 菹草的死亡分解对藻类生物量和群落结构的影响

对于一个稳定生态系统来说,藻类的群落结构会随着温度、水文因子在季节间的改变而发生规律性的演替,比如,在亚热带的水库中,浮游植物在春季常以硅藻、甲藻和绿藻为优势类群,夏季转为以蓝藻、绿藻和硅藻为主;秋季随着温度降低,蓝藻和绿藻减少,硅藻和甲藻再次占优势^[41]. 水文和营养盐等环境条件的快速变化同样会使浮游植物的群落结构和优势种发生改变,使个别门类的细胞数量占比大幅增加^[42],如许多富营养化的浅水湖泊中,蓝藻成为了夏季的常见优势种,大量繁殖,极易引发水华,产生神经毒素、细胞毒素和肝毒素等多种毒素和异味,引起水生生物的死亡和食物网结构的改变,严重损害人体的健康和生态系统的服务功能^[43]. 因此,蓝藻的大量生长需要引起足够的重视.

本研究中,春季有草区的叶绿素含量和浮游植物总生物量都明显地低于无草区. 这是由于春季沉水植物在与浮游植物竞争中占优势,占据了水体中的光和营养物质等条件,在一定程度上抑制了藻类的生物量^[2];研究已证实,沉水植物及其附着的生物膜会产生化感物质,抑制藻类和细菌的生物量^[44,45]. 此外,沉水植物还会为底栖生物提供栖息的环境,对藻类产生一定的牧食作用. 此时蓝藻的生物量均较低,春季不是蓝藻的最佳生长环境. 在夏季,虽然有草和无草区的 Chl-a 含量和浮游植物总生物量上未表现出明显差别,但由春夏两季有草区和无草区间蓝藻和总生物量的占比可知,尽管浮游藻类的总生物量和蓝藻的生物量在季节间存在较大的增加,但是在无草区,蓝藻占总生物量的比例并没有增长的趋势(分别为 17.02% 和 18.96%);而有

草区蓝藻占总生物量的比例有较大幅度的增长(分别为 13.63% 和 34.05%). 在有草区,夏季蓝藻所占的比例不仅高于春季的比例,同时也高于无草区夏季的蓝藻所占比例,大幅增加.

这是因为在菹草衰亡的生境中,蓝藻对营养盐的利用效率大大提升,即相同的水相磷浓度,蓝藻获得了更大的生长量. 首先,夏季蓝藻与其它藻类的营养竞争中常常处于优势地位. 蓝藻的最佳生长温度高于其它藻类(通常高于 25℃),在夏季表现出更好的生长速率和水华潜力^[46]. 其次,蓝藻对强光和弱光的耐受性都较好,如颤藻对光的耐受性较强,微囊藻会通过增加细胞内类胡萝卜素的含量来免受强光的抑制;在较低的光照条件下蓝藻可用较少的能量维持细胞的结构和功能,比硅藻或绿藻^[12]等具有更高的生长速率^[47]和生物量. 在菹草死亡时,水体浊度上升,其他种群的生长受到抑制,是利于蓝藻生长的正反馈环境. 此外某些蓝藻凭借伪空泡调节自身浮力,进而迁移到光照充足和营养丰富的表层水体区域,获得生长^[42]. 在本研究中,夏季时候,水温在有草区和无草区分别达到 $(29.9 \pm 1.5)^\circ\text{C}$ 和 $(31.0 \pm 1.4)^\circ\text{C}$,较春季上升. 适合蓝藻生长,加上菹草死亡为藻类的生长提供了较大生态位空缺,包括营养盐生态位和光的生态位等,蓝藻更有利于成为优势属. 此外,植株残体的分解,还会为水体提供大量的有机物^[48],为藻类生长提供碳源. 还有在植株死亡阶段,对藻类的抑制效应或释放的化感物质会突然消失,这种抑制效应突然消失对藻类生物群落的影响还不甚清楚和难以量化. 因此,有草区的蓝藻在营养盐的利用效率上远高于无草区.

3.3 菹草在自然湖泊中的恢复与管理

菹草现已经成为江淮平原地区浅水湖泊的主要优势类群之一,有研究发现,该区湖泊水生植物多样性降低. 例如,通过植被指数对东平湖的菹草识别发现,三十多年间菹草群落不断扩张,由湖岸边零星分布逐渐蔓延至全湖且连片式分布,且菹草覆盖的面积与湖水营养化的水平显著正相关^[15]. 夏季菹草整株死亡,分解和释放大量的营养盐,同时水底沉积物在悬浮作用变强,水体急剧变浑浊,同时腐烂的植株为水体提供了充足的有机质,为蓝藻的生长提供适宜的环境,使蓝藻对营养盐有更强的吸收和转化效率,获得较大的生物量^[44],并进一步引发蓝藻水华的暴发.

单一沉水植物的生长对水体环境并不是完全积极的. 当菹草在湖泊中生物量过大时,还会较大地抑制了其它水生植物的生存空间,阻碍其它物种的定居与扩展^[49],造成了湖泊水体高等植物的单一化,

不利于水生植物种群季节性的正常演替^[44]和湖泊生态系统的长期稳定. 此外, 菹草死亡时还会大量消耗水中的溶解氧, 甚至造成水底缺氧, 影响底栖生物的生存, 破坏水生环境的稳定性.

因此, 沉水植物的控制和管理非常重要, 特别是对于富营养化浅水湖泊的恢复^[7]; 要充分考虑沉水植物带来的二次污染^[18]. 在生态恢复的过程中, 应该对大型植物的选择与引种进行筛选^[3], 尽量选择沉水植物、漂浮植物等多种物种的镶嵌组合形式, 注重多种植物的演替行为, 增强对群落中菹草或其它水生植物的生物量控制^[49], 构建更具异质性和多样性的水体环境.

4 结论

菹草是浅水湖泊中的常见的沉水植物类群, 在江淮平原的一些浅水湖泊中已逐渐成为优势种, 并常作为沉水植物先锋种用于水体的生态修复. 菹草在生长过程中可以促进水中悬浮颗粒物的沉降, 改善水体光环境, 吸附水中营养物质并将其输送到植株体内或底泥中, 达到净化水质的效果. 但是, 在菹草大量腐烂的时候, 植株的分解和底泥再悬浮过程, 会使植物体和沉积物中的有机质和营养元素大量释放, 快速改变水环境, 引起藻类增殖, 尤其是富营养化湖泊中常见的蓝藻. 浑浊的水体环境和夏季的高温为蓝藻的生长提供了竞争优势, 加上充足的有机质和营养元素, 极大加重了富营养化湖泊中蓝藻水华暴发的风险, 对水体生态环境产生极其不利的影响. 因此, 亟需要加强对浅水湖泊中沉水植物的控制和管理, 在水生植物修复时, 注重水生植物的演替行为, 维持其在蓝藻易暴发的夏秋季的生长量, 构建更健康安全的水生生态系统群落结构.

参考文献:

- [1] Gao J Q, Xiong Z T, Zhang J D, *et al.* Phosphorus removal from water of eutrophic Lake Donghu by five submerged macrophytes [J]. *Desalination*, 2009, **242**(1-3): 193-204.
- [2] 鲜啟鸣, 陈海东, 邹惠仙, 等. 四种沉水植物的克藻效应 [J]. *湖泊科学*, 2005, **17**(1): 75-80.
Xian Q M, Chen H D, Zou H X, *et al.* Allelopathic effects of four submerged macrophytes on *Microcystis aeruginosa* [J]. *Journal of Lake Sciences*, 2005, **17**(1): 75-80.
- [3] Wang G X, Zhang L M, Chua H, *et al.* A mosaic community of macrophytes for the ecological remediation of eutrophic shallow lakes [J]. *Ecological Engineering*, 2009, **35**(4): 582-590.
- [4] Lv T, He Q K, Hong Y P, *et al.* Effects of water quality adjusted by submerged macrophytes on the richness of the epiphytic Algal Community [J]. *Frontiers in Plant Science*, 2019, **9**: 1980.
- [5] Søndergaard M, Johansson L S, Lauridsen T L, *et al.* Submerged macrophytes as indicators of the ecological quality of lakes [J]. *Freshwater Biology*, 2010, **55**(4): 893-908.
- [6] Gulati R D, Van Donk E. Lakes in the Netherlands, their origin, eutrophication and restoration: state-of-the-art review [A]. In: Nienhuis P H, Gulati R D, (Eds.). *Ecological Restoration of Aquatic and Semi-Aquatic Ecosystems in the Netherlands (NW Europe)* [M]. Dordrecht: Springer, 2002. 73-106.
- [7] Li C H, Wang B, Ye C, *et al.* The release of nitrogen and phosphorus during the decomposition process of submerged macrophyte (*Hydrilla verticillata* Royle) with different biomass levels [J]. *Ecological Engineering*, 2014, **70**: 268-274.
- [8] Wang L Z, Liu Q J, Hu C W, *et al.* Phosphorus release during decomposition of the submerged macrophyte *Potamogeton crispus* [J]. *Limnology*, 2018, **19**(3): 355-366.
- [9] Zhou X H, He Z L, Ding F H, *et al.* Biomass decaying and elemental release of aquatic macrophyte detritus in waterways of the Indian River Lagoon basin, South Florida, USA [J]. *Science of the Total Environment*, 2018, **635**: 878-891.
- [10] Carignan R, Kalff J. Phosphorus release by submerged macrophytes: significance to epiphyton and phytoplankton [J]. *Limnology and Oceanography*, 1982, **27**(3): 419-427.
- [11] 魏宏农, 潘建林, 赵凯, 等. 菹草附着物对营养盐浓度的响应及其与菹草衰亡的关系 [J]. *生态学报*, 2013, **33**(24): 7661-7666.
Wei H N, Pan J L, Zhao K, *et al.* Response of periphyton to nutrient level and relationships between periphyton and decay degree of *Potamogeton crispus* [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2013, **33**(24): 7661-7666.
- [12] Paerl H W, Huisman J. Blooms like it hot [J]. *Science*, 2008, **320**(5872): 57-58.
- [13] Shen Q S, Zhou Q L, Shang J G, *et al.* Beyond hypoxia: occurrence and characteristics of black blooms due to the decomposition of the submerged plant *Potamogeton crispus* in a shallow lake [J]. *Journal of Environmental Sciences*, 2014, **26**(2): 281-288.
- [14] 陈志刚, 林志军, 周晓红, 等. 菹草腐烂分解过程中污染物的动态释放 [J]. *干旱区资源与环境*, 2017, **31**(8): 153-159.
Chen Z G, Lin Z J, Zhou X H, *et al.* Pollutants dynamic release of *Potamogeton crispus* during decomposition process [J]. *Journal of Arid Land Resources and Environment*, 2017, **31**(8): 153-159.
- [15] 梁莉莉, 于泉洲, 邓焕广, 等. 基于时序 NDVI 的东平湖菹草 (*Potamogeton crispus* L.) 遥感提取及时空格局 [J]. *湖泊科学*, 2019, **31**(2): 529-538.
Liang L L, Yu Q Z, Deng H G, *et al.* Spatio-temporal pattern of *Potamogeton crispus* L. in Lake Dongping based on NDVI time series [J]. *Journal of Lake Sciences*, 2019, **31**(2): 529-538.
- [16] Song X X, Wang Z, Xiao B D, *et al.* Growth of *Potamogeton crispus* L. from turions in darkness: Implications for restoring submerged plants in eutrophic lakes [J]. *Ecological Engineering*, 2017, **101**: 255-260.
- [17] 任文君, 胡晓波, 刘霞, 等. 白洋淀菹草对富营养化水体总磷的净化 [J]. *应用生态学报*, 2011, **22**(4): 1053-1058.
Ren W J, Hu X B, Liu X, *et al.* Total phosphorus removal from eutrophic water in Baiyangdian Lake by *Potamogeton crispus* [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2011, **22**(4): 1053-1058.
- [18] Deng H G, Zhang J, Chen S Y, *et al.* Metal release/accumulation during the decomposition of *Potamogeton crispus* in a shallow macrophytic lake [J]. *Journal of Environmental Sciences*, 2016, **42**: 71-78.
- [19] Cao X Y, Wan L L, Xiao J, *et al.* Environmental effects by

- introducing *Potamogeton crispus* to recover a eutrophic lake[J]. Science of the Total Environment, 2018, **621**: 360-367.
- [20] 王苏民, 窦鸿身. 中国湖泊志[M]. 北京: 科学出版社, 1998. 281-282.
- [21] 胡鸿钧, 魏印心. 中国淡水藻类[M]. 北京: 科学出版社, 2006.
- Hu H J, Wei Y X. The freshwater algae of China[M]. Beijing: Science Press, 2006.
- [22] Rangel L M, Silva L H S, Rosa P, et al. Phytoplankton biomass is mainly controlled by hydrology and phosphorus concentrations in tropical hydroelectric reservoirs[J]. Hydrobiologia, 2012, **693**(1): 13-28.
- [23] Mazumder A. Phosphorus-chlorophyll relationships under contrasting herbivory and thermal stratification: predictions and patterns[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1994, **51**(2): 390-400.
- [24] Huo S L, He Z S, Ma C Z, et al. Spatio-temporal impacts of meteorological and geographic factors on the availability of nitrogen and phosphorus to algae in Chinese lakes[J]. Journal of Hydrology, 2019, **572**: 380-387.
- [25] Havens K E, Nürnberg G K. The phosphorus-chlorophyll relationship in lakes: potential influences of color and mixing regime[J]. Lake and Reservoir Management, 2004, **20**(3): 188-196.
- [26] Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods[A]. In: Kotz S, Johnson N L, (Eds). Breakthroughs in Statistics[M]. New York, NY: Springer, 1992. 196-202.
- [27] Vilas M P, Marti C L, Oldham C E, et al. Macrophyte-induced thermal stratification in a shallow urban lake promotes conditions suitable for nitrogen-fixing cyanobacteria[J]. Hydrobiologia, 2018, **806**(1): 411-426.
- [28] 刘金殿, 顾志敏, 杨元杰, 等. 长诏水库浮游植物群落结构及水质评价[J]. 生态学杂志, 2012, **31**(11): 2865-2871.
- Liu J D, Gu Z M, Yang Y J, et al. Phytoplankton community structure and water quality assessment of Changzhao Reservoir, Zhejiang of East China[J]. Chinese Journal of Ecology, 2012, **31**(11): 2865-2871.
- [29] Qiu D R, Wu Z B, Liu B Y, et al. The restoration of aquatic macrophytes for improving water quality in a hypertrophic shallow lake in Hubei Province, China[J]. Ecological Engineering, 2001, **18**(2): 147-156.
- [30] 曹昀, 王国祥. 冬季菹草对悬浮泥沙的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2007, **23**(1): 54-56.
- Cao Y, Wang G X. Effects of submersed plant *Potamogeton crispus* on suspended mud and sand[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2007, **23**(1): 54-56.
- [31] 李琳琳, 汤祥明, 高光, 等. 沉水植物生态修复对西湖细菌多样性及群落结构的影响[J]. 湖泊科学, 2013, **25**(2): 188-198.
- Li L L, Tang X M, Gao G, et al. Influence of submerged vegetation restoration on bacterial diversity and community composition in West Lake[J]. Journal of Lake Sciences, 2013, **25**(2): 188-198.
- [32] 卢少勇, 陈建军, 覃进, 等. 扰动强度对菹草浸泡过程中氮磷碳释放的影响[J]. 环境科学, 2011, **32**(7): 1940-1944.
- Lu S Y, Chen J J, Qin J, et al. Influence of disturbance intensity on nitrogen, phosphorus and permanganate index release of *Potamogeton crispus* during soaking in water[J]. Environmental Science, 2011, **32**(7): 1940-1944.
- [33] 马永才, 李英, 韩永生, 等. 总有机碳与高锰酸盐指数及化学需氧量的相关性[J]. 环境监测管理与技术, 2001, **3**(13): 40-41.
- [34] 朱庆川, 杨卫东, 程红. 菹草在水中腐烂分解试验研究[J]. 现代农业科技, 2013, (23): 224-226, 229.
- Zhu Q C, Yang W D, Cheng H. Test of *Potamogeton crispus* decomposing in water[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2013, (23): 224-226, 229.
- [35] Zhou X H, Wang M Y, Wen C Z, et al. Nitrogen release and its influence on anammox bacteria during the decay of *Potamogeton crispus* with different values of initial debris biomass[J]. Science of the Total Environment, 2019, **650**: 604-615.
- [36] 潘慧云, 徐小花, 高士祥. 沉水植物衰亡过程中营养盐的释放过程及规律[J]. 环境科学研究, 2008, **21**(1): 64-68.
- Pan H Y, Xu X H, Gao S X. Study on process of nutrition release during the decay of submerged macrophytes[J]. Research of Environmental Sciences, 2008, **21**(1): 64-68.
- [37] Zhou Y W, Zhou X H, Han R M, et al. Reproduction capacity of *Potamogeton crispus* fragments and its role in water purification and algae inhibition in eutrophic lakes[J]. Science of the Total Environment, 2017, **580**: 1421-1428.
- [38] 雷泽湘, 徐德兰, 顾继光, 等. 太湖大型水生植物分布特征及其对湖泊营养盐的影响[J]. 农业环境科学学报, 2008, **27**(2): 698-704.
- Lei Z X, Xu D L, Gu J G, et al. Distribution characteristics of aquatic macrophytes and their effects on the nutrients of water and sediment in Taihu Lake[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2008, **27**(2): 698-704.
- [39] Jacoby J M, Collier D C, Welch E B, et al. Environmental factors associated with a toxic bloom of *Microcystis aeruginosa*[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2000, **57**(1): 231-240.
- [40] Yang J, Lv H, Liu L M, et al. Decline in water level boosts cyanobacteria dominance in subtropical reservoirs[J]. Science of the Total Environment, 2016, **557-558**: 445-452.
- [41] 胡韧, 雷腊梅, 韩博平. 南亚热带大型贫营养水库浮游植物群落结构与季节变化——以新丰江水库[J]. 生态学报, 2008, **28**(10): 4652-4664.
- Hu R, Lei L M, Han B P. Phytoplankton assemblage and seasonal dynamics in the large oligotrophic Xinfengjiang reservoir in southern China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, **28**(10): 4652-4664.
- [42] 卫志宏, 张利仙, 杨四坤, 等. 洱海浮游植物群落结构及季节演替[J]. 水生态学杂志, 2012, **33**(4): 21-25.
- Wei Z H, Zhang L X, Yang S K, et al. Community structure and seasonal succession of phytoplankton in Erhai Lake[J]. Journal of Hydroecology, 2012, **33**(4): 21-25.
- [43] 董静, 高云霓, 李根保. 淡水湖泊浮游藻类对富营养化和气候变暖的响应[J]. 水生生物学报, 2016, **40**(3): 615-623.
- Dong J, Gao Y N, Li G B. A review: responses of phytoplankton communities to eutrophication and climate warming in freshwater lakes[J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2016, **40**(3): 615-623.
- [44] 杨文斌, 王国祥. 南京玄武湖菹草种群的环境效应[J]. 湖泊科学, 2007, **19**(5): 572-576.
- Yang W B, Wang G X. Environmental effects of *Potamogeton crispus* population in Lake Xuanwu, Nanjing[J]. Journal of Lake Sciences, 2007, **19**(5): 572-576.
- [45] Nakai S, Inoue Y, Hosomi M, et al. *Myriophyllum spicatum*-released allelopathic polyphenols inhibiting growth of blue-green algae *Microcystis aeruginosa*[J]. Water Research, 2000, **34**(11): 3026-3032.
- [46] Paerl H W, Otten T G. Harmful cyanobacterial blooms: causes, consequences, and controls[J]. Microbial Ecology, 2013, **65**

- (4): 995-1010.
- [47] 孔繁翔, 高光. 大型浅水富营养化湖泊中蓝藻水华形成机理的思考[J]. 生态学报, 2005, **25**(3): 589-595.
Kong F X, Gao G. Hypothesis on cyanobacteria bloom-forming mechanism in large shallow eutrophic lakes[J]. Acta Ecologica Sinica, 2005, **25**(3): 589-595.
- [48] 金送笛, 李永函, 倪彩虹, 等. 菹草(*Potamogeton crispus*)对水中氮、磷的吸收及若干影响因素[J]. 生态学报, 1994, **14**(2): 168-173.
Jin S D, Li Y H, Ni C H, et al. Uptake by *Potamogeton crispus* of nitrogen and phosphorus from water and some affecting factors [J]. Acta Ecologica Sinica, 1994, **14**(2): 168-173.
- [49] 徐伟伟, 胡维平, 邓建才, 等. 菹草生物量控制对群落中沉水植物生长及水质的影响[J]. 生态环境学报, 2015, **24**(7): 1222-1227.
Xu W W, Hu W P, Deng J C, et al. Influence of harvesting *Potamogeton crispus* in a submerged plant community on the growth of submerged aquatic plants and their effects on water quality [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, **24**(7): 1222-1227.

欢迎订阅 2020 年《环境科学》

《环境科学》创刊于 1976 年,由中国科学院主管,中国科学院生态环境研究中心主办,是我国环境科学学科中最早创刊的学术性期刊。

《环境科学》自创刊以来,始终坚持“防治污染,改善生态,促进发展,造福人民”的宗旨,报道我国环境科学领域内具有创新性高水平,有重要意义的基础研究和应用研究成果,以及反映控制污染,清洁生产和生态环境建设等可持续发展的战略思想、理论和实用技术等。

《环境科学》在国内外公开发行,并在国内外科技界有较大影响,被国内外一些重要检索系统收录,如工程索引 Ei Compendex;医学索引 MEDLINE; Scopus; 化学文摘 CA;俄罗斯文摘杂志 AJ;美国生物学文摘预评 BP;美国医学索引 IM;日本科学技术情报中心数据库 JICST;英国动物学记录 ZR;剑桥科学文摘(CSA); Environmental Sciences;剑桥科学文摘(CSA); Pollution Abstracts;剑桥科学文摘(CAS); Life Sciences Abstracts 等;国内的检索系统有中国科技论文统计与引文数据库(CSTPCD);中文科技期刊数据库(维普);中国期刊全文数据库(CNKI);数字化期刊全文数据库(万方);中国科学引文数据库(CSCD);中国生物学文摘等。

全国各地邮局均可订阅,如有漏订的读者可直接与编辑部联系,办理补订手续。

国内统一连续出版物号:CN 11-1895/X

国际标准连续出版物号:ISSN 0250-3301

国外发行代号:M 205

国内邮发代号:2-821

编辑部地址:北京市海淀区双清路 18 号(2871 信箱) 邮编:100085

电话:010-62941102;传真:010-62849343;E-mail:hjcx@rcees.ac.cn;网址:www.hjcx.ac.cn

CONTENTS

Characterization of Two Heavy Pollution Episodes in Tianjin in 2020	XIAO Zhi-mei, XU Hong, CAI Zi-ying, <i>et al.</i> (3879)
Analysis of Characteristics of Water-soluble Ions in PM _{2.5} in Chengdu Based on the MARGA	YIN Han-mei, CHEN Jun-hui, FENG Xiao-qiong, <i>et al.</i> (3889)
Seasonal Characteristics and Source Analysis of Water-soluble Inorganic Ions in PM _{2.5} in Suqian City	MA Hong-lu, ZHAO Xin, LU Jian-gang, <i>et al.</i> (3899)
Characterization and Size Distribution of Carbonaceous Aerosols at Mountain Dinghu	LI An-na, WEN Tian-xue, HUA Wei, <i>et al.</i> (3908)
Characteristics and Source Apportionment of Carbon Components in Road Dust in Anshan	LIN Zi, JI Ya-qin, LIN Yu, <i>et al.</i> (3918)
Spectral Characteristics and Source Analysis of WSOC of PM _{2.5} in Winter of Xi'an	YANG Yi, ZHANG Ya-nan, LIU Huan-wu, <i>et al.</i> (3924)
Observation of Aerosol Optical Properties and New Particle Formation in the Yangtze River Delta	DU Ying-ying, CHEN Jun, ZHANG Jia-luo, <i>et al.</i> (3932)
Component Characteristics and Source Appointment of Volatile Organic Compounds in Lianyungang City	CUI Jin-meng, WANG Ti-jian, LI Qiu-tong, <i>et al.</i> (3941)
Seasonal Pollution Characteristics and Analysis of the Sources of Atmospheric VOCs in Chengdu Urban Area	WANG Cheng-hui, CHEN Jun-hui, HAN Li, <i>et al.</i> (3951)
Ozone Sensitivity Analysis and Emission Controls in Dezhou in Summer	YAN Ru-sha (3961)
Inventory and Distribution Characteristics of China's Thermal Power Emissions Under Ultra-Low Reconstruction	QU Jia-bao, WANG Peng, BO Xin, <i>et al.</i> (3969)
Establishment and Spatial Distribution of Anthropogenic Ammonia Emission Inventory in Zhejiang Province	ZHAO Rui-dong, YU Xing-na, HOU Xin-hong, <i>et al.</i> (3976)
Evaluation and Screening of Dioxin Control Technology in Waste Incineration Flue Gas	ZHAO Si-lan, XI Peng-fei, GUO Feng-yan, <i>et al.</i> (3985)
Characteristics of Stable Isotopes and Moisture Sources of Two Typical Precipitation Events in Lanzhou City	HAN Ting-ting, ZHANG Ming-jun, WANG Sheng-jie, <i>et al.</i> (3993)
Hydrochemical Characteristics and Possible Controls of the Surface Water in Ranwu Lake Basin	ZHANG Tao, WANG Ming-guo, ZHANG Zhi-yin, <i>et al.</i> (4003)
Chemical Evolution and Formation Mechanism of Groundwater in Hetao Irrigation Area	CUI Jia-qi, LI Xian-yue, SHI Hai-bin, <i>et al.</i> (4011)
Chemical Characteristics of Groundwater and Material Sources Analysis in Shiqi River Basin	LI Xiao, YU Shi, LI Liang, <i>et al.</i> (4021)
Spatial-temporal Variations and Driving of Nitrogen and Phosphorus Ratios in Lakes in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River	JI Peng-fei, XU Hai, ZHAN Xu, <i>et al.</i> (4030)
Spatiotemporal Variations in Nutrient Loads in River-lake System of Changdang Lake Catchment in 2016-2017	LI Xin-yan, LI Heng-peng, JIANG San-yuan, <i>et al.</i> (4042)
Influence of <i>Potamogeton crispus</i> on Lake Water Environment and Phytoplankton Community Structure	KANG Li-juan, XU Hai, ZOU Wei, <i>et al.</i> (4053)
Phylogenetic Processes and Key Driving Factors of Bacterial Communities in Jinze Reservoir	LIU Ming-kun, TONG Jun, ZHU Hui-feng, <i>et al.</i> (4062)
Distribution Characteristics of Per-/polyfluoralkyl Substances in River Sediments Around Typical Fluorine Industrial Parks	SUN Lin-ting, ZHAO Zhen, TANG Jian-hui (4069)
Microplastics-Induced Shifts of Diversity and Abundance of Antibiotic Resistance Genes in River Water	ZHOU Xin-yuan, WANG Yan-zi, SU Jian-qiang, <i>et al.</i> (4076)
Pollution Characteristics and Risk Assessment of Antibiotics in Lianhua Reservoir	LIAO Jie, WEI Xiao-qin, XIAO Yan-qin, <i>et al.</i> (4081)
Intraspecific Variation in Growth and Alkaline Phosphatase Activity of <i>Cylindrospermopsis raciborskii</i> Strains in Response to Different Phosphorus Concentrations and Sources	YE Jin-mei, ZHAO Li, LUO Xu, <i>et al.</i> (4088)
Simulation of Water Quality Response of Guishui River Wetland Plants and Water Diversion	LI Ya-juan, DU Yan-liang, BI Er-ping, <i>et al.</i> (4095)
Performance Assessment of Field-scale Dry Grass Swale with Shallow Substrate Layer	ZHANG Jia-wei, LI Tian, ZHANG Ting-xiu (4105)
Transition of Particulate Pollutant in the Parcel-based Catchment of Sponge City	LI Jia, XIE Wen-xia, JIANG Zhi-hui, <i>et al.</i> (4113)
Adsorption of Sb(V) in Water by Natural Pyrite: Performance and Mechanism	SHI Song, WU Qian-yuan, LI Xin-zheng, <i>et al.</i> (4124)
Treatment of Wastewater Containing Naphthalene Sulfonic Acid by Persulfate Oxidation	ZHANG Jin-men, LU Jun, LIU Xiao-chen, <i>et al.</i> (4133)
Effect of Temperature on Performance and Microbial Community Structure of Anaerobic Biofilter-Treated Domestic Wastewater	LIU Zhi-bin, LIU Xiu-hong, ZHOU Tong, <i>et al.</i> (4141)
Start-up and Optimization of Denitrifying Phosphorus Removal in ABR-MBR Coupling Process	MIAO Xin-nian, WANG Qian, GUO Kai-cheng, <i>et al.</i> (4150)
Adaptability of Completely Autotrophic Nitrogen Removal over Granular Sludge to Low-Strength at Low Temperature	LIU Yu-xin, WANG Jian-fang, QIAN Fei-yue, <i>et al.</i> (4161)
Discussion on Key Issues of Geochemical Monitoring of Soil Heavy Metal in Xiongan New District	GUO Zhi-juan, ZHOU Ya-long, YANG Zheng, <i>et al.</i> (4169)
Quantitative Assessment of Human Health Risks Based on Soil Heavy Metals and PAHs Sources: Take a Polluted Industrial Site of Beijing As an Example	WU Zhi-yuan, ZHANG Li-na, XIA Tian-xiang, <i>et al.</i> (4180)
Ecological Risk Assessment of Heavy Metals at Township Scale in the High Background of Heavy Metals, Southwestern, China	ZHANG Fu-gui, PENG Min, WANG Hui-yan, <i>et al.</i> (4197)
Potential of Accumulation and Application of Dominant Plants in Lanping Lead-zinc Mine, Yunnan Province	ZHANG Long, ZHANG Yun-xia, SONG Bo, <i>et al.</i> (4210)
Key Growth Stage of Pb Accumulation in Rice Through a Hydroponic Experiment with Pb Stress	HU Yu-dan, ZHOU Hang, GU Jiao-feng, <i>et al.</i> (4218)
Effect of Nutrient Regulation and Control on Cd Accumulation Efficiency of <i>Hylotelephium spectabile</i> Under Field Conditions	GUO Jun-mei, YANG Jun-xing, YANG Jun, <i>et al.</i> (4226)
Effects of <i>Eucalyptus</i> Branches Biochar Application on Soil Physicochemical Properties of Acidified Soil in a <i>Eucalyptus</i> plantation in Northern Guangxi	DAUN Chun-yan, SHEN Yu-yi, XU Guang-ping, <i>et al.</i> (4234)
Dynamic Effects of Direct Returning of Straw and Corresponding Biochar on Acidity, Nutrients, and Exchangeable Properties of Red Soil	YANG Cai-di, LU Sheng-gao (4246)
Different Responses of Soil Microbial Community Structure to Irrigation with Treated Wastewater from Domestic and Industrial Sources	WANG Yan, CHENG Dong-hui, TAN Wen-bing, <i>et al.</i> (4253)
Effects of Manure and Organic Fertilizer Application on Soil Microbial Community Diversity in Paddy Fields	LI Peng, WU Jian-qiang, SHA Chen-yan, <i>et al.</i> (4262)
Effects of Land Use Changes on Soil Bacterial Community Diversity in the Riparian Wetland Along the Downstream of Songhua River	ZHANG Tuo, XU Fei, HUAI Bao-dong, <i>et al.</i> (4273)
Response of Soil Bacterial Community Structure to Precipitation Change in Grassland of Loess Plateau	LI Na, WANG Bao-rong, AN Shao-shan, <i>et al.</i> (4284)
Effect of Land-use on Soil Fungal Community Structure and Associated Functional Group in Huixian Karst Wetland	CHENG Yue-yang, JIN Zhen-jiang, WANG Xiao-tong, <i>et al.</i> (4294)
Interactions of Fungi Community and Relationship with the Carbon Structure in Arable Mollisols with Gradient Organic Matter Content	SHANG Qiu-tong, HUANG Rui-lin, NI Hao-wei, <i>et al.</i> (4305)
Diversity of Soil Eukaryotic Microbes in Different Succession Stages in Maolan Karst Forest of Guizhou	WANG Xian, LONG Jian, LI Juan, <i>et al.</i> (4314)
Adsorption of Cadmium and Arsenic by Corn Stalk Biochar Solidified Microorganism	LIU Yu-ling, ZHU Hu-cheng, PENG Ou, <i>et al.</i> (4322)
Mechanism of Inorganic Nitrogen Transformation and Identification of Nitrogen Sources in Water and Soil	LIANG Xing, SUN Li-qun, ZHANG Xin, <i>et al.</i> (4333)