

方知库  
Eco-Environmental  
Knowledge Web

# 环境科学

ENVIRONMENTAL SCIENCE

ISSN 0250-3301 CODEN HCKHDV  
HUANJING KEXUE

■ 主办 中国科学院生态环境研究中心  
■ 出版 科学出版社



2020

Vol.41 No.9  
第41卷 第9期



目次

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2020年天津市两次重污染天气污染特征分析·····                        | 肖致美,徐虹,蔡子颖,李鹏,刘彬,元洁,郑乃源,唐遨,陈魁,邓小文(3879)            |
| 基于高分辨率MARGA分析成都市PM <sub>2.5</sub> 中水溶性离子污染特征····· | 尹寒梅,陈军辉,冯小琼,姜涛,钱骏,刘政(3889)                         |
| 宿迁市PM <sub>2.5</sub> 中水溶性无机离子的季节特征和来源分析·····      | 马红璐,赵欣,陆建刚,王辉,许纯领,欧阳琰,朱新胜,殷堂兵,漆丹,陆亚秋,汪玖阳,陆声兴(3899) |
| 鼎湖山大气颗粒物中OC与EC的浓度特征及粒径分布·····                     | 李安娜,温天雪,华维,杨员,孟泽,胡波,辛金元(3908)                      |
| 鞍山市道路扬尘碳组分特征及来源解析·····                            | 林孜,姬亚芹,林宇,国纪良,马妍,赵静琦(3918)                         |
| 西安市冬季PM <sub>2.5</sub> 中WSOC的光谱特性和来源解析·····       | 杨毅,张亚楠,刘焕武,田萍萍,李亚飞,雷颖,王一博(3924)                    |
| 长三角地区气溶胶光学性质与新粒子生成观测·····                         | 杜盈盈,陈军,张家洛,甘桂城,刘瑜存,苏明旭,楼晟荣,周敏,陶士康,乔利平(3932)        |
| 连云港市挥发性有机化合物的组分特征及来源解析·····                       | 崔金梦,王体健,李秋潼,董立文,黄丛丞,曹云擎(3941)                      |
| 成都市城区大气VOCs季节污染特征及来源解析·····                       | 王成辉,陈军辉,韩丽,徐晨曦,王波,李英杰,刘政,钱骏(3951)                  |
| 德州市夏季臭氧敏感性特征及减排方案·····                            | 严茹莎(3961)                                          |
| 超低改造下中国火电排放清单及分布特征·····                           | 屈加豹,王鹏,伯鑫,薛晓达,董广霞,崔磊,康明雄,王彤,汤铃,朱法华,李时蓓(3969)       |
| 浙江省人为源氨排放清单建立及分布特征·····                           | 赵睿东,于兴娜,侯新红,沈丽(3976)                               |
| 垃圾焚烧烟气中二噁英控制技术的评估与筛选·····                         | 赵思岚,奚鹏飞,郭凤艳,邓双,贾建丽(3985)                           |
| 兰州市两场典型降水事件稳定同位素特征及其水汽来源·····                     | 韩婷婷,张明军,王圣杰,杜勤勤,马转转,郭蓉,曹晏风(3993)                   |
| 然乌湖流域地表水水化学特征及控制因素·····                           | 张涛,王明国,张智印,刘廷,何锦(4003)                             |
| 河套灌区地下水化学演变特征及形成机制·····                           | 崔佳琪,李仙岳,史海滨,孙亚楠,安海军,邢进平(4011)                      |
| 石期河流域地下水化学特征及物质来源分析·····                          | 李笑,于爽,李亮,郭永丽(4021)                                 |
| 长江中下游湖泊水体氮磷时空变化特征及其影响因素·····                      | 季鹏飞,许海,詹旭,朱广伟,邹伟,朱梦圆,康丽娟(4030)                     |
| 2016~2017年长荡湖流域湖库系统营养盐时空分布机制分析·····               | 李新艳,李恒鹏,姜三元,马培,赖锡军,邓建才,陈东强,耿建伟(4042)               |
| 菹草对湖泊水质及浮游植物群落结构的影响·····                          | 康丽娟,许海,邹伟,朱广伟,朱梦圆,季鹏飞,陈洁(4053)                     |
| 金泽水库库区细菌群落构建过程与关键驱动因子分析·····                      | 刘明坤,童俊,朱慧峰,白晓慧(4062)                               |
| 典型氟工业园周边河流沉积物中全(多)氟化合物的分布特征·····                  | 孙琳婷,赵祯,唐建辉(4069)                                   |
| 微塑料对河水抗生素抗性基因的影响·····                             | 周昕原,王言仔,苏建强,黄福义(4076)                              |
| 莲花水库水体中抗生素污染特征及生态风险评价·····                        | 廖杰,魏晓琴,肖燕琴,李青松,范洪勇,刘学军,庄马展,刘超翔(4081)               |
| 拟柱孢藻生长及碱性磷酸酶活性对不同磷浓度和磷形态响应的株系间差异·····             | 叶金梅,赵莉,罗旭,彭亮,雷腊梅(4088)                             |
| 奶水河湿地植物作用及调水水质响应模拟·····                           | 李亚娟,杜彦良,毕二平,王亮,陈翠柏(4095)                           |
| 浅基质层干植草沟运行效果的现场实验·····                            | 张佳炜,李田,张庭秀(4105)                                   |
| 海绵城市地块汇水区颗粒污染物的传输·····                            | 李佳,谢文霞,姜智绘,单溪环,廖云杰,赵洪涛,李叙勇(4113)                   |
| 天然黄铁矿吸附去除水中Sb(V):性能与机制·····                       | 石松,吴乾元,李新正,黄满红(4124)                               |
| 过硫酸盐氧化处理含苯磺酸废水·····                               | 章晋门,卢钧,刘晓琛,陈泉源(4133)                               |
| 温度对城市污水厌氧生物滤池运行效果与菌群结构的影响·····                    | 刘智斌,刘秀红,周桐,章世勇,李健敏,杨庆(4141)                        |
| ABR-MBR耦合工艺启动及优化反硝化除磷性能·····                      | 缪新年,汪倩,郭凯成,刘文如,沈耀良(4150)                           |
| 低温下全自养脱氮颗粒污泥适应低基质效能·····                          | 刘雨馨,王建芳,钱飞跃,陈倩苗,乔伟,沈聪(4161)                        |
| 雄安新区土壤重金属地球化学监测关键问题探讨·····                        | 郭志娟,周亚龙,杨峥,赵传冬,成杭新,孔牧,彭敏(4169)                     |
| 基于土壤重金属及PAHs来源的人体健康风险定量评价:以北京某工业污染场地为例·····       | 吴志远,张丽娜,夏天翔,贾晓洋,李慧颖,王世杰(4180)                      |
| 基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价·····                  | 张富贵,彭敏,王惠艳,马宏宏,徐仁廷,成晓梦,侯召雷,陈子万,李括,成杭新(4197)        |
| 云南兰坪铅锌矿区优势植物重金属富集特性及应用潜力·····                     | 张龙,张云霞,宋波,吴勇,周子阳(4210)                             |
| 水培试验下水稻Pb吸收累积关键生育期·····                           | 胡雨丹,周航,辜娇峰,霍洋,邓鹏辉,魏宾纭,刘俊,廖柏寒(4218)                 |
| 田间条件下养分调控八宝景天Cd修复效率·····                          | 郭俊梅,杨俊兴,杨军,郑国砥,周小勇,陈同斌,卞建林,孟晓飞,李玉峰(4226)           |
| 桉树枝条生物炭输入对桂北桉树人工林酸化土壤的作用效果·····                   | 段春燕,沈育伊,徐广平,滕秋梅,张德楠,何成新,张中峰,周龙武,孙英杰(4234)          |
| 秸秆直接还田和炭化还田对红壤酸度、养分和交换性能的动态影响·····                | 杨彩迪,卢升高(4246)                                      |
| 土壤微生物群落结构对生活源和工业源再生水灌溉的差异化响应·····                 | 王燕,程东会,檀文炳,余红,席北斗,姜永海,党秋玲(4253)                    |
| 粪肥和有机肥施用对稻田土壤微生物群落多样性影响·····                      | 理鹏,吴建强,沙晨燕,叶春梅,黄沈发(4262)                           |
| 松花江下游沿江湿地土地利用变化对土壤细菌群落多样性的影响·····                 | 张拓,徐飞,怀宝东,杨雪,隋文志(4273)                             |
| 黄土高原草地土壤细菌群落结构对于降水变化的响应·····                      | 李娜,王宝荣,安韶山,焦峰,黄倩(4284)                             |
| 土地利用方式对会仙岩溶湿地土壤真菌群落和功能类群的影响·····                  | 程跃扬,靳振江,王晓彤,贾远航,袁武,周军波(4294)                       |
| 黑土真菌群落互作及其与梯度有机质碳分子结构的关系·····                     | 尚秋彤,黄瑞林,倪浩为,隋跃宇,孙波,梁玉婷(4305)                       |
| 贵州茂兰喀斯特森林不同演替下土壤真核微生物多样性·····                     | 王显,龙健,李娟,刘灵飞,廖洪凯,李宜蓉,杨睿(4314)                      |
| 玉米秸秆生物炭固化细菌对镉砷吸附·····                             | 刘玉玲,朱虎成,彭鸥,李丹阳,杨蕊嘉,彭晶,铁柏清(4322)                    |
| 无机态氮素转化机制及水土体氮源识别方法·····                          | 梁杏,孙立群,张鑫,张洁,付鹏宇(4333)                             |
| 《环境科学》征订启事(4061)                                  |                                                    |
| 《环境科学》征稿简则(4132)                                  |                                                    |
| 信息(4233, 4293, 4304)                              |                                                    |

# 水培试验下水稻 Pb 吸收累积关键生育期

胡雨丹<sup>1</sup>, 周航<sup>1,2\*</sup>, 辜娇峰<sup>1,2\*</sup>, 霍洋<sup>1</sup>, 邓鹏辉<sup>1</sup>, 魏宾纭<sup>1</sup>, 刘俊<sup>3</sup>, 廖柏寒<sup>1,2</sup>

(1. 中南林业科技大学环境科学与工程学院, 长沙 410004; 2. 稻米品质安全控制湖南省工程实验室, 长沙 410004; 3. 有色金属矿区耕地重金属污染生态阻抗技术研究衡阳市重点实验室, 衡阳 421001)

**摘要:** 水稻不同生育期对 Pb 的吸收累积差异明显. 本研究通过水培试验, 分别在水稻不同生育期(分蘖期、拔节期、孕穗期、灌浆期、蜡熟期和成熟期)和全生育期添加  $0.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  的外源 Pb, 以全生育期不添加外源 Pb 作为对照, 研究水稻不同生育期 Pb 吸收累积的影响, 明确水稻吸收累积 Pb 的关键生育时期及对水稻植株和糙米 Pb 累积的贡献. 结果表明: ①单一生育期 Pb 胁迫处理时, 水稻株高和分蘖数差异不明显, 而全生育期 Pb 胁迫处理下水稻株高和生物量均受到明显抑制; ②水稻成熟后不同部位的 Pb 含量差异表现为: 根系 > 茎节 1 > 其他茎节 > 根基茎 > 茎 > 叶 > 穗轴 > 谷壳 > 糙米; 不同生育期处理下糙米 Pb 含量范围为  $0.1 \sim 1.2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ , 其顺序为: 孕穗期 Pb 胁迫 > 拔节期 Pb 胁迫 > 分蘖期 Pb 胁迫 > 灌浆期 Pb 胁迫 > 成熟期 Pb 胁迫 > 蜡熟期 Pb 胁迫; ③水稻植株 Pb 累积量相对贡献率在水稻生殖生长期(灌浆期、蜡熟期和成熟期)较大, 而水稻地上部位 Pb 累积量相对贡献率在水稻营养生长期(分蘖期、拔节期和孕穗期)较大; ④孕穗期是糙米 Pb 累积的关键生育期, 对糙米 Pb 累积的相对贡献率为 43.3%, 其次是拔节期和分蘖期处理, 相对贡献率分别为 24.4% 和 21.3%; ⑤建议在水稻孕穗期适度采用淹水灌溉、施加改良剂或叶面阻控等技术措施, 以降低糙米 Pb 累积, 实现 Pb 污染稻田安全利用.

**关键词:** 生育期; 糙米; Pb 胁迫; 累积; 相对贡献率; 茎节

中图分类号: X171.5 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2020)09-4218-08 DOI: 10.13227/j.hjxx.202002179

## Key Growth Stage of Pb Accumulation in Rice Through a Hydroponic Experiment with Pb Stress

HU Yu-dan<sup>1</sup>, ZHOU Hang<sup>1,2\*</sup>, GU Jiao-feng<sup>1,2\*</sup>, HUO Yang<sup>1</sup>, DENG Peng-hui<sup>1</sup>, WEI Bin-yun<sup>1</sup>, LIU Jun<sup>3</sup>, LIAO Bo-han<sup>1,2</sup>

(1. College of Environmental Science and Engineering, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, China; 2. Hunan Engineering Laboratory for Control of Rice Quality and Safety, Changsha 410004, China; 3. Key Laboratory of Hengyang City on Ecological Impedance Technology of Heavy Metal Pollution in Cultivated Soil of Nonferrous Metal Mining Area, Hengyang 421001, China)

**Abstract:** Pb accumulation in rice varies significantly at different growth stages. In this study, a hydroponic experiment was conducted to study the effects of exogenous Pb stress on Pb accumulation and transportation in rice plants and determine the key rice growth stages of Pb accumulation and their contribution to the Pb content in brown rice. For the hydroponic experiment,  $0.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  of exogenous Pb was added to rice at different growth stages, including the tillering stage, jointing stage, booting stage, filling stage, dough stage, maturing stage, and whole growth stage (103 d) of the rice plant. Another treatment of the whole growth stage without Pb stress was established as the control. The results showed that: ① There were no significant effects of Pb stress in any single stage on the plant height, tiller number, and biomass, but the rice plant height and biomass significantly decreased under the Pb stress for the whole growth period. ② Pb contents in different tissues at the maturing stage of the rice plant were in the order of root > stem node 1 > other stem nodes > root rhizome > stem > leaf > ear > husk > brown rice. Pb contents in brown rice ranged from  $0.1$  to  $1.2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$  for all exogenous Pb treatments, and ranked in the growth stages as booting stage > jointing stage > tillering stage > filling stage > maturing stage > dough stage. ③ The relative contribution rates of Pb accumulation in the whole rice plants were relatively high during the reproductive growth period (filling stage, dough stage, and maturing stage), while those in the above-ground parts of the rice plants were relatively high during the vegetative growth stage (tillering stage, jointing stage, booting stage). ④ The booting stage was the key growth period for Pb accumulation in brown rice. Pb stress at this stage contributed 43.3% of Pb content in brown rice, followed by Pb stress at the jointing stage and the tillering stage, with contribution rates of 24.4% and 21.3%, respectively. ⑤ Water management regimes, application of amendments, or leaf resistance control techniques should be applied appropriately at the booting stage of the rice plants to reduce Pb accumulation in brown rice and to realize the safe use of rice paddies polluted with Pb.

**Key words:** growth stage; brown rice; Pb stress; accumulation; relative contribution rate; stem node

全球土壤中重金属铅(Pb)污染问题严重, 采矿 冶炼、固废堆置和污水灌溉等人类活动加剧了土壤

收稿日期: 2020-02-25; 修订日期: 2020-03-09

基金项目: 湖南省自然科学基金项目(2018JJ3881); 国家重点研发计划项目(2016YFD0800705); 长沙市科技计划项目(kq1901138)

作者简介: 胡雨丹(1997~), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为土壤重金属污染控制, E-mail: 1130985143@qq.com

\* 通信作者, E-mail: zhouhang4607@163.com; gujiaofeng@163.com

重金属污染<sup>[1]</sup>. Pb 具有高毒性,不可被生物降解<sup>[2]</sup>,土壤中过量 Pb 会对水稻品质产生不利影响,并通过食物链对人类健康构成威胁<sup>[3]</sup>. 据报道,我国华南和华中地区 15 个水稻主产区产出的稻米中,有 12.9% 的样品 Pb 含量超过  $Pb \leq 0.2 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$  的标准限值<sup>[4, 5]</sup>. 因此,土壤 Pb 污染导致的稻米 Pb 超标问题亟需解决.

近年来,水稻对重金属的吸收、转运和累积受到广泛关注. 水稻对重金属的吸收很大程度上取决于重金属在土壤中的有效性和植株中的迁移转运过程<sup>[6]</sup>. 有研究发现,水稻不同生育期由于生长状况和营养需求等因素的影响,对重金属的吸收与转运差异明显. 王倩倩等<sup>[7]</sup>和叶长城等<sup>[8]</sup>通过水培试验结果表明,水稻糙米 Cd 累积的关键生育期为灌浆期和成熟期. 彭华等<sup>[9]</sup>通过在水稻分蘖期和孕穗期施用硅肥发现,水稻糙米中 Cd 含量比未施硅肥下降 25.3%. Zhou 等<sup>[10]</sup>通过测定不同生育时期水稻各部位 Cd 含量表明,叶片中累积的 Cd 在孕穗期到成熟期进行了再转运,对糙米中 Cd 累积的贡献率为 22.5%~30.0%. 刘昭兵等<sup>[11]</sup>通过采集不同生育期水稻研究发现,根系、茎和叶中 Cd 和 Pb 含量为:分蘖期>成熟期>抽穗期. 还有研究表明,糙米中 Pb 的累积是通过水稻籽粒发育过程中根的吸收、根-茎转运及茎-谷粒转运而来<sup>[12, 13]</sup>. 当前大量研究都聚焦于水稻不同生育期 Cd 的吸收转运,部分研究讨论水稻植株 Pb 吸收累积的关键生育期,但鲜有研究关注水稻不同生育期 Pb 胁迫对成熟期水稻植株和糙米 Pb 累积贡献.

本研究通过水培试验对水稻不同生育期单独供给 Pb,分析水稻不同生育期对 Pb 吸收累积的差异,通过探讨水稻吸收累积 Pb 的关键生育时期,明确不同生育期吸收累积的 Pb 对糙米中 Pb 累积的贡献,以为 Pb 污染稻田安全生产提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 供试材料

试供水稻为湘晚籼 13 号,常规中熟晚稻品种,全生育期 103 d,由湖南省水稻研究所提供. 水稻培养营养液采用木村 B 营养液<sup>[14]</sup>. 水培容器为可装 2.5 L 营养液的圆柱形塑料桶(内径 20 cm,高 24 cm).

1.2 试验设计

水培试验在中南林业科技大学生命科学楼三楼露台进行,光、气、热均为自然状态,亚热带季风湿润气候,雨热同期,四季分明. 2018 年 7 月 4 日,选取颗粒饱满、性状大小无明显差异的水稻种子用 30%

$\text{H}_2\text{O}_2$  消毒 15 min,用去离子水洗净,再用湿润的纱布包裹,置于人工培养箱(温度 30℃,湿度 50%)中培养发芽,芽长至 1 cm 左右,播种于未受 Pb 污染的土壤中. 2018 年 7 月 16 日,选取培育后株高为 15 cm 左右、长势良好的水稻幼苗(三叶一心),根系用自来水冲洗,去除根系附着的黏土,用泡沫浮板固定海绵包裹水稻幼苗,放入长方体塑料盆中进行前期培养,使水稻幼苗正常生长,满足后期试验要求. 2018 年 7 月 26 日选择长势相近的水稻幼苗,五叶一心,移入圆柱形塑料桶进行水培试验.

本试验设计 7 个外源 Pb 添加处理(见表 1),分别且仅在分蘖期( $S_{\text{分蘖}}$ , 29 d)、拔节期( $S_{\text{拔节}}$ , 16 d)、孕穗期( $S_{\text{孕穗}}$ , 13 d)、灌浆期( $S_{\text{灌浆}}$ , 17 d)、蜡熟期( $S_{\text{蜡熟}}$ , 14 d)和成熟期( $S_{\text{成熟}}$ , 14 d)添加外源 Pb,以及全生育期( $S_{\text{全}}$ , 103 d)添加外源 Pb,同时设置全生育期不添加外源 Pb 作为空白(CK)对照. 外源 Pb 选用醋酸铅 $[(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}]$ ,使水培中营养液 Pb 浓度为  $0.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ . 本试验期间,每 3 d 更换一次营养液,使用稀  $\text{HNO}_3$  和  $\text{NaOH}$  溶液调节营养液的 pH,使 pH 维持在 5.5. 试验各处理均重复 3 次. 水稻种植期间,根据实际情况喷洒农药,防止病虫害.

表 1 试验设计

| Table 1 Experimental design |                                                 |      |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|
| 处理                          | 外源 Pb 胁迫浓度<br>/ $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ | 胁迫时期 | 胁迫时间<br>/d |
| CK                          | 0                                               | 无    | 0          |
| $S_{\text{分蘖}}$             | 0.50                                            | 分蘖期  | 29         |
| $S_{\text{拔节}}$             | 0.50                                            | 拔节期  | 16         |
| $S_{\text{孕穗}}$             | 0.50                                            | 孕穗期  | 13         |
| $S_{\text{灌浆}}$             | 0.50                                            | 灌浆期  | 17         |
| $S_{\text{蜡熟}}$             | 0.50                                            | 蜡熟期  | 14         |
| $S_{\text{成熟}}$             | 0.50                                            | 成熟期  | 14         |
| $S_{\text{全}}$              | 0.50                                            | 全生育期 | 103        |

1.3 水稻样品采集

水稻成熟后,采集整株水稻,用自来水去除水稻表面尘土,再用超纯水清洗 3 次后分剪. 将水稻植株分为稻谷、穗轴、叶、茎、茎节 1(茎节为茎与叶的连结点,茎节 1 为茎连接穗和旗叶的最上面节点)、其他茎节(除了茎节 1 以外的茎节)、根基茎(根与茎连结 2 cm 处)和根<sup>[15, 16]</sup>. 根系放入  $5 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{CaCl}_2$  溶液浸泡 15 min<sup>[17]</sup>,用于去除根系表面吸附的  $\text{Pb}^{2+}$ ,再和其他部位一同自然风干 24 h 后,放入烘箱 105℃ 杀青 30 min,再 70℃ 烘干至恒重. 水稻各部位分别称量,记录干重. 稻谷使用小型砻谷机(JLGJ4.5,浙江台州市粮仪厂)脱壳后,分离谷壳和糙米. 水稻各部位均用粉碎机(JFSJ-100-1,浙江台州



市粮仪厂)粉碎,装入密封袋保存待测。

1.4 样品分析

水稻各部位样品采用干灰化法处理,具体为称取 3.0 g 水稻样品粉末于 30 mL 坩埚中,在马弗炉中碳化至无黑烟(250℃),然后 500℃ 高温灰化 6~8 h。取出冷却,加入 0.5 mol·L<sup>-1</sup> HNO<sub>3</sub> 溶解灰分,并多次洗涤坩埚,定容到 50 mL 容量瓶中,保存备测。用石墨炉原子吸收分光光度计(iCE-3500, Thermo-Fisher)测定水稻样品中 Pb 含量。在分析过程中,所有水稻样品以湖南大米[GBW10045 (GSB-23)]进行质量控制,Pb 的回收率为 94.1%~104.9%。

1.5 数据统计与分析

不同生育期 Pb 胁迫对水稻植株、地上部位和糙米 Pb 累积的相对贡献率计算方式见下式:

$$RC_i = \frac{C_i \times B_i - C_{CK} \times B_{CK}}{\sum (C_i \times B_i - C_{CK} \times B_{CK})} \times 100\%$$

式中,RC 为相对贡献率(%),C<sub>i</sub> 为不同生育期 Pb 胁迫下某部位 Pb 含量(mg·kg<sup>-1</sup>),C<sub>CK</sub> 为对照下某部位 Pb 含量(mg·kg<sup>-1</sup>),B<sub>i</sub> 为不同生育期 Pb 胁迫下某部位生物量(干重,g·株<sup>-1</sup>),B<sub>CK</sub> 为对照下某部位生物量(干重,g·株<sup>-1</sup>),i 为不同生育期 Pb 胁迫(分蘖期、拔节期、孕穗期、灌浆期、蜡熟期和成熟期)。

本研究数据统计与分析采用 Excel 2013 和 SPSS 22.0 单因素 ANOVA 中 Duncan 多重比较法分

析各处理间差异(P<0.05);水稻各部位 Pb 含量表示为平均值±标准偏差(n=3),图形采用 Origin 2018 进行绘制。

2 结果与分析

2.1 不同生育期 Pb 胁迫对水稻生长的影响

对水稻分蘖数、株高和生物量进行分析测定,结果如表 2 和图 1。可以看出,0.5 mg·L<sup>-1</sup> 的 Pb 胁迫对水稻生长有一定的影响。从水稻植株分蘖数来看,6 个单一时期 Pb 胁迫处理,分蘖数范围为 17~21 蘖·株<sup>-1</sup>,与 CK 之间均不存在显著差异,而全生育期 Pb 胁迫(S<sub>全</sub>)处理时水稻分蘖数(23 蘖·株<sup>-1</sup>)显著高于对照 CK 处理(19 蘖·株<sup>-1</sup>)。从株高来看,拔节期 Pb 胁迫(S<sub>拔节</sub>)处理时水稻株高明显增加,与 CK(70.5 cm)相比高出 9.9%,而其他各单一时期 Pb 胁迫处理均与 CK 无显著差异。S<sub>全</sub>处理时水稻株高最低,仅为 59.0 cm,与 CK 和各单一时期 Pb 胁迫处理之间均存在显著差异(P<0.05)。从生物量来看,CK 处理的总生物量最大,为 61.0 g·株<sup>-1</sup>,S<sub>全</sub>处理的总生物量最小,仅为 47.4 g·株<sup>-1</sup>,比 CK 下降了 22.3%。与 CK 相比,各单一时期 Pb 胁迫处理使总生物量降低了 6.3%~15.7%。显然,不同生育时期 0.5 mg·L<sup>-1</sup> 的 Pb 胁迫对水稻植株的生物量具有一定的抑制作用。

表 2 不同生育期 Pb 胁迫下水稻成熟期分蘖数和株高<sup>1)</sup>

Table 2 Effects of exogenous Pb stress at different growth stages on tiller numbers and heights of rice plants at the maturing stage

| 项目                    | CK          | S <sub>分蘖</sub> | S <sub>拔节</sub> | S <sub>孕穗</sub> | S <sub>灌浆</sub> | S <sub>蜡熟</sub> | S <sub>成熟</sub> | S <sub>全</sub> |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分蘖数/蘖·株 <sup>-1</sup> | 19±2bc      | 21±1ab          | 20±3abc         | 21±2ab          | 19±2bc          | 17±2c           | 19±3bc          | 23±2a          |
| 株高/cm                 | 70.5±2.5bcd | 65.0±4.4d       | 77.5±2.5a       | 65.5±2.5d       | 75.0±5.0abc     | 69.0±1.7cd      | 75.5±4.5ab      | 59.0±3.0e      |

1) 同一行不同小写字母表示各处理差异显著(P<0.05)




图 1 不同生育期 Pb 胁迫下水稻不同部位生物量

Fig. 1 Effects of exogenous Pb stress at different growth stages on the biomass of different rice tissues

2.2 不同生育期 Pb 胁迫对水稻各部位 Pb 含量的影响

表 3 是不同生育期 Pb 胁迫对水稻各部位 Pb 含量的影响。从中可知,水稻各部位 Pb 含量在不同生育期 Pb 胁迫处理下存在明显差异。除 S<sub>全</sub> 处理时水稻地上部位和根系中 Pb 含量最大外,其余 6 个单一时期处理中,S<sub>分蘖</sub>、S<sub>拔节</sub> 和 S<sub>孕穗</sub> 处理水稻地上部位 Pb 含量显著高于 S<sub>灌浆</sub>、S<sub>蜡熟</sub> 和 S<sub>成熟</sub> 处理,而根系 Pb 含量与地上部位相反,即 S<sub>灌浆</sub>、S<sub>蜡熟</sub> 和 S<sub>成熟</sub> 处理根中 Pb 含量显著高于 S<sub>分蘖</sub>、S<sub>拔节</sub> 和 S<sub>孕穗</sub>。

对于不同部位 Pb 含量,7 个处理各部位中 Pb 含量均显著高于 CK(P<0.05),S<sub>全</sub> 处理各部位中 Pb 含量远高于其他 6 个单一时期 Pb 胁迫处理。各处理根系 Pb 含量变化范围较大,为 30.8~936.2

mg·kg<sup>-1</sup>；其次为茎节 1、其他茎节和根基茎中 Pb 含量,变化范围分别为 0.3~162.9、2.4~103.1 和 5.4~27.0 mg·kg<sup>-1</sup>,其中茎节 1 的 Pb 含量平均值高于其他茎节 Pb 含量平均值;茎、叶和穗轴 Pb 含量变化范围相对较小,分别为 0.4~15.8、1.4~8.4

和 0.7~34.1 mg·kg<sup>-1</sup>. 在单一时期 Pb 胁迫处理中, S<sub>孕穗</sub> 处理糙米 Pb 含量最高为 1.2 mg·kg<sup>-1</sup>,显著高于其他处理(P<0.05);其次为 S<sub>拔节</sub> 和 S<sub>分蘖</sub> 处理,糙米 Pb 含量分别为 0.7 mg·kg<sup>-1</sup> 和 0.5 mg·kg<sup>-1</sup>, S<sub>灌浆</sub>、S<sub>蜡熟</sub> 和 S<sub>成熟</sub> 处理糙米中 Pb 含量较低.

表 3 不同生育期 Pb 胁迫下水稻成熟期各部位 Pb 含量<sup>1)</sup>

| Table 3 Effects of exogenous Pb stress at different growth stages on Pb content in different rice tissues at the maturing stage |                                     |             |             |            |             |               |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 处理                                                                                                                              | 水稻成熟期不同部位 Pb 含量/mg·kg <sup>-1</sup> |             |             |            |             |               |              |              |               |
|                                                                                                                                 | 糙米                                  | 谷壳          | 穗轴          | 叶          | 茎           | 茎节 1          | 其他茎节         | 根基茎          | 根             |
| CK                                                                                                                              | 0.08±0.00e                          | 0.59±0.01c  | 0.44±0.02c  | 0.47±0.06d | 0.29±0.01d  | 0.15±0.00c    | 0.87±0.04e   | 2.05±0.35e   | 20.54±1.89f   |
| S <sub>分蘖</sub>                                                                                                                 | 0.46±0.02d                          | 1.26±0.15bc | 3.35±0.17c  | 3.35±0.12c | 2.73±0.55c  | 51.82±10.16b  | 25.22±1.02bc | 14.85±3.18b  | 34.48±0.73f   |
| S <sub>拔节</sub>                                                                                                                 | 0.70±0.16c                          | 1.38±0.20bc | 7.78±0.43b  | 6.65±0.32b | 4.85±0.46b  | 63.57±13.80b  | 27.95±2.97b  | 24.48±2.89a  | 77.41±6.61e   |
| S <sub>孕穗</sub>                                                                                                                 | 1.20±0.16b                          | 1.52±0.33b  | 1.58±0.12c  | 3.99±0.31c | 2.64±0.06c  | 52.94±6.91b   | 23.78±2.76c  | 11.84±1.92bc | 30.84±0.84f   |
| S <sub>灌浆</sub>                                                                                                                 | 0.21±0.04e                          | 0.94±0.01b  | 0.74±0.02c  | 1.51±0.38d | 2.20±0.13cd | 22.60±4.50c   | 18.94±3.04d  | 10.20±3.34c  | 148.76±15.03d |
| S <sub>蜡熟</sub>                                                                                                                 | 0.10±0.00e                          | 1.07±0.26bc | 0.67±0.01c  | 1.72±0.18d | 0.39±0.01d  | 0.95±0.18c    | 2.53±0.41e   | 5.35±0.02de  | 350.11±28.61b |
| S <sub>成熟</sub>                                                                                                                 | 0.21±0.03e                          | 1.26±0.14bc | 0.75±0.08c  | 1.43±0.06d | 0.66±0.10cd | 0.29±0.01c    | 2.38±0.14e   | 8.00±0.47cd  | 283.20±20.20c |
| S <sub>全</sub>                                                                                                                  | 1.76±0.17a                          | 9.56±0.98a  | 34.09±4.54a | 8.43±2.39a | 15.79±3.24a | 162.86±32.40a | 103.08±3.44a | 26.95±3.14a  | 936.20±17.94a |

1) 同一列不同小写字母表示各处理差异显著(P<0.05)

2.3 不同生育期 Pb 胁迫对水稻各部位 Pb 累积的影响

图 2(a) 是不同生育期 Pb 胁迫对水稻各部位 Pb 累积的影响,图 2(b) 是不同生育期 Pb 胁迫对水稻糙米 Pb 累积的影响. 水稻各部位(糙米、谷壳、穗轴、叶、茎、茎节 1、其他茎节、根基茎和根) Pb 累积量为水稻各部位 Pb 含量与各部位生物量的乘积.

由图 2(a) 可知,不同生育期 Pb 胁迫处理下水稻植株 Pb 累积量显著高于对照 CK 处理,变化范围为 357.2~5 785.6 μg·株<sup>-1</sup>,其中根系 Pb 累积量占比最大. 根系 Pb 累积量变化范围为 172.6~5 113.5 μg·株<sup>-1</sup>,占植株 Pb 总累积量的 48.3%~98.2%,平均为 75.3%. 7 个不同处理根系 Pb 累积量从高到低依次为: S<sub>全</sub> > S<sub>蜡熟</sub> > S<sub>成熟</sub> > S<sub>灌浆</sub> > S<sub>拔节</sub> > S<sub>分蘖</sub> ≈ S<sub>孕穗</sub>. 其中, S<sub>全</sub> 处理时根 Pb 累积量最高,为 5 113.5 μg·株<sup>-1</sup>,其次是 S<sub>蜡熟</sub> 处理,其根 Pb 累积量为 1969.1 μg·株<sup>-1</sup>,是地上部位 Pb 总累积量的 55 倍; S<sub>分蘖</sub> 和 S<sub>孕穗</sub> 处理下根系 Pb 累积量相对较低,分别为 172.6 μg·株<sup>-1</sup> 和 187.3 μg·株<sup>-1</sup>. 7 个不同处理地上部位 Pb 累积量变化范围为 36.2~276.9 μg·株<sup>-1</sup>,Pb 累积量排序为: S<sub>全</sub> > S<sub>拔节</sub> > S<sub>分蘖</sub> ≈ S<sub>孕穗</sub> > S<sub>灌浆</sub> > S<sub>蜡熟</sub> ≈ S<sub>成熟</sub>. 由图 2(b) 可以看出,糙米 Pb 累积量变化范围为 0.6~6.6 μg·株<sup>-1</sup>,在单一时期 Pb 胁迫处理中,糙米 Pb 累积量在 S<sub>孕穗</sub> 处理时最大,为 5.3 μg·株<sup>-1</sup>,其次是 S<sub>拔节</sub> 和 S<sub>分蘖</sub> 处理,分别为 3.2 μg·株<sup>-1</sup> 和 2.8 μg·株<sup>-1</sup>.

2.4 不同生育期 Pb 胁迫对水稻 Pb 累积的相对贡献率

表 4 为不同生育期 Pb 胁迫对水稻植株、地上部




图 2 不同生育期 Pb 胁迫下水稻成熟期各部位 Pb 累积量

Fig. 2 Effects of exogenous Pb stress at different growth stages on Pb accumulation amounts in different rice tissues at the maturing stage

位和糙米 Pb 累积的相对贡献率. 不同生育期 Pb 胁



迫下,水稻植株的相对贡献率大小顺序为: $S_{\text{蜡熟}} > S_{\text{成熟}} > S_{\text{灌浆}} > S_{\text{拔节}} > S_{\text{孕穗}} > S_{\text{分蘖}}$ ,相对贡献率分别为 37.7%、27.4%、14.9%、11.3%、4.6% 和 4.1%。不同生育期 Pb 胁迫下水稻地上部位的相对贡献率大小顺序为: $S_{\text{拔节}} > S_{\text{孕穗}} > S_{\text{分蘖}} > S_{\text{灌浆}} > S_{\text{成熟}} > S_{\text{蜡熟}}$ ,相对贡献率分别为 34.5%、23.6%、22.1%、13.9%、3.9% 和 2.0%。这说明水稻地上部位中 Pb 主要来源于分蘖期、拔节期和孕穗期的吸收和转运,水稻根系中 Pb 主要在灌浆期、蜡熟期和成熟期累积,并且向地上部位转运 Pb 的能力减弱。各单一时期 Pb 胁迫处理糙米 Pb 累积的贡献率大小为: $S_{\text{孕穗}} > S_{\text{拔节}} > S_{\text{分蘖}} > S_{\text{灌浆}} > S_{\text{成熟}} > S_{\text{蜡熟}}$ 。 $S_{\text{孕穗}}$  处理 Pb 累积对糙米 Pb 累积相对贡献率最大,为 43.3%,其次是  $S_{\text{拔节}}$  和  $S_{\text{分蘖}}$  处理,相对贡献率分别是 24.3% 和 21.3%。

表 4 不同生育期 Pb 胁迫下水稻成熟期植株、地上部位和糙米 Pb 累积的相对贡献率

Table 4 Effects of exogenous Pb stress at different growth stages on relative contributions of Pb accumulation in whole rice plants, aboveground parts, and brown rice at the maturing stage

| 生育期 | 不同部位 Pb 累积的相对贡献率/% |      |      |
|-----|--------------------|------|------|
|     | 水稻植株               | 地上部位 | 糙米   |
| 分蘖期 | 4.1                | 22.1 | 21.3 |
| 拔节期 | 11.3               | 34.5 | 24.3 |
| 孕穗期 | 4.6                | 23.6 | 43.3 |
| 灌浆期 | 14.9               | 13.9 | 5.2  |
| 蜡熟期 | 37.7               | 2.0  | 1.7  |
| 成熟期 | 27.4               | 3.9  | 4.2  |

### 3 讨论

#### 3.1 水稻不同生育期 Pb 累积的差异

本研究中水稻不同生育期吸收的 Pb 对成熟后各部位 Pb 累积差异明显。在分蘖期( $S_{\text{分蘖}}$ )、拔节期( $S_{\text{拔节}}$ )和孕穗期( $S_{\text{孕穗}}$ )Pb 胁迫下,水稻糙米、茎、叶和穗轴 Pb 含量和累积量均较高,而灌浆期( $S_{\text{灌浆}}$ )、蜡熟期( $S_{\text{蜡熟}}$ )和成熟期( $S_{\text{成熟}}$ )处理糙米、茎、叶和穗轴 Pb 含量和累积量均较低(表 3 和图 2)。其原因在于水稻在分蘖期和拔节期是水稻的营养生长期,生长迅速且新陈代谢作用旺盛,需要从营养液中吸收大量营养元素,大量的 Pb 随着营养物质进入到水稻植株内<sup>[18]</sup>。孕穗期是水稻拔节进一步完成的时期,水稻长出穗轴,在该时期吸收的营养物质对水稻后期形成谷壳和糙米贡献较大。水稻不同生育期吸收的 Pb 对成熟后根系中 Pb 累积差异也非常明显,根系 Pb 含量和累积量大小趋势均为:生殖生长阶段(灌浆期、蜡熟期和成熟期) > 营养生长阶段(分蘖期、拔节期和孕穗期)。出现这种现象的原因可能在于:①相比于水稻营养生长阶段,水稻生殖生长阶段根系生物量大,吸收和附着 Pb 的位置充足<sup>[19]</sup>,但水

稻叶片光合作用能力和根系生理活性下降<sup>[20]</sup>,根系向地上部位转运 Pb 的能力减弱,大量的 Pb 被根系阻隔<sup>[7, 21]</sup>;②水稻营养生长阶段,根系根表铁膜处于逐步形成期,新生根系前端还没有完全覆盖根表铁膜,阻控 Pb 向地上部迁移能力较弱;而生殖生长阶段,水稻对重金属的解毒能力和耐受性增强<sup>[22]</sup>,根表铁膜已经形成且逐渐老化变厚,对 Pb 具有较强的截留能力<sup>[23]</sup>,因此后期 Pb 胁迫的 Pb 大部分被根表铁膜阻隔并累积在根系中。在全生育期 Pb 胁迫下,水稻在前期吸收的 Pb 主要向地上部位迁移,而后期主要将 Pb 滞留在根部,整个生育期(103 d)水稻受 Pb 胁迫时间长,导致水稻植株 Pb 累积量高达  $5\,785.6\ \mu\text{g}\cdot\text{株}^{-1}$ 。

本研究中水稻孕穗期( $S_{\text{孕穗}}$ )吸收累积的 Pb 对糙米中 Pb 的相对贡献率最高,为 43.3%,其次为拔节期和分蘖期,相对贡献率分别为 24.3% 和 21.3% (表 4)。这与 Liu 等<sup>[24]</sup>的研究结果相近,水稻幼苗时期吸收累积的 Pb 在后期生长过程中转运至糙米。缪小建等<sup>[25]</sup>的研究发现,孕穗期前水稻茎鞘贮存的非结构性碳水化合物和孕穗期后的光合产物,对启动灌浆初期籽粒库的活性和促进籽粒灌浆起重要作用,并在孕穗期后转运至穗部籽粒中<sup>[26]</sup>,同时将累积在茎鞘中的 Pb 转运至糙米。Xie 等<sup>[27]</sup>的盆栽试验表明,糙米中 Pb 大部分来源于根系吸收土壤中的有效 Pb 通过茎鞘转运到穗轴再传输到糙米,处于分蘖期时的水稻受主动运输和被动运输双重影响<sup>[13]</sup>。在生育后期水稻根系 Pb 不易向地上部位转运,茎和叶中贮藏的 Pb 仍然会向糙米转运。地上部位 Pb 累积的相对贡献率在分蘖期、拔节期和孕穗期较高,分别为 22.1%、34.5% 和 23.6%。在营养生长阶段吸收的 Pb 较多地累积在地上部位,而不在根系中累积,这也可能是 Pb 向糙米转移的重要来源<sup>[28]</sup>。这些结果说明,糙米中 Pb 累积主要来源于孕穗期根系吸收及孕穗期其他部位中 Pb 向糙米的转运,因此孕穗期是糙米 Pb 累积的关键生育期。这为在水稻孕穗期采用淹水灌溉、施加改良剂或叶面阻控等技术方法降低糙米 Pb 累积提供理论依据。此外,孕穗末期糙米中 Pb 含量还可作为评估水稻成熟后糙米 Pb 含量的一个重要预测指标<sup>[24]</sup>。

#### 3.2 水稻各部位 Pb 累积转运的过程

本研究表明,不同生育期 Pb 胁迫水稻根系 Pb 累积量占植株累积量的 48.3% ~ 98.2%,尤其是灌浆期、蜡熟期和成熟期 Pb 胁迫处理下根 Pb 累积量分别为  $762.9$ 、 $1\,969.1$  和  $1\,448.6\ \mu\text{g}\cdot\text{株}^{-1}$  [图 2 (a)]。Pb 可通过  $\text{Ca}^{2+}$  的阳离子转运体进入水稻根系<sup>[29]</sup>,根部成为外源 Pb 从外界环境进入水稻植株

内最关键的部位. 有研究表明, 水稻植株所吸收的 Pb 大部分被局限于根系组织<sup>[30, 31]</sup>, 根系累积量占水稻植株的累积量甚至超过 95%<sup>[32]</sup>. 这与本研究中  $S_{成熟}$  和  $S_{蜡熟}$  处理的研究结果一致, 其根系中 Pb 累积量均超过 95%. 穗轴、茎和叶的 Pb 累积量均在拔节期 Pb 胁迫下最高, 分别为 7.5、115.1 和 76.3  $\mu\text{g}\cdot\text{株}^{-1}$  [图 2(a)]. 水稻茎鞘是连接穗轴与叶片传输物质的主要通道, 通过蒸腾作用将根系吸收的营养物质和其他物质运输到穗轴和叶片<sup>[27, 33]</sup>. 在水稻地上部位中, 茎和叶的生物量平均值远大于其他部位, 导致茎和叶中 Pb 累积量相对较高. 在分蘖期和拔节期水稻茎和叶迅速生长, 茎节也不断增多, 而茎和叶作为水稻营养生长发育最关键的两个部位, 在生物量快速增长的同时, 吸收累积了大量的 Pb<sup>[8]</sup>, 这成为水稻进入生殖生长阶段以后糙米中 Pb 积累的重要来源<sup>[28]</sup>. 这与 Zhou 等<sup>[10]</sup> 的研究结果相类似, 在 Cd 低污染土壤和高污染土壤种植的水稻, 叶中的 Cd 含量在乳熟期开始逐渐降低, 并通过茎逐渐向糙米中转运, 对糙米 Cd 积累的贡献率分别达到 30.0% 和 22.5%.

在分蘖期、拔节期和孕穗期下的茎节中 Pb 含量皆高于其他地上部位, 其中茎节 1 的 Pb 含量平均值高于其他茎节. 茎节内扩大维管束的木质部区域比茎和叶的维管束大 10 倍以上, 这种差异会降低木质部中的质量流速度<sup>[34]</sup>, 从而使 Pb 在茎节中保留时

间更长, 因此茎节中 Pb 含量较高. Yamaji 等<sup>[15]</sup> 的研究认为, 茎节是矿物元素优先分布的枢纽, 茎节 1 中 Cd 含量高于其他茎节, 与本研究关于 Pb 的结果相似. 因此, Pb 在水稻植株中的转运过程可能与 Cd 的转运相似. 水稻植株中 Cd 向籽粒转运过程是根系中的 Cd 通过木质部向茎运输, 然后经过木质部向韧皮部转移, 由韧皮部向籽粒运输, 最终在籽粒中累积<sup>[35]</sup>. 本研究通过相关性分析发现 (表 5), 单一生育期 Pb 胁迫处理下水稻根系 Pb 含量与茎节 1 ( $r = -0.933$ ) 和其他茎节 ( $r = -0.965$ ) 中 Pb 含量均呈极显著负相关关系 ( $n = 6, r_{0.01} = 0.917$ ), 而茎中 Pb 含量与茎节 1 ( $r = 0.923$ ) 和根基茎 ( $r = 0.965$ ) 中 Pb 含量均呈极显著正相关关系 ( $n = 6, r_{0.01} = 0.917$ ), 与其他茎节中 Pb 含量呈显著正相关关系 ( $r = 0.914; n = 6, r_{0.05} = 0.811$ ), 叶中 Pb 含量与茎节 1 中 Pb 含量呈显著正相关关系 ( $r = 0.898; n = 6, r_{0.05} = 0.811$ ), 与根基茎中 Pb 含量呈极显著正相关关系 ( $r = 0.954; n = 6, r_{0.01} = 0.917$ ), 这说明 Pb 在水稻各部位之间的迁移转运与茎节紧密相关. 有研究发现, 茎节正是物质从木质部向韧皮部转移的中心器官, 在水稻的分蘖期、拔节期和孕穗期长出, 茎节是阻隔重金属进入糙米的一道屏障, Pb 由根部吸收后转运到地上部分, 首先通过茎节被重新分布, 一部分进入茎鞘、谷壳和糙米, 另一部分进入叶片<sup>[36]</sup>.

表 5 不同生育期水稻各部位 Pb 含量相关性<sup>1)</sup>

Table 5 Correlations of Pb contents in different rice tissues at different growth stages

|      | 糙米 | 谷壳      | 穗轴    | 叶        | 茎        | 茎节 1     | 其他茎节     | 根基茎      | 根         |
|------|----|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 糙米   | 1  | 0.858 * | 0.369 | 0.688    | 0.595    | 0.771    | 0.674    | 0.480    | -0.757    |
| 谷壳   |    | 1       | 0.439 | 0.662    | 0.454    | 0.617    | 0.425    | 0.471    | -0.543    |
| 穗轴   |    |         | 1     | 0.926 ** | 0.887 *  | 0.753    | 0.668    | 0.968 ** | -0.515    |
| 叶    |    |         |       | 1        | 0.946 ** | 0.898 *  | 0.805    | 0.954 ** | -0.711    |
| 茎    |    |         |       |          | 1        | 0.923 ** | 0.914 *  | 0.965 ** | -0.801    |
| 茎节 1 |    |         |       |          |          | 1        | 0.965 ** | 0.850 *  | -0.933 ** |
| 其他茎节 |    |         |       |          |          |          | 1        | 0.804    | -0.956 ** |
| 根基茎  |    |         |       |          |          |          |          | 1        | -0.683    |
| 根    |    |         |       |          |          |          |          |          | 1         |

1) \* 表示  $P < 0.05$  差异显著, \*\* 表示  $P < 0.01$  差异显著;  $n = 6, r_{0.01} = 0.917, r_{0.05} = 0.811$

4 结论

(1) 各单一时期 Pb 胁迫处理较 CK 水稻株高和分蘖数不存在显著影响, 对生物量有一定的抑制作用, 而全生育期 Pb 胁迫处理下水稻株高和生物量均受到明显抑制.

(2) 水稻成熟后不同部位的 Pb 含量差异表现为: 根系 > 茎节 1 > 其他茎节 > 根基茎 > 茎 > 叶 > 穗轴 > 谷壳 > 糙米. 不同生育期 Pb 胁迫处理糙米 Pb 含

量变化范围为 0.1 ~ 1.2  $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ , 其顺序为: 孕穗期 Pb 胁迫 > 拔节期 Pb 胁迫 > 分蘖期 Pb 胁迫 > 灌浆期 Pb 胁迫 > 成熟期 Pb 胁迫 > 蜡熟期 Pb 胁迫.

(3) 水稻植株地上部位和糙米中 Pb 累积量相对贡献率均为: 水稻营养生长阶段 (分蘖期、拔节期和孕穗期) > 生殖生长阶段 (灌浆期、蜡熟期和成熟期), 其中孕穗期为糙米 Pb 积累的关键生育期, 对糙米 Pb 积累的相对贡献率为 43.3%, 其次是拔节期和分蘖期处理, 相对贡献率分别为 24.4% 和



21.3%.

(4)糙米中 Pb 累积主要来源于孕穗期根系吸收及孕穗期其他部位中 Pb 向糙米的转运,建议在水稻孕穗期适度采用淹水灌溉、施加改良剂或叶面阻控等技术措施,以降低糙米 Pb 的累积,实现 Pb 污染稻田安全利用.

#### 参考文献:

- [1] Liu J, Wang D Q, Song B, *et al.* Source apportionment of Pb in a rice-soil system using field monitoring and isotope composition analysis[J]. *Journal of Geochemical Exploration*, 2019, **204**: 83-89.
- [2] Yang Y J, Chen J M, Huang Q N, *et al.* Can liming reduce cadmium (Cd) accumulation in rice (*Oryza sativa*) in slightly acidic soils? A contradictory dynamic equilibrium between Cd uptake capacity of roots and Cd immobilisation in soils [J]. *Chemosphere*, 2018, **193**: 547-556.
- [3] Verbruggen N, Hermans C, Schat H. Mechanisms to cope with arsenic or cadmium excess in plants [J]. *Current Opinion in Plant Biology*, 2009, **12**(3): 364-372.
- [4] Fang Y, Sun X Y, Yang W J, *et al.* Concentrations and health risks of lead, cadmium, arsenic, and mercury in rice and edible mushrooms in China[J]. *Food Chemistry*, 2014, **147**: 147-151.
- [5] Yang Q W, Shu W S, Qiu J W, *et al.* Lead in paddy soils and rice plants and its potential health risk around Lechang Lead/Zinc Mine, Guangdong, China[J]. *Environment International*, 2004, **30**(7): 883-889.
- [6] Wan Y N, Huang Q Q, Camara A Y, *et al.* Water management impacts on the solubility of Cd, Pb, As, and Cr and their uptake by rice in two contaminated paddy soils [J]. *Chemosphere*, 2019, **228**: 360-369.
- [7] 王倩倩,贾润语,李虹呈,等. Cd 胁迫水培试验下水稻糙米 Cd 累积的关键生育时期[J]. *中国农业科学*, 2018, **51**(23): 4424-4433.
- Wang Q Q, Jia R Y, Li H C, *et al.* Key growth stage of Cd accumulation in brown rice through a hydroponic experiment with Cd stress [J]. *Scientia Agricultura Sinica*, 2018, **51**(23): 4424-4433.
- [8] 叶长城,陈喆,彭鸥,等. 不同生育期 Cd 胁迫对水稻生长及镉累积的影响[J]. *环境科学学报*, 2017, **37**(8): 3201-3206.
- Ye C C, Chen Z, Peng O, *et al.* Effects of cadmium stress on growth and cadmium accumulation in rice at different growth stages[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2017, **37**(8): 3201-3206.
- [9] 彭华,田发祥,魏维,等. 不同生育期施用硅肥对水稻吸收积累镉硅的影响[J]. *农业环境科学学报*, 2017, **36**(6): 1027-1033.
- Peng H, Tian F X, Wei W, *et al.* Effects of silicon fertilizer application on the cadmium and silicon content of rice at different growth stages[J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2017, **36**(6): 1027-1033.
- [10] Zhou H, Zhu W, Yang W T, *et al.* Cadmium uptake, accumulation, and remobilization in iron plaque and rice tissues at different growth stages[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2018, **152**: 91-97.
- [11] 刘昭兵,纪雄辉,彭华,等. 不同生育期水稻对 Cd、Pb 的吸收累积特征及品种差异[J]. *土壤通报*, 2011, **42**(5): 1125-1130.
- Liu Z B, Ji X H, Peng H, *et al.* Characteristics of Cd and Pb absorption and accumulation by rice at different growth stages and the differences between varieties [J]. *Chinese Journal of Soil Science*, 2011, **42**(5): 1125-1130.
- [12] Cheng W D, Zhang G P, Yao H G, *et al.* Effect of grain position within a panicle and variety on As, Cd, Cr, Ni, Pb concentrations in japonica rice [J]. *Rice Science*, 2005, **12**(1): 48-56.
- [13] Zhou H, Zeng M, Zhou X, *et al.* Heavy metal translocation and accumulation in iron plaques and plant tissues for 32 hybrid rice (*Oryza sativa* L.) cultivars[J]. *Plant and Soil*, 2015, **386**(1-2): 317-329.
- [14] 薛应龙. 植物生理学实验手册[M]. 上海:上海科学技术出版社, 1985.
- [15] Yamaji N, Xia J X, Mitani-Ueno N, *et al.* Preferential delivery of zinc to developing tissues in rice is mediated by P-type heavy metal ATPase OsHMA2[J]. *Plant Physiology*, 2013, **162**(2): 927-939.
- [16] 莫争,王春霞,陈琴,等. 重金属 Cu、Pb、Zn、Cr、Cd 在水稻植株中的富集和分布[J]. *环境化学*, 2002, **21**(2): 110-116.
- Mo Z, Wang C X, Chen Q, *et al.* Distribution and enrichment of heavy metals of Cu, Pb, Zn, Cr and Cd in paddy plant [J]. *Environmental Chemistry*, 2002, **21**(2): 110-116.
- [17] 胡莹,黄益宗,段桂兰,等. 镉对不同生态型水稻的毒性及其在水稻体内迁移转运[J]. *生态毒理学报*, 2012, **7**(6): 664-670.
- Hu Y, Huang Y Z, Duan G L, *et al.* Cadmium toxicity and its translocation in two ecotype rice cultivar [J]. *Asian Journal of Ecotoxicology*, 2012, **7**(6): 664-670.
- [18] 许嘉琳,鲍子平,杨居荣,等. 农作物体内铅、镉、铜的化学形态研究[J]. *应用生态学报*, 1991, **2**(3): 244-248.
- Xu J L, Bao Z P, Yang J R, *et al.* Chemical forms of Pb, Cd and Cu in crops[J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 1991, **2**(3): 244-248.
- [19] 史锟,张福锁,刘学军,等. 不同时期施肥对水稻根表铁胶膜中铁镉含量及根系含镉量的影响[J]. *农业环境科学学报*, 2004, **23**(1): 6-12.
- Shi K, Zhang F S, Liu X J, *et al.* Effects of different periods applied Fe<sup>2+</sup> and concentrations on Fe and Cd contents in iron plaque on rice root [J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2004, **23**(1): 6-12.
- [20] 李香玲,冯跃华. 水稻根系生长特性及其与地上部分关系的研究进展[J]. *中国农学通报*, 2015, **31**(6): 1-6.
- Li X L, Feng Y H. Research advance on relation of aerial part and root traits of rice [J]. *Chinese Agricultural Science Bulletin*, 2015, **31**(6): 1-6.
- [21] Guo J X, Li Y Y, Hu C, *et al.* Ca-containing amendments to reduce the absorption and translocation of Pb in rice plants [J]. *Science of the Total Environment*, 2018, **637-638**: 971-979.
- [22] 彭鸥,铁柏清,叶长城,等. 稻米镉关键积累时期研究[J]. *农业资源与环境学报*, 2017, **34**(3): 272-279.
- Peng O, Tie B Q, Ye C C, *et al.* The key period of cadmium accumulation in rice [J]. *Journal of Agricultural Resources and Environment*, 2017, **34**(3): 272-279.
- [23] 胡莹,黄益宗,黄艳超,等. 不同生育期水稻根表铁膜的形成及其对水稻吸收和转运 Cd 的影响[J]. *农业环境科学学报*, 2013, **32**(3): 432-437.
- Hu Y, Huang Y Z, Huang C Y, *et al.* Formation of iron plaque on root surface and its effect on Cd uptake and translocation by rice (*Oryza sativa* L.) at different growth stages [J]. *Journal of Agro-Environment Science*, 2013, **32**(3): 432-437.
- [24] Liu J G, Ma X M, Wang M X, *et al.* Genotypic differences

- among rice cultivars in lead accumulation and translocation and the relation with grain Pb levels [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2013, **90**: 35-40.
- [25] 缪小建, 王绍华, 李刚华, 等. 大中穗型水稻品种灌浆期非结构性碳水化合物运转特征[J]. *南京农业大学学报*, 2009, **32**(2): 1-4.
- Miao X J, Wang S H, Li G H, *et al.* Translocation of non-structural carbohydrates in large and medium panicle rice cultivars during grain filling stage [J]. *Journal of Nanjing Agricultural University*, 2009, **32**(2): 1-4.
- [26] 刘慧娟, 饶玉春, 杨窑龙, 等. 水稻叶鞘相关性状的遗传分析[J]. *分子植物育种*, 2011, **9**(3): 278-287.
- Liu H J, Rao Y C, Yang Y L, *et al.* QTL analysis of leaf sheath traits in rice (*Oryza sativa* L.) [J]. *Molecular Plant Breeding*, 2011, **9**(3): 278-287.
- [27] Xie T H, Li Y Y, Dong H X, *et al.* Effects and mechanisms on the reduction of lead accumulation in rice grains through lime amendment[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019, **173**: 266-272.
- [28] Ashraf U, Hussain S, Akbar N, *et al.* Water management regimes alter Pb uptake and translocation in fragrant rice [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2018, **149**: 128-134.
- [29] Kim Y Y, Yang Y Y, Lee Y. Pb and Cd uptake in rice roots [J]. *Physiologia Plantarum*, 2002, **116**(3): 368-372.
- [30] 段德超, 于明革, 施积炎. 植物对铅的吸收、转运、累积和解毒机制研究进展[J]. *应用生态学报*, 2014, **25**(1): 287-296.
- Duan D C, Yu M G, Shi J Y. Research advances in uptake, translocation, accumulation and detoxification of Pb in plants [J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2014, **25**(1): 287-296.
- [31] 林舜华, 黄银晓, 姚依群, 等. 铅在植物-土壤系统中的分配规律及其生态效应——以大豆、水稻为例[J]. *植物生态学与地植物学丛刊*, 1985, **9**(2): 85-91.
- Lin S H, Huang Y X, Yao Y Q, *et al.* The distribution of Pb in the plant-soil system and its ecological reaction [J]. *Acta Phytocologica et Geobotanica Sinica*, 1985, **9**(2): 85-91.
- [32] 朱珺. NRT1.1 在植物响应铅胁迫中的作用及机制[D]. 杭州: 浙江大学, 2019.
- Zhu J. The role of nitrate transporter 1.1 in plant response to Pb stress and its underlying mechanism [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2019.
- [33] 周鸿, 曲仲湘, 王焕校. 铅对几种农作物的影响及迁移积累规律初探[J]. *环境科学学报*, 1983, **3**(3): 222-234.
- Zhou H, Qu Z X, Wang H X. A study on the effects of lead on several kinds of crops and its translocation and accumulation therein [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 1983, **3**(3): 222-234.
- [34] Yamaji N, Ma J F. The node, a hub for mineral nutrient distribution in graminaceous plants [J]. *Trends in Plant Science*, 2014, **19**(9): 556-563.
- [35] Fujimaki S, Suzui N, Ishioka N S, *et al.* Tracing cadmium from culture to spikelet: noninvasive imaging and quantitative characterization of absorption, transport, and accumulation of cadmium in an intact rice plant [J]. *Plant Physiology*, 2010, **152**(4): 1796-1806.
- [36] Feng X M, Han L, Chao D Y, *et al.* Ionomic and transcriptomic analysis provides new insight into the distribution and transport of cadmium and arsenic in rice [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2017, **331**: 246-256.



## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Characterization of Two Heavy Pollution Episodes in Tianjin in 2020 .....                                                                                                                 | XIAO Zhi-mei, XU Hong, CAI Zi-ying, <i>et al.</i> (3879)             |
| Analysis of Characteristics of Water-soluble Ions in PM <sub>2.5</sub> in Chengdu Based on the MARGA .....                                                                                | YIN Han-mei, CHEN Jun-hui, FENG Xiao-qiong, <i>et al.</i> (3889)     |
| Seasonal Characteristics and Source Analysis of Water-soluble Inorganic Ions in PM <sub>2.5</sub> in Suqian City .....                                                                    | MA Hong-lu, ZHAO Xin, LU Jian-gang, <i>et al.</i> (3899)             |
| Characterization and Size Distribution of Carbonaceous Aerosols at Mountain Dinghu .....                                                                                                  | LI An-na, WEN Tian-xue, HUA Wei, <i>et al.</i> (3908)                |
| Characteristics and Source Apportionment of Carbon Components in Road Dust in Anshan .....                                                                                                | LIN Zi, JI Ya-qin, LIN Yu, <i>et al.</i> (3918)                      |
| Spectral Characteristics and Source Analysis of WSOC of PM <sub>2.5</sub> in Winter of Xi'an .....                                                                                        | YANG Yi, ZHANG Ya-nan, LIU Huan-wu, <i>et al.</i> (3924)             |
| Observation of Aerosol Optical Properties and New Particle Formation in the Yangtze River Delta .....                                                                                     | DU Ying-ying, CHEN Jun, ZHANG Jia-luo, <i>et al.</i> (3932)          |
| Component Characteristics and Source Appointment of Volatile Organic Compounds in Lianyungang City .....                                                                                  | CUI Jin-meng, WANG Ti-jian, LI Qiu-tong, <i>et al.</i> (3941)        |
| Seasonal Pollution Characteristics and Analysis of the Sources of Atmospheric VOCs in Chengdu Urban Area .....                                                                            | WANG Cheng-hui, CHEN Jun-hui, HAN Li, <i>et al.</i> (3951)           |
| Ozone Sensitivity Analysis and Emission Controls in Dezhou in Summer .....                                                                                                                | YAN Ru-sha (3961)                                                    |
| Inventory and Distribution Characteristics of China's Thermal Power Emissions Under Ultra-Low Reconstruction .....                                                                        | QU Jia-bao, WANG Peng, BO Xin, <i>et al.</i> (3969)                  |
| Establishment and Spatial Distribution of Anthropogenic Ammonia Emission Inventory in Zhejiang Province .....                                                                             | ZHAO Rui-dong, YU Xing-na, HOU Xin-hong, <i>et al.</i> (3976)        |
| Evaluation and Screening of Dioxin Control Technology in Waste Incineration Flue Gas .....                                                                                                | ZHAO Si-lan, XI Peng-fei, GUO Feng-yan, <i>et al.</i> (3985)         |
| Characteristics of Stable Isotopes and Moisture Sources of Two Typical Precipitation Events in Lanzhou City .....                                                                         | HAN Ting-ting, ZHANG Ming-jun, WANG Sheng-jie, <i>et al.</i> (3993)  |
| Hydrochemical Characteristics and Possible Controls of the Surface Water in Ranwu Lake Basin .....                                                                                        | ZHANG Tao, WANG Ming-guo, ZHANG Zhi-yin, <i>et al.</i> (4003)        |
| Chemical Evolution and Formation Mechanism of Groundwater in Hetao Irrigation Area .....                                                                                                  | CUI Jia-qi, LI Xian-yue, SHI Hai-bin, <i>et al.</i> (4011)           |
| Chemical Characteristics of Groundwater and Material Sources Analysis in Shiqi River Basin .....                                                                                          | LI Xiao, YU Shi, LI Liang, <i>et al.</i> (4021)                      |
| Spatial-temporal Variations and Driving of Nitrogen and Phosphorus Ratios in Lakes in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River .....                                                 | JI Peng-fei, XU Hai, ZHAN Xu, <i>et al.</i> (4030)                   |
| Spatiotemporal Variations in Nutrient Loads in River-lake System of Changdang Lake Catchment in 2016-2017 .....                                                                           | LI Xin-yan, LI Heng-peng, JIANG San-yuan, <i>et al.</i> (4042)       |
| Influence of <i>Potamogeton crispus</i> on Lake Water Environment and Phytoplankton Community Structure .....                                                                             | KANG Li-juan, XU Hai, ZOU Wei, <i>et al.</i> (4053)                  |
| Phylogenetic Processes and Key Driving Factors of Bacterial Communities in Jinze Reservoir .....                                                                                          | LIU Ming-kun, TONG Jun, ZHU Hui-feng, <i>et al.</i> (4062)           |
| Distribution Characteristics of Per-/polyfluoralkyl Substances in River Sediments Around Typical Fluorine Industrial Parks .....                                                          | SUN Lin-ting, ZHAO Zhen, TANG Jian-hui (4069)                        |
| Microplastics-Induced Shifts of Diversity and Abundance of Antibiotic Resistance Genes in River Water .....                                                                               | ZHOU Xin-yuan, WANG Yan-zi, SU Jian-qiang, <i>et al.</i> (4076)      |
| Pollution Characteristics and Risk Assessment of Antibiotics in Lianhua Reservoir .....                                                                                                   | LIAO Jie, WEI Xiao-qin, XIAO Yan-qin, <i>et al.</i> (4081)           |
| Intraspecific Variation in Growth and Alkaline Phosphatase Activity of <i>Cylindrospermopsis raciborskii</i> Strains in Response to Different Phosphorus Concentrations and Sources ..... | YE Jin-mei, ZHAO Li, LUO Xu, <i>et al.</i> (4088)                    |
| Simulation of Water Quality Response of Guishui River Wetland Plants and Water Diversion .....                                                                                            | LI Ya-juan, DU Yan-liang, BI Er-ping, <i>et al.</i> (4095)           |
| Performance Assessment of Field-scale Dry Grass Swale with Shallow Substrate Layer .....                                                                                                  | ZHANG Jia-wei, LI Tian, ZHANG Ting-xiu (4105)                        |
| Transition of Particulate Pollutant in the Parcel-based Catchment of Sponge City .....                                                                                                    | LI Jia, XIE Wen-xia, JIANG Zhi-hui, <i>et al.</i> (4113)             |
| Adsorption of Sb(V) in Water by Natural Pyrite: Performance and Mechanism .....                                                                                                           | SHI Song, WU Qian-yuan, LI Xin-zheng, <i>et al.</i> (4124)           |
| Treatment of Wastewater Containing Naphthalene Sulfonic Acid by Persulfate Oxidation .....                                                                                                | ZHANG Jin-men, LU Jun, LIU Xiao-chen, <i>et al.</i> (4133)           |
| Effect of Temperature on Performance and Microbial Community Structure of Anaerobic Biofilter-Treated Domestic Wastewater .....                                                           | LIU Zhi-bin, LIU Xiu-hong, ZHOU Tong, <i>et al.</i> (4141)           |
| Start-up and Optimization of Denitrifying Phosphorus Removal in ABR-MBR Coupling Process .....                                                                                            | MIAO Xin-nian, WANG Qian, GUO Kai-cheng, <i>et al.</i> (4150)        |
| Adaptability of Completely Autotrophic Nitrogen Removal over Granular Sludge to Low-Strength at Low Temperature .....                                                                     | LIU Yu-xin, WANG Jian-fang, QIAN Fei-yue, <i>et al.</i> (4161)       |
| Discussion on Key Issues of Geochemical Monitoring of Soil Heavy Metal in Xiongan New District .....                                                                                      | GUO Zhi-juan, ZHOU Ya-long, YANG Zheng, <i>et al.</i> (4169)         |
| Quantitative Assessment of Human Health Risks Based on Soil Heavy Metals and PAHs Sources: Take a Polluted Industrial Site of Beijing As an Example .....                                 | WU Zhi-yuan, ZHANG Li-na, XIA Tian-xiang, <i>et al.</i> (4180)       |
| Ecological Risk Assessment of Heavy Metals at Township Scale in the High Background of Heavy Metals, Southwestern, China .....                                                            | ZHANG Fu-gui, PENG Min, WANG Hui-yan, <i>et al.</i> (4197)           |
| Potential of Accumulation and Application of Dominant Plants in Lanping Lead-zinc Mine, Yunnan Province .....                                                                             | ZHANG Long, ZHANG Yun-xia, SONG Bo, <i>et al.</i> (4210)             |
| Key Growth Stage of Pb Accumulation in Rice Through a Hydroponic Experiment with Pb Stress .....                                                                                          | HU Yu-dan, ZHOU Hang, GU Jiao-feng, <i>et al.</i> (4218)             |
| Effect of Nutrient Regulation and Control on Cd Accumulation Efficiency of <i>Hylotelephium spectabile</i> Under Field Conditions .....                                                   | GUO Jun-mei, YANG Jun-xing, YANG Jun, <i>et al.</i> (4226)           |
| Effects of <i>Eucalyptus</i> Branches Biochar Application on Soil Physicochemical Properties of Acidified Soil in a <i>Eucalyptus</i> plantation in Northern Guangxi .....                | DAUN Chun-yan, SHEN Yu-yi, XU Guang-ping, <i>et al.</i> (4234)       |
| Dynamic Effects of Direct Returning of Straw and Corresponding Biochar on Acidity, Nutrients, and Exchangeable Properties of Red Soil .....                                               | YANG Cai-di, LU Sheng-gao (4246)                                     |
| Different Responses of Soil Microbial Community Structure to Irrigation with Treated Wastewater from Domestic and Industrial Sources .....                                                | WANG Yan, CHENG Dong-hui, TAN Wen-bing, <i>et al.</i> (4253)         |
| Effects of Manure and Organic Fertilizer Application on Soil Microbial Community Diversity in Paddy Fields .....                                                                          | LI Peng, WU Jian-qiang, SHA Chen-yan, <i>et al.</i> (4262)           |
| Effects of Land Use Changes on Soil Bacterial Community Diversity in the Riparian Wetland Along the Downstream of Songhua River .....                                                     | ZHANG Tuo, XU Fei, HUAI Bao-dong, <i>et al.</i> (4273)               |
| Response of Soil Bacterial Community Structure to Precipitation Change in Grassland of Loess Plateau .....                                                                                | LI Na, WANG Bao-rong, AN Shao-shan, <i>et al.</i> (4284)             |
| Effect of Land-use on Soil Fungal Community Structure and Associated Functional Group in Huixian Karst Wetland .....                                                                      | CHENG Yue-yang, JIN Zhen-jiang, WANG Xiao-tong, <i>et al.</i> (4294) |
| Interactions of Fungi Community and Relationship with the Carbon Structure in Arable Mollisols with Gradient Organic Matter Content .....                                                 | SHANG Qiu-tong, HUANG Rui-lin, NI Hao-wei, <i>et al.</i> (4305)      |
| Diversity of Soil Eukaryotic Microbes in Different Succession Stages in Maolan Karst Forest of Guizhou .....                                                                              | WANG Xian, LONG Jian, LI Juan, <i>et al.</i> (4314)                  |
| Adsorption of Cadmium and Arsenic by Corn Stalk Biochar Solidified Microorganism .....                                                                                                    | LIU Yu-ling, ZHU Hu-cheng, PENG Ou, <i>et al.</i> (4322)             |
| Mechanism of Inorganic Nitrogen Transformation and Identification of Nitrogen Sources in Water and Soil .....                                                                             | LIANG Xing, SUN Li-qun, ZHANG Xin, <i>et al.</i> (4333)              |