

方知库
Eco-Environmental
Knowledge Web

环境科学

ENVIRONMENTAL SCIENCE

ISSN 0250-3301 CODEN HCKHDV
HUANJING KEXUE

■ 主办 中国科学院生态环境研究中心
■ 出版 科学出版社



2020

Vol.41 No.9
第41卷 第9期

目次

2020年天津市两次重污染天气污染特征分析·····	肖致美,徐虹,蔡子颖,李鹏,刘彬,元洁,郑乃源,唐遨,陈魁,邓小文(3879)
基于高分辨率MARGA分析成都市PM _{2.5} 中水溶性离子污染特征·····	尹寒梅,陈军辉,冯小琼,姜涛,钱骏,刘政(3889)
宿迁市PM _{2.5} 中水溶性无机离子的季节特征和来源分析·····	马红璐,赵欣,陆建刚,王辉,许纯领,欧阳琰,朱新胜,殷堂兵,漆丹,陆亚秋,汪玖阳,陆声兴(3899)
鼎湖山大气颗粒物中OC与EC的浓度特征及粒径分布·····	李安娜,温天雪,华维,杨员,孟泽,胡波,辛金元(3908)
鞍山市道路扬尘碳组分特征及来源解析·····	林孜,姬亚芹,林宇,国纪良,马妍,赵静琦(3918)
西安市冬季PM _{2.5} 中WSOC的光谱特性和来源解析·····	杨毅,张亚楠,刘焕武,田萍萍,李亚飞,雷颖,王一博(3924)
长三角地区气溶胶光学性质与新粒子生成观测·····	杜盈盈,陈军,张家洛,甘桂城,刘瑜存,苏明旭,楼晟荣,周敏,陶士康,乔利平(3932)
连云港市挥发性有机化合物的组分特征及来源解析·····	崔金梦,王体健,李秋潼,董立文,黄丛丞,曹云擎(3941)
成都市城区大气VOCs季节污染特征及来源解析·····	王成辉,陈军辉,韩丽,徐晨曦,王波,李英杰,刘政,钱骏(3951)
德州市夏季臭氧敏感性特征及减排方案·····	严茹莎(3961)
超低改造下中国火电排放清单及分布特征·····	屈加豹,王鹏,伯鑫,薛晓达,董广霞,崔磊,康明雄,王彤,汤铃,朱法华,李时蓓(3969)
浙江省人为源氨排放清单建立及分布特征·····	赵睿东,于兴娜,侯新红,沈丽(3976)
垃圾焚烧烟气中二噁英控制技术的评估与筛选·····	赵思岚,奚鹏飞,郭凤艳,邓双,贾建丽(3985)
兰州市两场典型降水事件稳定同位素特征及其水汽来源·····	韩婷婷,张明军,王圣杰,杜勤勤,马转转,郭蓉,曹晏风(3993)
然乌湖流域地表水水化学特征及控制因素·····	张涛,王明国,张智印,刘廷,何锦(4003)
河套灌区地下水化学演变特征及形成机制·····	崔佳琪,李仙岳,史海滨,孙亚楠,安海军,邢进平(4011)
石期河流域地下水化学特征及物质来源分析·····	李笑,于爽,李亮,郭永丽(4021)
长江中下游湖泊水体氮磷时空变化特征及其影响因素·····	季鹏飞,许海,詹旭,朱广伟,邹伟,朱梦圆,康丽娟(4030)
2016~2017年长荡湖流域湖库系统营养盐时空分布机制分析·····	李新艳,李恒鹏,姜三元,马培,赖锡军,邓建才,陈东强,耿建伟(4042)
菹草对湖泊水质及浮游植物群落结构的影响·····	康丽娟,许海,邹伟,朱广伟,朱梦圆,季鹏飞,陈洁(4053)
金泽水库库区细菌群落构建过程与关键驱动因子分析·····	刘明坤,童俊,朱慧峰,白晓慧(4062)
典型氟工业园周边河流沉积物中全(多)氟化合物的分布特征·····	孙琳婷,赵祯,唐建辉(4069)
微塑料对河水抗生素抗性基因的影响·····	周昕原,王言仔,苏建强,黄福义(4076)
莲花水库水体中抗生素污染特征及生态风险评价·····	廖杰,魏晓琴,肖燕琴,李青松,范洪勇,刘学军,庄马展,刘超翔(4081)
拟柱孢藻生长及碱性磷酸酶活性对不同磷浓度和磷形态响应的株系间差异·····	叶金梅,赵莉,罗旭,彭亮,雷腊梅(4088)
奶水河湿地植物作用及调水水质响应模拟·····	李亚娟,杜彦良,毕二平,王亮,陈翠柏(4095)
浅基质层干植草沟运行效果的现场实验·····	张佳炜,李田,张庭秀(4105)
海绵城市地块汇水区颗粒污染物的传输·····	李佳,谢文霞,姜智绘,单溪环,廖云杰,赵洪涛,李叙勇(4113)
天然黄铁矿吸附去除水中Sb(V):性能与机制·····	石松,吴乾元,李新正,黄满红(4124)
过硫酸盐氧化处理含苯磺酸废水·····	章晋门,卢钧,刘晓琛,陈泉源(4133)
温度对城市污水厌氧生物滤池运行效果与菌群结构的影响·····	刘智斌,刘秀红,周桐,章世勇,李健敏,杨庆(4141)
ABR-MBR耦合工艺启动及优化反硝化除磷性能·····	缪新年,汪倩,郭凯成,刘文如,沈耀良(4150)
低温下全自养脱氮颗粒污泥适应低基质效能·····	刘雨馨,王建芳,钱飞跃,陈倩苗,乔伟,沈聪(4161)
雄安新区土壤重金属地球化学监测关键问题探讨·····	郭志娟,周亚龙,杨峥,赵传冬,成杭新,孔牧,彭敏(4169)
基于土壤重金属及PAHs来源的人体健康风险定量评价:以北京某工业污染场地为例·····	吴志远,张丽娜,夏天翔,贾晓洋,李慧颖,王世杰(4180)
基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价·····	张富贵,彭敏,王惠艳,马宏宏,徐仁廷,成晓梦,侯召雷,陈子万,李括,成杭新(4197)
云南兰坪铅锌矿区优势植物重金属富集特性及应用潜力·····	张龙,张云霞,宋波,吴勇,周子阳(4210)
水培试验下水稻Pb吸收累积关键生育期·····	胡雨丹,周航,辜娇峰,霍洋,邓鹏辉,魏宾纭,刘俊,廖柏寒(4218)
田间条件下养分调控八宝景天Cd修复效率·····	郭俊梅,杨俊兴,杨军,郑国砥,周小勇,陈同斌,卞建林,孟晓飞,李玉峰(4226)
桉树枝条生物炭输入对桂北桉树人工林酸化土壤的作用效果·····	段春燕,沈育伊,徐广平,滕秋梅,张德楠,何成新,张中峰,周龙武,孙英杰(4234)
秸秆直接还田和炭化还田对红壤酸度、养分和交换性能的动态影响·····	杨彩迪,卢升高(4246)
土壤微生物群落结构对生活源和工业源再生水灌溉的差异化响应·····	王燕,程东会,檀文炳,余红,席北斗,姜永海,党秋玲(4253)
粪肥和有机肥施用对稻田土壤微生物群落多样性影响·····	理鹏,吴建强,沙晨燕,叶春梅,黄沈发(4262)
松花江下游沿江湿地土地利用变化对土壤细菌群落多样性的影响·····	张拓,徐飞,怀宝东,杨雪,隋文志(4273)
黄土高原草地土壤细菌群落结构对于降水变化的响应·····	李娜,王宝荣,安韶山,焦峰,黄倩(4284)
土地利用方式对会仙岩溶湿地土壤真菌群落和功能类群的影响·····	程跃扬,靳振江,王晓彤,贾远航,袁武,周军波(4294)
黑土真菌群落互作及其与梯度有机质碳分子结构的关系·····	尚秋彤,黄瑞林,倪浩为,隋跃宇,孙波,梁玉婷(4305)
贵州茂兰喀斯特森林不同演替下土壤真核微生物多样性·····	王显,龙健,李娟,刘灵飞,廖洪凯,李宜蓉,杨睿(4314)
玉米秸秆生物炭固化细菌对镉砷吸附·····	刘玉玲,朱虎成,彭鸥,李丹阳,杨蕊嘉,彭晶,铁柏清(4322)
无机态氮素转化机制及水土体氮源识别方法·····	梁杏,孙立群,张鑫,张洁,付鹏宇(4333)
《环境科学》征订启事(4061)	
《环境科学》征稿简则(4132)	
信息(4233, 4293, 4304)	

玉米秸秆生物炭固化细菌对镉砷吸附

刘玉玲^{1,2,3}, 朱虎成¹, 彭鸥^{1,2,3}, 李丹阳^{1,2,3}, 杨蕊嘉^{1,2,3}, 彭晶^{1,2,3}, 铁柏清^{1,2,3*}

(1. 湖南农业大学资源环境学院, 长沙 410128; 2. 湖南省灌溉水源水质污染净化工程技术研究中心, 长沙 410128; 3. 重金属污染耕地安全高效利用湖南省工程研究中心, 长沙 410128)

摘要: 为了确保细菌对镉砷复合污染土壤的修复效果, 对细菌进行固定化处理. 本研究将细菌悬液 (*Delftia* sp. B9, B9)、玉米秸秆生物炭 (corn stalks biochar, CSB) 以及玉米秸秆生物炭-细菌复合体 (corn stalks biochar-bacteria complex, B-CSB) 作为 3 种吸附材料, 探究 3 种材料对镉和砷的吸附特性及 pH 对 3 种材料去除水中镉砷离子性能的影响, 进行了等温吸附模型拟合, 并采用扫描电镜 (SEM)、傅里叶红外变换光谱 (FT-IR) 和 X 射线光电子能谱分析 (XPS) 对 3 种材料进行表征分析, 同时探究添加 B9、CSB 和 B-CSB 对土壤中镉和砷形态变化的影响. 结果表明, 3 种材料对 Cd^{2+} 的饱和吸附量分别为 49.43、82.68 和 75.38 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$; 对 As 的饱和吸附量分别为 24.67、42.92 和 34.03 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$. 添加 B-CSB 可使土壤中的弱酸可溶态 Cd 显著下降, 残渣态 Cd 显著增加; 铁型砷含量显著减少, 残渣态砷含量增加. B-CSB 是一种更有效地修复镉砷复合污染的材料.

关键词: 玉米秸秆生物炭; 固定化; 微生物; 镉; 砷; 吸附

中图分类号: X172 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2020)09-4322-11 DOI: 10.13227/j.hjkk.201912036

Adsorption of Cadmium and Arsenic by Corn Stalk Biochar Solidified Microorganism

LIU Yu-ling^{1,2,3}, ZHU Hu-cheng¹, PENG Ou^{1,2,3}, LI Dan-yang^{1,2,3}, YANG Rui-jia^{1,2,3}, PENG Jing^{1,2,3}, TIE Bai-qing^{1,2,3*}

(1. College of Resources and Environment, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China; 2. Engineering Research Center for Water Pollution Purification of Irrigation Source in Hunan Province, Changsha 410128, China; 3. Hunan Engineering Research Center for Safe and High-Efficient Utilization of Heavy Metal Pollution Farmland, Changsha 410128, China)

Abstract: Immobilization of bacteria on biochar can improve the performance of the soil complex polluted with cadmium (Cd) and arsenic (As). In this study, bacteria (*Delftia* sp. B9, B9), biochar (corn stalks biochar, CSB), and biochar-bacteria complexes (B-CSB) were used as adsorption materials to explore the adsorption characteristics of Cd and As. The effects of pH on the adsorption performance of Cd and As and the ion removal from the aqueous solution were investigated, and the adsorption behaviors were simulated using an isothermal adsorption model. The changes in Cd and As speciation with the addition of B9, CSB, and B-CSB to As and Cd-contaminated soil were explored. The results showed that the Cd-saturated adsorption capacities of B9, CSB, and B-CSB were 49.43, 82.68, and 75.38 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$, respectively; the As-saturated adsorption capacities were 24.67, 42.92, and 34.03 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$, respectively. The concentration of available Cd and As significantly decreased, whereas the residual fraction increased after the addition of B-CSB. B-CSB was shown to be an effective material for the remediation of soil complexes polluted with Cd and As.

Key words: corn stalks biochar; solidified; microorganism; cadmium; arsenic; adsorption

土壤重金属污染已成为社会发展过程中亟待解决的问题, 因其具有不可降解、累积性和高毒性等特点^[1], 进入土壤后会造成作物质量和产量下降, 同时通过食物链在生物体内累积, 对生物体造成不可逆损害^[2,3]. 人类的金属与类金属的生产与消费活动会造成土壤污染, 且我国的重金属污染大多为伴生性、复杂性和综合性的复合污染^[4], Cd 和 As 是常被发现存在于土壤中共存的 I 致癌物^[5], 文献^[6]的数据显示, 全国土壤污染物点位超标率中 Cd 达到 7.0%, 砷达到 2.7%. “十三五”期间, “农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”专项中设置了 14 个农田 Cd 和 As 污染防治领域项目, 将 Cd 和 As 的防治列为重要研究内容^[7]. 刘春早等^[8]对湘江流域土壤中重金属含量的研究结果表明, Cd

和 As 总量分别在 0.13 ~ 76.84 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 和 4.25 ~ 549.67 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 之间. 徐启胜等^[9]对湖南省土壤中重金属含量调查发现, Cd 和 As 含量分别超过背景值 87.58 倍和 15.89 倍.

微生物修复重金属污染土壤主要通过生物吸附、转化、矿化及溶解作用实现. 已有研究表明微生物对重金属的修复作用, 如 *Bacillus megaterium*、*Pseudomonas stutzeri*、*Halomonas* 和 *Delftia* 等已被证明能够减少土壤中有效态 Cd, 并减少作物各部位积累 Cd^[10-12]. Xu 等^[13]研究的抗砷菌 *Acidithiobacillus*

收稿日期: 2019-12-04; 修订日期: 2020-03-22

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2017YFD0801505)

作者简介: 刘玉玲 (1992 ~), 女, 硕士, 主要研究方向为农田重金属污染治理与修复, E-mail: 2227283058@qq.com

* 通信作者, E-mail: tiebq@qq.com

ferrooxidans DLC-5, 对去除低浓度 As 具有很大潜力; 共生的 *Halomonas* sp. 可促进 *Chlorella salina* 对 As 的吸收和富集, 增强对 As 污染水体的修复效果^[14]. 段靖禹等^[15]研究生物炭复合青霉菌可固定土壤中 27% 的 As(IV). 然而, 土壤中生存环境复杂, 重金属及其他污染物的毒害作用和土著微生物菌群的竞争作用等都会降低外源添加微生物的存活效率, 使之难以形成稳定的群落结构, 降低修复效果^[16,17].

微生物固定化技术发展于 20 世纪 60 年代后期, 已有研究表明生物炭、活性炭、棉纤维和海藻酸钙等都是微生物良好的载体^[18~21]. 生物炭比表面积较大, 含有多种含氧官能团, 如羧基、酚羟基和羰基等, 能够固定重金属^[22~24]. 生物炭的孔隙结构可减少细胞的分散性并提供更多的生存空间^[25]; 生物炭中存在的 C、O、K、N 和 P 等元素可为微生物提供营养元素^[26]. 目前, 微生物固定化技术在土壤中主要应用于有机污染治理, 对于重金属污染治理研究相对较少. 戚鑫等^[27]利用生物炭固定微生物可显著降低土壤中可提取态 U 和 Cd 含量, 钝化效果最为显著; 张松等^[28]利用生物炭固定化融合菌株 F14 提高该菌株对砷的去除能力, 去除率增加了 58%.

本研究以玉米秸秆生物炭作为细菌固定化载体, 比较生物炭-细菌复合体与单一细菌及生物炭对镉和砷的吸附特性与去除效果, 并将其应用于土壤中, 探究对复合污染土壤中镉砷形态的影响, 以期为生物炭固定化细菌高效修复镉砷复合污染土壤的实际应用提供理论基础.

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试生物炭

玉米秸秆产自河南省郑州市, 用去离子水将玉

米秸秆清洗、干燥并粉碎后过 10 目筛, 放入坩埚中并置于马弗炉内 500℃ 限氧条件下热解 2 h, 待冷却至室温后取出, 用 0.1 mol·L⁻¹ 的 HCl 洗涤至洗液呈中性后烘干, 磨碎, 过 100 目筛得到玉米秸秆生物炭(CSB).

1.1.2 菌体制备

本研究所用菌株为 *Delfia* sp. B9(B9), 基因登录号: MF679148, 菌种保藏号: CGMCC No. 16073.

液体培养基: 蛋白胨 10 g、牛肉膏 3 g 和氯化钠 5 g 用蒸馏水定容至 1 L, 调节 pH 7.2~7.4. 121℃ 高压灭菌 30 min.

菌体的制备: 将 B9 接种在液体培养基中 30℃、120 r·min⁻¹ 振荡培养 24 h, 用无菌水洗涤两次后制成 $D_{600} = 1.6 (7.6 \times 10^8 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1})$ 的菌悬液.

菌悬液在 5 000 r·min⁻¹ 离心后弃上清液, 菌体用 0.85% 生理盐水稀释后再离心, 如此反复 3 次, 以去除培养基成分. 最后一次离心的菌体用 0.85% 生理盐水制成菌悬液, 备用. 同时取混匀后菌悬液离心烘干, 测定细菌干重.

1.1.3 生物炭-细菌复合体制备

复合体制备: 生物炭和菌悬液以固液比 1:4 (干重比约为 25:1) 的比例混合于锥形瓶中, 在 30℃、120 r·min⁻¹ 条件下振荡 2 h, 制得复合体悬浮液(B-CSB).

1.1.4 吸附材料结构表征

B9、CSB 和 B-CSB 这 3 种吸附材料表面特征测定: 样品形貌特征用场发射扫描电子显微镜(SEM, QUANTA430, FEI 公司, 美国); 吸附前后材料分析采用傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR Nixolet iS50, ThermoFisher 科技有限公司, 美国)和 X 射线光电子能谱仪(XPS ESCALAB 250Xi, ThermoFisher 科技有限公司, 美国).

1.1.5 供试土壤

供试土壤采自湖南省株洲市, 表 1 为理化性质.

表 1 土壤理化性质

Table 1 Physical and chemical properties of soil

项目	pH	有机质 /g·kg ⁻¹	阳离子交换量 /cmol·kg ⁻¹	总 Cd /mg·kg ⁻¹	总 As /mg·kg ⁻¹	有效态镉 /mg·kg ⁻¹	有效态砷 /mg·kg ⁻¹
参数值	7.71	60.12	14.14	253.72	147.18	151.64	1.55

1.2 B9、CSB 和 B-CSB 对 Cd 和 As 吸附实验

1.2.1 等温吸附实验

设置吸附体系中 B9、CSB 和 B-CSB 的投加量均为 0.1 g·L⁻¹, 准确设置 Cd²⁺/As(V) 质量浓度梯度为 0、1、5、10、20 和 50 mg·L⁻¹ (每个质量浓度梯度设置 3 个平行样), 用 0.1 mol·L⁻¹

HNO₃/NaOH 溶液调节吸附体系 pH 为 6.0 ± 0.1, 在 25℃、120 r·min⁻¹ 振荡 12 h, 振荡结束后在 5 000 r·min⁻¹ 的条件下离心 10 min, 上清液用 0.45 μm 水系滤膜过滤, 滤液 Cd²⁺ 质量浓度采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP Optima 8300, PE 公司, 美国)测定, As(V) 质量浓度采

用原子荧光光度计(BAF-2000 ,宝德仪器有限公司,中国)测定.

1.2.2 pH 对吸附效果的影响

吸附体系中 B9、CSB 和 B-CSB 的投加量均为 $0.1\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, $\text{Cd}^{2+}/\text{As}(\text{V})$ 初始质量浓度为 $10\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, 吸附体系 pH 分别调节为 3、4、5、6、7、8 和 9(用 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ HNO}_3/\text{NaOH}$ 溶液调节,每个 pH 梯度设置 3 个平行样),在 25°C , $120\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 振荡 12 h,振荡结束后在 $5\,000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 的条件下离心 10 min,上清液用 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 水系滤膜过滤,测定方法同 1.2.1 节.

1.3 B9、CSB 和 B-CSB 对土壤中 Cd 和 As 形态的影响

1.3.1 土壤培养实验

本实验用土经阳光暴晒、晾干后过 2 mm 筛,每个烧杯中装 200 g 干土,设置 4 个处理,每个处理 3 个平行,各处理见表 2. 分别于培养后 0、5、10、20、30 和 60 d 取鲜土样 20.0 g,风干后研磨过 100 目筛,测定镉和砷各形态含量.

表 2 土壤培养实验

Table 2 Soil culture experiment

编号	处理	吸附剂材料/g
CK	对照,土壤不添加吸附材料	—
T1	土壤添加 0.1% B9	0.2
T2	土壤添加 0.1% CSB	0.2
T3	土壤添加 0.1% B-CSB	0.2

1.3.2 分析测定方法

Cd 形态分析采用优化 BCR 法^[29],分为弱酸可溶态 Cd(包括可交换态和碳酸盐结合态)、可还原态 Cd(铁锰氧化物结合态)、可氧化态 Cd(包括有机物结合态、硫化物结合态)和残渣态 Cd. 砷形态分析采

用分级测定的方法^[30],分为交换态砷(AE-As)、Al 型砷(Al-As)、Fe 型砷(Fe-As)、Ca 型砷(Ca-As)和残渣态砷(Res-As). 所有样品处理过程中同时添加试剂空白、质控样. 镉砷各形态含量测定方法同 1.2.1 节.

1.4 数据分析

B9、CSB 和 B-CSB 对 Cd 和 As 吸附效果通过 Cd 和 As 吸附量来衡量. 其计算公式如式(1)所示.

$$Q_e = (c_0 - c_e)V/m \tag{1}$$

式中, c_0 为溶液初始浓度, $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$; c_e 为溶液吸附平衡时浓度, $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$; V 为溶液体积, mL; m 为吸附剂质量, g.

用 Langmuir 模型对等温吸附实验数据进行拟合. Langmuir 模型属单分子层吸附模型如式(2)所示.

$$q_e = q_{\max}K_Lc_e/(1 + K_Lc_e) \tag{2}$$


式中, $q_{\max}$ 为吸附剂的单层饱和最大吸附量, $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$; c_e 为吸附平衡时溶液浓度, $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$; K_L 为 Langmuir 吸附常数, $\text{L}\cdot\text{g}^{-1}$, 当 $0 < K_L < 1$, 表明有利于吸附; $K_L > 1$, 表示不利于吸附; $K_L = 1$, 属于线性分配; K_L 趋于 0, 表示不可逆吸附.

2 结果与分析

2.1 吸附材料微观形貌及对 Cd 和 As 吸附

2.1.1 表征分析

通过 SEM 可直观地反映吸附材料之间的形态变化. 图 1(a) 显示 CSB 表面粗糙, 有孔隙均匀分布. 如图 1(b) 所示, B9 菌呈杆状, 长约 $1\sim 2\text{ }\mu\text{m}$, 宽约 $0.4\text{ }\mu\text{m}$. 图 1(c) 显示 CSB 表面及孔隙内附着大量的 B9, 说明 B9 与 CSB 复合成功.



(a) CSB; (b) B9; (c) B-CSB

图 1 CSB、B9 和 B-CSB 的 SEM 图

Fig. 1 SEM images of CSB, B9, and B-CSB

2.1.2 等温吸附实验

表 3 是 B9、CSB 和 B-CSB 对 $\text{Cd}^{2+}/\text{As}(\text{V})$ 等温吸附模型的拟合参数; 根据式(2)拟合的 Langmuir 模型如图 2 所示. 通过分析 B9、CSB 和 B-CSB 的拟合度 R^2 可知, 3 种材料的吸附 $\text{Cd}^{2+}/$

$\text{As}(\text{V})$ 过程符合 Langmuir 模型, 可推测 B9、CSB 和 B-CSB 表面的吸附位点有限, 吸附机制属于单分子层吸附^[31]. B9、CSB 和 B-CSB 这 3 种材料对 Cd^{2+} 的最大吸附量分别为 49.43、82.68 和 75.38 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$; 3 种材料对 $\text{As}(\text{V})$ 的最大吸附量分别为

表 3 $\text{Cd}^{2+}/\text{As}(\text{V})$ 等温吸附模型拟合参数

材料	Cd^{2+} 吸附 Langmuir 模型			$\text{As}(\text{V})$ 吸附 Langmuir 模型		
	$q_{\text{max}}/\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$	$K_{\text{L}}/\text{L}\cdot\text{g}^{-1}$	R^2	$q_{\text{max}}/\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$	$K_{\text{L}}/\text{L}\cdot\text{g}^{-1}$	R^2
B9	49.43	0.3965	0.9316	24.67	0.0808	0.9515
CSB	82.68	0.3888	0.9622	42.92	0.1788	0.9816
B-CSB	75.38	0.3094	0.9943	34.03	0.1907	0.9716




图 2 B9、CSB 和 B-CSB 对 Cd 和 As 吸附等温线
Fig. 2 B9, CSB, and B-CSB on the Cd and As adsorption isotherm

24.67、42.92 和 34.03 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ (表 3).

2.1.3 pH 对吸附效果的影响

由图 3 可知,在 Cd^{2+} 初始质量浓度为 10 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,B9、CSB 和 B-CSB 对 Cd^{2+} 吸附量随溶液 pH 的增大而增加.当 $\text{pH} > 5$ 时,B-CSB 吸附量趋近平稳,吸附量约为 70 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$.当 pH 为 3 ~ 7 时,B9 和 CSB 的吸附量明显增加,当 $\text{pH} > 7$ 时,吸附量缓慢增加,B9 最大吸附量约为 60 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$,CSB 的吸附量约为 80 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$.




图 3 pH 对 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 的影响
Fig. 3 Effects of pH on the adsorption of Cd^{2+} by B9, CSB, and B-CSB

CSB 对溶液中 $\text{As}(\text{V})$ 的吸附量略有增加,但增加量不显著; $\text{pH} = 6$ 时,B9、CSB 和 B-CSB 的吸附量达到最大值,分别为 9.79、19.30 和 18.65 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$;当 pH 为 7 ~ 9 时,3 种材料对 $\text{As}(\text{V})$ 的吸附量随着 pH 的增加明显减少.




图 4 pH 对 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 $\text{As}(\text{V})$ 的影响
Fig. 4 Effects of pH on the adsorption of $\text{As}(\text{V})$ by B9, CSB, and B-CSB

2.2 吸附机制分析

2.2.1 FTIR 红外分析

傅里叶红外光谱可检测材料中所含化合物的化学结构,包括各种官能团,如氨基、羧基和羰基等. B9、CSB 和 B-CSB 吸附重金属离子前后的 FTIR 谱图如图 5 所示. B9 [图 5(a)] 细胞壁表面上基团主

由图 4 可知,当 pH 为 3 ~ 6 时,B9、CSB 和 B-

要有: $3\,291.6\text{ cm}^{-1}$ 来自蛋白质的 C—H 键、N—H 键的伸缩振动以及碳水化合物中结合水的 O—H 键伸展振动; $2\,931.5\text{ cm}^{-1}$ 处为 N—H 键的伸缩振动; $1\,656.7$ 、 $1\,536.3$ 和 $1\,390.8\text{ cm}^{-1}$ 处的谱峰分别为蛋白质酰胺 I 带 (C=O 的伸展振动)、酰胺 II 带 (N—H 键的弯曲振动与 C—N 键的伸展振动) 和酰胺 III 带; $1\,234.6\text{ cm}^{-1}$ 处的峰主要为 P=O 和 C=S 的伸缩振动及 C=O 和 O—H 的叠加; $1\,074.8\text{ cm}^{-1}$ 处的峰为胺基中 C—N 的伸缩振动、磷酸酯的振动^[32]. 当 B9 吸附 Cd^{2+} 后, $3\,291.6$ 、 $1\,656.7$ 、 $1\,536.3$ 和 $1\,390.8\text{ cm}^{-1}$ 处的来自蛋白质的 C—H 键、N—H 键以及酰胺 I、II、III 带的峰强均明显增加, 表明蛋白质上的官能团对 B9 吸附 Cd^{2+} 起重要作用. 当 B9 吸附 As(V) 后, B9 细胞壁上的基团峰强均明显增加, 并且强度大于 B9 对 Cd^{2+} 吸附. B9 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后官能团增加表明金属离子促进菌株生长和产生更多的活性基团.

CSB[图 5(b)] 主要特征吸收峰出现在 $3\,327.8$ 、 $1\,694.2$ 、 $1\,586.1$ 、 $1\,095.5$ 、 887.0 和 812.1 cm^{-1} 波数位置, 其中 $3\,327.8\text{ cm}^{-1}$ 处吸收峰是由 CSB 表面的 C—H 键的伸缩振动; $1\,694.2\text{ cm}^{-1}$ 处吸收峰为芳香酸类—COOH; $1\,586.1\text{ cm}^{-1}$ 处吸收峰是由—COOH、—OH 和内酯基的 C—O 和 C=C 的伸缩振动; $1\,095.5\text{ cm}^{-1}$ 处为醚键 R—O—R'; 887.0 cm^{-1} 和 812.1 cm^{-1} 处均为吡啶、吡咯等芳香化和杂环化

合物的不饱和烃基=C—H 弯曲振动^[33]. 当 CSB 吸附 Cd^{2+} 后, $3\,327.8$ 、 $1\,586.1$ 、 $1\,095.5$ 、 887.0 和 812.1 cm^{-1} 处峰强均明显减弱, 表明 CSB 的 C—H、—COOH、—OH、C—O、C=C 和 R—O—R' 与 Cd^{2+} 发生配位络合、离子交换, 含氧官能团、芳香类化合物提供 π 电子与 Cd^{2+} 形成稳定结构. 当 CSB 吸附 As(V) 后, CSB 的官能团峰强均明显增加, —COOH、—OH、—C—O、—C=C 等的变化表明 As(V) 与 CSB 表面发生羟基络合作用及与生物炭表面芳香族化合物发生亲电取代反应.

B9 与 CSB 复合 [B-CSB, 图 5(c)] 后大部分基团波峰变宽, 与 B9 相比, $1\,656.7\text{ cm}^{-1}$ 处酰胺 I 带的 C=O 峰消失, $3\,291.6$ 、 $2\,931.5$ 、 $1\,390.8$ 和 $1\,234.6\text{ cm}^{-1}$ 处峰强均减弱, $1\,536.3\text{ cm}^{-1}$ 处酰胺 II 带峰宽峰强增强. 与 CSB 相比, 增加了 $3\,291.7\text{ cm}^{-1}$ 处的 O—H, $1\,694.2\text{ cm}^{-1}$ 处芳香类—COOH 峰消失, 其他处峰强有所增强. B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后, $3\,291.7$ 、 $2\,924.4$ 、 $1\,231.0$ 和 $1\,086.7\text{ cm}^{-1}$ 处的 O—H、N—H、P=O、C=S 和 C=O 等峰强均增加, 均增加 $1\,637.6\text{ cm}^{-1}$ 处的酰胺 I 带 C=O 的伸展振动峰. B-CSB 吸附 As(V) 后, 800.5 cm^{-1} 处峰强增加, Hu 等^[34] 的研究表明, 在 $650 \sim 950\text{ cm}^{-1}$ 间出现 As—O 伸缩振动带.

2.2.2 X 射线光电子能谱(XPS)分析

通过对 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V)




图 5 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后的 FTIR 图谱

Fig. 5 FTIR spectrograms of B9, CSB, and B-CSB before and after the absorption of Cd^{2+} and As(V)

前后的表面元素结合能的变化来进一步研究 3 种吸附材料对 Cd^{2+} 和 As(V) 的吸附机制(图 6). 3 种吸附材料的 $\text{O } 1s/\text{C } 1s$: $\text{CSB} > \text{B-CSB} > \text{B9}$, B9 、 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后, $\text{O } 1s/\text{C } 1s$ 均增加, 表明吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后芳香化程度增强, 含氧官能团增

多, 但含氧官能团数量减少. CSB 吸附 As(V) 后, $\text{O } 1s/\text{C } 1s$ 降低, $\text{O } 1s$ 含量减少, $\text{C } 1s$ 含量没有明显变化, 表明含氧官能团在吸附 As(V) 时起作用. 因此, 利用 XPS Peak 软件对 3 种吸附材料的 $\text{O } 1s$ 峰面积及 RWA 值进行了分析.




图 6 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后的 XPS 图谱

Fig. 6 XPS spectrograms of B9, CSB, and B-CSB before and after the absorption of Cd^{2+} and As(V)

图 7 是 B9、CSB 和 B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 前后 $\text{O } 1s$ 谱图. B9 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 前后峰值分别在 531.29、531.52 和 531.53 eV 处可归类为 $\text{C}=\text{O}/\text{P}=\text{O}$, 峰值分别在 532.58、532.80 和 532.74 eV 处可归类为 $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$. B9 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后 $\text{C}=\text{O}/\text{P}=\text{O}$ 的峰面积从 37.88% 分别增加到 41.63% 和 52.99%; $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$ 的峰面积从 62.12% 分别减少到 58.37%、47.01%. CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 前后峰值在 531.60、531.45 和 531.49 eV 处可归类为 $\text{C}=\text{O}$, 峰值在 533.30、533.32 和 533.18 eV 处可归类为 $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$. CSB 吸附 Cd^{2+} 后 $\text{C}=\text{O}$ 和 $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$ 的峰面积未发生明显改变; 吸

附 As(V) 后, $\text{C}=\text{O}$ 的峰面积从 23.72% 减少到 19.60%, $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$ 的峰面积从 76.28% 增加到 80.4%. B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 前后峰值在 531.39、531.9 和 531.39 eV 处可归类为 $\text{C}=\text{O}/\text{P}=\text{O}$, 峰值在 532.61、533.14 和 532.80 eV 处可归类为 $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$. B-CSB 吸附 Cd^{2+} 和 As(V) 后 $\text{C}=\text{O}/\text{P}=\text{O}$ 的峰面积从 22.17% 分别增加到 47.67% 和 29.16%; $\text{C}-\text{O}-\text{C}/\text{C}-\text{O}-\text{H}$ 的峰面积从 77.83% 分别减少到 52.33% 和 70.84%.

2.3 吸附材料的添加对镉砷复合污染土壤中镉和砷形态的影响

土壤培养 60 d 后镉形态变化如图 8 所示, 与 CK 相比, B9(T1)、CSB(T2) 和 B-CSB(T3) 的添加




图 7 氧元素核心轨道 X 射线光电子能谱图

Fig. 7 Oxygen element core orbit XPS image




图 8 B9、CSB 和 B-CSB 对复合污染土壤中镉形态的影响

Fig. 8 Effects of the addition of B9, CSB, and B-CSB on the cadmium form in cadmium-arsenic complex contaminated soil

均能降低土壤中弱酸可溶态 Cd 含量,可还原态和残渣态 Cd 含量增加,可氧化态 Cd 含量变化不明显. 在培养 60 d 后,T1、T2 和 T3 处理中弱酸可溶态 Cd 含量降至最小值,分别减少了 8.85%、10.14% 和 13.36%,并且减少量是 T3 > T2 > T1;可还原态 Cd 含量增加明显,培养至第 60 d 时分别达到 9.85%、10.08% 和 9.55%,比初始培养时分别增加

了 2.04%、2.27% 和 1.74%;残渣态 Cd 含量明显增加,培养至 60 d 时分别增加了 5.86%、6.37% 和 10.35%.

土壤培养 60 d 后,砷形态变化如图 9 所示,与 CK 相比,添加 3 种材料后均能减少土壤中 AE-As、Al-As 和 Fe-As 含量,增加 Ca-As 和 Res-As 含量. 培养 60 d 后,T1、T2 和 T3 处理中 Fe-As 含量与初始




图9 B9、CSB 和 B-CSB 对复合污染土壤中 As 形态的影响

Fig. 9 Effects of the addition of B9, CSB, and B-CSB on the form of arsenic in cadmium-arsenic complex contaminated soil

相比分别减少了 1.56%、2.21% 和 2.86%, 并且减少量是 $T3 > T2 > T1$; 土壤中 AE-As 的降幅为 0.90% ~ 1.04%; Al-As 的降幅为 1.57% ~ 2.91%。T1、T2 和 T3 处理中 Ca-As 含量分别增加 5.89%、6.27% 和 7.19%; Res-As 含量分别增加 3.90%、4.33% 和 5.35%, 且增加量是 $T3 > T2 > T1$ 。培养 60 d 后 CK 中各形态砷含量变化不明显。

3 讨论

Delftia sp. B9 可以在 Cd^{2+} 浓度为 $300\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, As(V) 浓度为 $200\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 的条件下生长良好, 且对 Cd^{2+} 和 As(V) 的理论最大吸附量分别达到 $49.43\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 和 $24.67\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ (表 3), 表明 B9 对 Cd^{2+} 和 As(V) 均具有较好地吸附效果。B9 在土壤修复实际应用中^[12], 外源添加到污染土壤后, 对早稻 (较短时间) 土壤镉形态影响较小, 对晚稻 (较长时间) 土壤形态影响增大, 这可能是实际应用中土壤及外界环境复杂, 威胁外源添加细菌的生长和存活, 限制细菌发挥作用。生物炭作为细菌固定化的载体修复重金属污染的研究还较少, 生物炭固定细菌后可提供营养元素及生存空间, 增加细菌的团聚性; 生物炭可以有效吸附 Cd 和 As (表 3), 在一定程度上缓解 Cd 和 As 对细菌的毒害作用, 增加细菌的存活效率, 同时可为细菌提供更多接触金属离子的机会; 生物炭与细菌之间的电子转移在 Cd 和 As 形态转化中起到重要作用, 复合后有增加吸附重金属的潜力^[35]。同时, 微生物对生物炭的分解速度很慢, 且分解发生在生物炭表面, 表面以下的生物炭会维持稳定的 O/C 比, 保持生物炭稳定性^[36]。本实验研究显示, 细菌与生物炭复合 (B-CSB) 后对 Cd^{2+} 和 As(V)

理论最大吸附量均增加, 分别达到 $75.38\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 和 $34.03\text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ (图 2 和表 3), 与 B9 相比吸附量均增加, 但与 CSB 相比吸附量却有所减少, 这可能是由于细菌与生物炭复合后占据了部分生物炭上的官能团或者阻隔了生物炭官能团与重金属离子接触^[37]。

重金属总量可以评价该土壤污染水平, 但不能准确反映该金属元素的生物有效性与生态风险大小, 金属元素的不同存在形态环境行为和生态效应不同, 故分析重金属不同赋存形态具有重要意义^[38]。土壤中的弱酸可溶态 Cd 易直接被植物吸收; 残渣态 Cd 主要赋存于原生、次生矿物与硅酸盐等土壤晶格中, 几乎不能被生物利用^[39]。土壤交换态砷 (AE-As) 易迁移, 生物有效性高, 而 Al-As、Fe-As、Ca-As 和 Res-As 统称为难溶性砷^[40]。土壤培养实验结果表明, 经过 60 d 的培养, 添加 B9、CSB 及 B-CSB 后土壤中镉砷形态均发生一定变化 (图 8 和 9), 对于 B9 和 CSB 对土壤中镉形态的影响原理已有过探讨^[41,42]。土壤中的砷主要以阴离子形式存在, 对铁锰氧化物具有较强的亲和力, 而生物炭有较强的阳离子交换能力, 可以与土壤中的 Fe 和 Mn 结合, 形成铁锰氧化物, 从而达到吸附及转化砷的效果^[15,43]。B9 细胞表面的羟基可被 As(V) 取代或络合, 从而吸附 As(V)^[44]; 细菌由于胞内外 As(V) 浓度差, 也会产生主动吸附将 As(V) 转移至细胞内^[45]; *Delftia* sp. B9 有较高的产铁载体的能力^[46], 铁载体可以与多种重金属离子进行络合, 形成稳定的络合物, 降低重金属的浓度, Nair 等^[47]报道铁载体可与镉、镍、铅、钴和砷等络合形成稳定的络合物, 铁载体中的官能团可通过多价阳离子桥接作用或者氨基质子化作用与砷酸根离子螯合^[48]。本研究中有

效态砷、铝型砷和铁型砷含量减少,钙型砷和残渣态砷含量增加.随着培养时间的延长,B-CSB 对土壤中镉砷形态的影响大于 B9 和 CSB,这可能是由于细菌与生物炭复合后,生物炭为细菌提供更加适宜的生存空间,*Delftia* sp. B9 生物量比单一添加细菌增加更多^[49],故增加了对镉砷形态的影响.

4 结论

(1)生物炭-细菌复合体(B-CSB)增加了 *Delftia* sp. B9 对 Cd^{2+} 和 As(V) 的吸附能力, Cd^{2+} 和 As(V) 的吸附量分别由 $49.43 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 和 $24.67 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 增加至 $75.38 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 和 $34.03 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$.

(2)在 $\text{Cd}^{2+}/\text{As(V)}$ 初始质量浓度为 $10 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,3 种吸附材料吸附 Cd^{2+} 的量随着 pH 的增加而增加,吸附 As(V) 的量随着 pH 的增加而减少.

(3)生物炭-细菌复合体(B-CSB)对土壤中镉砷形态影响更大,能增加 Cd 从弱酸可溶态向可还原态和残渣态转化,增加 As 从铁型砷向残渣态砷转化.

参考文献:

- [1] 张静静,朱爽阁,朱利楠,等.不同钝化剂对微碱性土壤镉、镍形态及小麦吸收的影响[J].环境科学,2020,41(1): 460-468.
Zhang J J, Zhu S G, Zhu L N, et al. Effects of different amendments on fractions and uptake by winter wheat in slightly alkaline soil contaminated by cadmium and nickel [J]. Environmental Science, 2020, 41(1): 460-468.
- [2] Rahman M F, Ghosal A, Alam M F, et al. Remediation of cadmium toxicity in field peas (*Pisum sativum* L.) through exogenous silicon[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, 135: 165-172.
- [3] O'Connor D, Peng T Y, Zhang J L, et al. Biochar application for the remediation of heavy metal polluted land: A review of in situ field trials[J]. Science of the Total Environment, 2018, 619-620: 815-826.
- [4] 张继舟,王宏韬,倪红伟,等.我国农田土壤重金属污染现状、成因与诊断方法分析[J].土壤与作物,2012,1(4): 212-218.
Zhang J Z, Wang H T, Ni H W, et al. Current situation, sources and diagnosis method analysis of heavy metal contamination in agricultural soils[J]. Soil and Crop, 2012, 1(4): 212-218.
- [5] Diacomanolis V, Noller B N, Ng J C. Bioavailability and pharmacokinetics of arsenic are influenced by the presence of cadmium[J]. Chemosphere, 2014, 112: 203-209.
- [6] 环境保护部,国土资源部.全国土壤污染状况调查公报[J].中国环保产业,2014,(5): 10-11.
- [7] 徐长春,郑戈,林友华.“十三五”国家重点研发计划农田镉砷污染防治领域资助情况概述[J].农业环境科学学报,2018,37(7): 1321-1325.
Xu C C, Zheng G, Lin Y H. Brief introduction to research projects on prevention and control of cadmium and arsenic pollution in crop-lands supported by National Key R&D Program of China in 13th Five-Year Period [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2018, 37(7): 1321-1325.
- [8] 刘春早,黄益宗,雷鸣,等.湘江流域土壤重金属污染及其生态环境风险评价[J].环境科学,2012,33(1): 260-265.
Liu C Z, Huang Y Z, Lei M, et al. Soil contamination and assessment of heavy metals of Xiangjiang River basin [J]. Environmental Science, 2012, 33(1): 260-265.
- [9] 徐启胜,李雨晴,陈燕,等.我国中南地区土壤重金属污染状况及其空间分布研究[J].北方农业学报,2018,46(3): 93-100.
Xu Q S, Li Y Q, Chen Y, et al. Study on heavy metal pollution and its spatial distribution in soil in central south China [J]. Journal of Northern Agriculture, 2018, 46(3): 93-100.
- [10] Li Y, Pang H D, He L Y, et al. Cd immobilization and reduced tissue Cd accumulation of rice (*Oryza sativa* wuyun-23) in the presence of heavy metal-resistant bacteria[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, 138: 56-63.
- [11] Siripornadulsil S, Siripornadulsil W. Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of cadmium in rice: potential for microbial bioremediation [J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2013, 94: 94-103.
- [12] Liu Y L, Tie B Q, Li Y X, et al. Inoculation of soil with cadmium-resistant bacterium *Delftia* sp. B9 reduces cadmium accumulation in rice (*Oryza sativa* L.) grains[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 163: 223-229.
- [13] Xu S H, Xu R X, Nan Z R, et al. Bioadsorption of arsenic from aqueous solution by the extremophilic bacterium *Acidithiobacillus ferrooxidans* DLC-5 [J]. Biocatalysis and Biotransformation, 2018, 37(1): 35-43.
- [14] 许平平,刘聪,王亚,等.共生细菌对盐生小球藻富集和转化砷酸盐的影响[J].环境科学,2016,37(9): 3438-3446.
Xu P P, Liu C, Wang Y, et al. Effects of a symbiotic bacterium on the accumulation and transformation of arsenate by *Chlorella salina* [J]. Environmental Science, 2016, 37(9): 3438-3446.
- [15] 段靖禹,李华,马学文,等.青霉菌与生物炭复合修复土壤砷污染的研究[J].环境科学学报,2019,39(6): 1999-2005.
Duan J Y, Li H, Ma X W, et al. Study on the remediation of arsenic pollution in soil by the combination of penicillium and biochar [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2019, 39(6): 1999-2005.
- [16] Li X Q, Meng D L, Li J, et al. Response of soil microbial communities and microbial interactions to long-term heavy metal contamination[J]. Environmental Pollution, 2017, 231: 908-917.
- [17] Igalavithana A D, Lee S E, Lee Y H, et al. Heavy metal immobilization and microbial community abundance by vegetable waste and pine cone biochar of agricultural soils [J]. Chemosphere, 2017, 174: 593-603.
- [18] Ma X S, Li N J, Jiang J, et al. Adsorption-synergic biodegradation of high-concentrated phenolic water by *Pseudomonas putida* immobilized on activated carbon fiber[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2013, 1(3): 466-472.
- [19] de-Bashan L E D, Bashan Y. Immobilized microalgae for removing pollutants: review of practical aspects[J]. Bioresource Technology, 2010, 101(6): 1611-1627.
- [20] Bergero M F, Liffourrena A S, Opizzo B A, et al. Immobilization of a microbial consortium on Ca-alginate enhances degradation of cationic surfactants in flasks and bioreactor[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2017, 117: 39-44.

- [21] Lonappan L, Liu Y X, Rouissi T, *et al.* Covalent immobilization of laccase on citric acid functionalized micro-biochars derived from different feedstock and removal of diclofenac[J]. Chemical Engineering Journal, 2018, **351**: 985-994.
- [22] Shaheen S M, Niazi N K, Hassan N E E, *et al.* Wood-based biochar for the removal of potentially toxic elements in water and wastewater: a critical review [J]. International Materials Reviews, 2018, **64**(4): 216-247.
- [23] Archanjo B S, Mendoza M E, Albu M, *et al.* Nanoscale analyses of the surface structure and composition of biochars extracted from field trials or after co-composting using advanced analytical electron microscopy[J]. Geoderma, 2017, **294**: 70-79.
- [24] 梁婷, 李莲芳, 朱昌雄, 等. 铈锰改性生物炭对土壤 As 的固定效应[J]. 环境科学, 2019, **40**(11): 5114-5123.
Liang T, Li L F, Zhu C X, *et al.* Cerium-manganese modified biochar immobilizes arsenic in farmland soils[J]. Environmental Science, 2019, **40**(11): 5114-5123.
- [25] Chen B Y, Chen C Y, Guo W Q, *et al.* Fixed-bed biosorption of cadmium using immobilized *Scenedesmus obliquus* CNW-N cells on loofa (*Luffa cylindrica*) sponge[J]. Bioresource Technology, 2014, **160**: 175-181.
- [26] Gul S, Whalen J K, Thomas B W, *et al.* Physico-chemical properties and microbial responses in biochar-amended soils: Mechanisms and future directions[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015, **206**: 46-59.
- [27] 戚鑫, 陈晓明, 肖诗琦, 等. 生物炭固定化微生物对 U、Cd 污染土壤的原位钝化修复[J]. 农业环境科学学报, 2018, **37**(8): 1683-1689.
Qi X, Chen X M, Xiao S Q, *et al.* In situ remediation of U- and Cd-contaminated soils by immobilized microorganisms and biochar[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2018, **37**(8): 1683-1689.
- [28] 张松, 侯彬, 纪婷婷, 等. 生物炭固定化融合菌株 F14 方法的研究及其对砷的去除[J]. 农业环境科学学报, 2018, **37**(3): 464-470.
Zhang S, Hou B, Ji T T, *et al.* Degradation of pyrene by immobilized cells of fusant bacterial strain F14 using biochar[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2018, **37**(3): 464-470.
- [29] 张永利, 刘晓文, 陈启敏, 等. Tessier 法和改进 BCR 法提取施加熟污泥后黄土中 Cd 的对比研究[J]. 环境工程, 2019, **37**(5): 34-38, 81.
Zhang Y L, Liu X W, Chen Q M, *et al.* Comparative study of tessier method and modified BCR method for extracting Cd in loess amended by composted sludge [J]. Environmental Engineering, 2019, **37**(5): 34-38, 81.
- [30] 刘凤枝. 农业环境监测实用手册[M]. 北京: 中国标准出版社, 2001: 97-107.
- [31] 李丹阳, 杨蕊嘉, 罗海艳, 等. 十六烷基三甲基溴化铵改性生物炭对水中镉离子吸附性能的影响[J]. 环境工程学报, 2019, **13**(8): 1809-1821.
Li D Y, Yang R J, Luo H Y, *et al.* Effect of adsorption of cadmium from aqueous solution by hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified biochar[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, **13**(8): 1809-1821.
- [32] 刘红娟, 党志, 张慧, 等. 蜡状芽孢杆菌抗重金属性能及对镉的累积[J]. 农业环境科学学报, 2010, **29**(1): 25-29.
Liu H J, Dang Z, Zhang H, *et al.* Characterization of heavy metal resistance and Cd-accumulation on a *Bacillus cereus* strain [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2010, **29**(1): 25-29.
- [33] 谢超然, 王兆炜, 朱俊民, 等. 核桃青皮生物炭对重金属铅、铜的吸附特性研究[J]. 环境科学学报, 2016, **36**(4): 1190-1198.
Xie C R, Wang Z W, Zhu J M, *et al.* Adsorption of lead and copper from aqueous solutions on biochar produced from walnut green husk[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2016, **36**(4): 1190-1198.
- [34] Hu X, Ding Z H, Zimmerman A R, *et al.* Batch and column sorption of arsenic onto iron-impregnated biochar synthesized through hydrolysis[J]. Water Research, 2015, **68**: 206-216.
- [35] Zhu X M, Chen B L, Zhu L Z, *et al.* Effects and mechanisms of biochar-microbe interactions in soil improvement and pollution remediation: A review [J]. Environmental Pollution, 2017, **227**: 98-115.
- [36] 陈温福, 张伟明, 孟军. 农用生物炭研究进展与前景[J]. 中国农业科学, 2013, **46**(16): 3324-3333.
Chen W F, Zhang W M, Meng J. Advances and prospects in research of biochar utilization in agriculture [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2013, **46**(16): 3324-3333.
- [37] 王婷. 高效诱变菌与生物炭复合修复重金属污染土壤的研究[D]. 天津: 南开大学, 2013.
Wang T. The bioremediation of heavy metal contaminated soil by bioaugmentation of an active mutant bacterium assisted by biochar [D]. Tianjin: Nankai University, 2013.
- [38] 罗海艳, 李丹阳, 刘寿涛, 等. 铁锰改性椰壳炭对土壤镉形态及水稻吸收积累镉的影响[J]. 环境科学研究, 2019, **32**(5): 139-147.
Luo H Y, Li D Y, Liu S T, *et al.* Effects of Fe-Mn modified coconut shell biochar on cadmium speciation and accumulation in rice[J]. Research of Environmental Sciences, 2019, **32**(5): 139-147.
- [39] Jayarathne A, Egodawatta P, Ayoko G A, *et al.* Role of residence time on the transformation of Zn, Cu, Pb and Cd attached to road dust in different land uses[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, **153**: 195-203.
- [40] 杨文戮, 王英杰, 周航, 等. 水稻不同生育期根际及非根际土壤砷形态迁移转化规律[J]. 环境科学, 2015, **36**(2): 694-699.
Yang W T, Wang Y J, Zhou H, *et al.* Transformation and mobility of arsenic in the rhizosphere and non-rhizosphere soils at different growth stages of rice[J]. Environmental Science, 2015, **36**(2): 694-699.
- [41] 刘玉玲, 铁柏清, 李园星露, 等. 耐镉细菌的分离及其对土壤中镉的形态影响[J]. 农业环境科学学报, 2018, **37**(2): 250-258.
Liu Y L, Tie B Q, Li Y X L, *et al.* Isolation of a Cd-resistant bacterium and its effect on the speciation of Cd in soil [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2018, **37**(2): 250-258.
- [42] 张燕, 铁柏清, 刘孝利, 等. 玉米秸秆生物炭对稻田土壤砷、镉形态的影响[J]. 环境科学学报, 2018, **38**(2): 715-721.
Zhang Y, Tie B Q, Liu X L, *et al.* Effects of waterlogging and application of bio-carbon from corn stalks on the physico-chemical properties and the forms of arsenic and cadmium in arsenic and cadmium-contaminated soils[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2018, **38**(2): 715-721.
- [43] Yin D X, Wang X, Peng B, *et al.* Effect of biochar and Fe-biochar on Cd and As mobility and transfer in soil-rice system [J]. Chemosphere, 2017, **186**: 928-937.
- [44] Sari A, Tuzen M. Biosorption of As(III) and As(V) from aqueous solution by macrofungus (*Inonotus hispidus*) biomass: Equilibrium and kinetic studies [J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, **164**(2-3): 1372-1378.

- [45] 杨婷. 微生物细胞表面的化学/基因改性调控用于重金属分离及(形态)分析[D]. 沈阳: 东北大学, 2013.
Yang T. Chemical/genetical modification of microbial cell for heavy metal separation and analysis/speciation[D]. Shenyang: Northeastern University, 2013.
- [46] 刘玉玲, 彭鸥, 铁柏清, 等. *Delftia* sp. B9 对镉胁迫下水稻种子萌发及幼苗镉积累的影响[J]. 农业环境科学学报, 2019, **38**(8): 1855-1863.
Liu Y L, Peng O, Tie B Q, *et al.* Effects of *Delftia* sp. B9 on rice seed germination and cadmium accumulation in rice seedlings under Cd stress [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2019, **38**(8): 1855-1863.
- [47] Nair A, Juwarkar A A, Singh S K. Production and characterization of siderophores and its application in arsenic removal from contaminated soil [J]. Water, Air, and Soil Pollution, 2007, **180**(1-4): 199-212.
- [48] Crans D C, Smee J J, Gaidamauskas E, *et al.* The chemistry and biochemistry of vanadium and the biological activities exerted by vanadium compounds[J]. Chemical Reviews, 2004, **104**(2): 849-902.
- [49] Liu Y L, Tie B Q, Peng O, *et al.* Inoculation of Cd-contaminated paddy soil with biochar-supported microbial cell composite: A novel approach to reducing cadmium accumulation in rice grains[J]. Chemosphere, 2020, **247**: 125850.

环境科学

CONTENTS

Characterization of Two Heavy Pollution Episodes in Tianjin in 2020	XIAO Zhi-mei, XU Hong, CAI Zi-ying, <i>et al.</i> (3879)
Analysis of Characteristics of Water-soluble Ions in PM _{2.5} in Chengdu Based on the MARGA	YIN Han-mei, CHEN Jun-hui, FENG Xiao-qiong, <i>et al.</i> (3889)
Seasonal Characteristics and Source Analysis of Water-soluble Inorganic Ions in PM _{2.5} in Suqian City	MA Hong-lu, ZHAO Xin, LU Jian-gang, <i>et al.</i> (3899)
Characterization and Size Distribution of Carbonaceous Aerosols at Mountain Dinghu	LI An-na, WEN Tian-xue, HUA Wei, <i>et al.</i> (3908)
Characteristics and Source Apportionment of Carbon Components in Road Dust in Anshan	LIN Zi, JI Ya-qin, LIN Yu, <i>et al.</i> (3918)
Spectral Characteristics and Source Analysis of WSOC of PM _{2.5} in Winter of Xi'an	YANG Yi, ZHANG Ya-nan, LIU Huan-wu, <i>et al.</i> (3924)
Observation of Aerosol Optical Properties and New Particle Formation in the Yangtze River Delta	DU Ying-ying, CHEN Jun, ZHANG Jia-luo, <i>et al.</i> (3932)
Component Characteristics and Source Appointment of Volatile Organic Compounds in Lianyungang City	CUI Jin-meng, WANG Ti-jian, LI Qiu-tong, <i>et al.</i> (3941)
Seasonal Pollution Characteristics and Analysis of the Sources of Atmospheric VOCs in Chengdu Urban Area	WANG Cheng-hui, CHEN Jun-hui, HAN Li, <i>et al.</i> (3951)
Ozone Sensitivity Analysis and Emission Controls in Dezhou in Summer	YAN Ru-sha (3961)
Inventory and Distribution Characteristics of China's Thermal Power Emissions Under Ultra-Low Reconstruction	QU Jia-bao, WANG Peng, BO Xin, <i>et al.</i> (3969)
Establishment and Spatial Distribution of Anthropogenic Ammonia Emission Inventory in Zhejiang Province	ZHAO Rui-dong, YU Xing-na, HOU Xin-hong, <i>et al.</i> (3976)
Evaluation and Screening of Dioxin Control Technology in Waste Incineration Flue Gas	ZHAO Si-lan, XI Peng-fei, GUO Feng-yan, <i>et al.</i> (3985)
Characteristics of Stable Isotopes and Moisture Sources of Two Typical Precipitation Events in Lanzhou City	HAN Ting-ting, ZHANG Ming-jun, WANG Sheng-jie, <i>et al.</i> (3993)
Hydrochemical Characteristics and Possible Controls of the Surface Water in Ranwu Lake Basin	ZHANG Tao, WANG Ming-guo, ZHANG Zhi-yin, <i>et al.</i> (4003)
Chemical Evolution and Formation Mechanism of Groundwater in Hetao Irrigation Area	CUI Jia-qi, LI Xian-yue, SHI Hai-bin, <i>et al.</i> (4011)
Chemical Characteristics of Groundwater and Material Sources Analysis in Shiqi River Basin	LI Xiao, YU Shi, LI Liang, <i>et al.</i> (4021)
Spatial-temporal Variations and Driving of Nitrogen and Phosphorus Ratios in Lakes in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River	JI Peng-fei, XU Hai, ZHAN Xu, <i>et al.</i> (4030)
Spatiotemporal Variations in Nutrient Loads in River-lake System of Changdang Lake Catchment in 2016-2017	LI Xin-yan, LI Heng-peng, JIANG San-yuan, <i>et al.</i> (4042)
Influence of <i>Potamogeton crispus</i> on Lake Water Environment and Phytoplankton Community Structure	KANG Li-juan, XU Hai, ZOU Wei, <i>et al.</i> (4053)
Phylogenetic Processes and Key Driving Factors of Bacterial Communities in Jinze Reservoir	LIU Ming-kun, TONG Jun, ZHU Hui-feng, <i>et al.</i> (4062)
Distribution Characteristics of Per-/polyfluoralkyl Substances in River Sediments Around Typical Fluorine Industrial Parks	SUN Lin-ting, ZHAO Zhen, TANG Jian-hui (4069)
Microplastics-Induced Shifts of Diversity and Abundance of Antibiotic Resistance Genes in River Water	ZHOU Xin-yuan, WANG Yan-zi, SU Jian-qiang, <i>et al.</i> (4076)
Pollution Characteristics and Risk Assessment of Antibiotics in Lianhua Reservoir	LIAO Jie, WEI Xiao-qin, XIAO Yan-qin, <i>et al.</i> (4081)
Intraspecific Variation in Growth and Alkaline Phosphatase Activity of <i>Cylindrospermopsis raciborskii</i> Strains in Response to Different Phosphorus Concentrations and Sources	YE Jin-mei, ZHAO Li, LUO Xu, <i>et al.</i> (4088)
Simulation of Water Quality Response of Guishui River Wetland Plants and Water Diversion	LI Ya-juan, DU Yan-liang, BI Er-ping, <i>et al.</i> (4095)
Performance Assessment of Field-scale Dry Grass Swale with Shallow Substrate Layer	ZHANG Jia-wei, LI Tian, ZHANG Ting-xiu (4105)
Transition of Particulate Pollutant in the Parcel-based Catchment of Sponge City	LI Jia, XIE Wen-xia, JIANG Zhi-hui, <i>et al.</i> (4113)
Adsorption of Sb(V) in Water by Natural Pyrite: Performance and Mechanism	SHI Song, WU Qian-yuan, LI Xin-zheng, <i>et al.</i> (4124)
Treatment of Wastewater Containing Naphthalene Sulfonic Acid by Persulfate Oxidation	ZHANG Jin-men, LU Jun, LIU Xiao-chen, <i>et al.</i> (4133)
Effect of Temperature on Performance and Microbial Community Structure of Anaerobic Biofilter-Treated Domestic Wastewater	LIU Zhi-bin, LIU Xiu-hong, ZHOU Tong, <i>et al.</i> (4141)
Start-up and Optimization of Denitrifying Phosphorus Removal in ABR-MBR Coupling Process	MIAO Xin-nian, WANG Qian, GUO Kai-cheng, <i>et al.</i> (4150)
Adaptability of Completely Autotrophic Nitrogen Removal over Granular Sludge to Low-Strength at Low Temperature	LIU Yu-xin, WANG Jian-fang, QIAN Fei-yue, <i>et al.</i> (4161)
Discussion on Key Issues of Geochemical Monitoring of Soil Heavy Metal in Xiongan New District	GUO Zhi-juan, ZHOU Ya-long, YANG Zheng, <i>et al.</i> (4169)
Quantitative Assessment of Human Health Risks Based on Soil Heavy Metals and PAHs Sources: Take a Polluted Industrial Site of Beijing As an Example	WU Zhi-yuan, ZHANG Li-na, XIA Tian-xiang, <i>et al.</i> (4180)
Ecological Risk Assessment of Heavy Metals at Township Scale in the High Background of Heavy Metals, Southwestern, China	ZHANG Fu-gui, PENG Min, WANG Hui-yan, <i>et al.</i> (4197)
Potential of Accumulation and Application of Dominant Plants in Lanping Lead-zinc Mine, Yunnan Province	ZHANG Long, ZHANG Yun-xia, SONG Bo, <i>et al.</i> (4210)
Key Growth Stage of Pb Accumulation in Rice Through a Hydroponic Experiment with Pb Stress	HU Yu-dan, ZHOU Hang, GU Jiao-feng, <i>et al.</i> (4218)
Effect of Nutrient Regulation and Control on Cd Accumulation Efficiency of <i>Hylotelephium spectabile</i> Under Field Conditions	GUO Jun-mei, YANG Jun-xing, YANG Jun, <i>et al.</i> (4226)
Effects of <i>Eucalyptus</i> Branches Biochar Application on Soil Physicochemical Properties of Acidified Soil in a <i>Eucalyptus</i> plantation in Northern Guangxi	DAUN Chun-yan, SHEN Yu-yi, XU Guang-ping, <i>et al.</i> (4234)
Dynamic Effects of Direct Returning of Straw and Corresponding Biochar on Acidity, Nutrients, and Exchangeable Properties of Red Soil	YANG Cai-di, LU Sheng-gao (4246)
Different Responses of Soil Microbial Community Structure to Irrigation with Treated Wastewater from Domestic and Industrial Sources	WANG Yan, CHENG Dong-hui, TAN Wen-bing, <i>et al.</i> (4253)
Effects of Manure and Organic Fertilizer Application on Soil Microbial Community Diversity in Paddy Fields	LI Peng, WU Jian-qiang, SHA Chen-yan, <i>et al.</i> (4262)
Effects of Land Use Changes on Soil Bacterial Community Diversity in the Riparian Wetland Along the Downstream of Songhua River	ZHANG Tuo, XU Fei, HUAI Bao-dong, <i>et al.</i> (4273)
Response of Soil Bacterial Community Structure to Precipitation Change in Grassland of Loess Plateau	LI Na, WANG Bao-rong, AN Shao-shan, <i>et al.</i> (4284)
Effect of Land-use on Soil Fungal Community Structure and Associated Functional Group in Huixian Karst Wetland	CHENG Yue-yang, JIN Zhen-jiang, WANG Xiao-tong, <i>et al.</i> (4294)
Interactions of Fungi Community and Relationship with the Carbon Structure in Arable Mollisols with Gradient Organic Matter Content	SHANG Qiu-tong, HUANG Rui-lin, NI Hao-wei, <i>et al.</i> (4305)
Diversity of Soil Eukaryotic Microbes in Different Succession Stages in Maolan Karst Forest of Guizhou	WANG Xian, LONG Jian, LI Juan, <i>et al.</i> (4314)
Adsorption of Cadmium and Arsenic by Corn Stalk Biochar Solidified Microorganism	LIU Yu-ling, ZHU Hu-cheng, PENG Ou, <i>et al.</i> (4322)
Mechanism of Inorganic Nitrogen Transformation and Identification of Nitrogen Sources in Water and Soil	LIANG Xing, SUN Li-qun, ZHANG Xin, <i>et al.</i> (4333)