

# 环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第37卷 第4期

Vol.37 No.4

**2016**

中国科学院生态环境研究中心 主办  
科学出版社 出版



目次

2013年12月上海市重度污染期间细颗粒物化学特征与输送轨迹影响 ..... 周敏, 乔利平, 朱书慧, 李莉, 楼晟荣, 王红丽, 陶士康, 黄成, 陈长虹 (1179)

利用 SPAMS 研究华北乡村站点(曲周)夏季大气单颗粒物老化与混合状态 ..... 黄子龙, 曾立民, 董华斌, 李梅, 朱彤 (1188)

南京大气气溶胶混合态与云凝结核活化特征研究 ..... 朱麟, 马嫣, 郑军, 李时政, 王利朋 (1199)

北京地区不同天气条件下气溶胶数浓度粒径分布特征研究 ..... 苏捷, 赵普生, 陈一娜 (1208)

重庆市主城区 PM<sub>2.5</sub>时空分布特征 ..... 刘永林, 孙启民, 钟明洋, 钟部卿, 雒昆利 (1219)

大气细颗粒物中有机碳和元素碳监测方法对比 ..... 庞博, 吉东生, 刘子锐, 朱彬, 王跃思 (1230)

深圳市大气中全氟化合物的残留特征 ..... 何鹏飞, 张鸿, 李静, 何龙, 罗骥, 刘国卿, 沈金灿, 杨波, 崔晓宇 (1240)

北京上甸子站大气 CO<sub>2</sub> 及 δ<sup>13</sup>C(CO<sub>2</sub>) 本底变化 ..... 夏玲君, 周凌晔, 刘立新, 张根 (1248)

梅雨期大学宿舍室内生物气溶胶浓度及粒径分布 ..... 刘婷, 李露, 张家泉, 占长林, 刘红霞, 郑敬茹, 姚瑞珍, 曹军骥 (1256)

城市黑臭水体空气微生物污染及健康风险 ..... 刘建福, 陈敬雄, 辜时有 (1264)

北京市典型室内外灰尘中重金属的粒径和季节变异特征及人体暴露评估 ..... 曹治国, 余刚, 吕香英, 王梦蕾, 李琦路, 冯精兰, 闫广轩, 余浩, 孙剑辉 (1272)

西安市地表灰尘中多环芳烃分布特征与来源解析 ..... 王丽, 王利军, 史兴民, 卢新卫 (1279)

PDMS 基涂层活性炭对甲苯、苯和丙酮吸附研究 ..... 刘寒冰, 姜鑫, 王新, 杨兵, 薛南冬, 张石磊 (1287)

海南东北部滨海湿地沉积物微量元素分布特征、来源及污染评价 ..... 张卫坤, 甘华阳, 闭向阳, 王家生 (1295)

曹妃甸围填海土壤重金属积累的磁化率指示研究 ..... 薛勇, 周倩, 李远, 章海波, 胡雪峰, 骆永明 (1306)

滇南蒙自地区降水稳定同位素特征及其水汽来源 ..... 李广, 章新平, 许有鹏, 宋松, 王跃峰, 季晓敏, 项捷, 杨洁 (1313)

江苏省浅水湖泊表层沉积物重金属 GIS 空间分布及生态风险评价 ..... 李莹杰, 张列宇, 吴易雯, 李曹乐, 杨天学, 唐军 (1321)

城市景观水体甲基汞的形成机制及微宇宙模拟研究 ..... 刘小红, 司友斌, 郭子薇, 杜成竹, 朱聪聪 (1330)

我国北方温带水库——周村水库季节性热分层现象及其水质响应特性 ..... 曾明正, 黄廷林, 邱晓鹏, 王亚平, 史建超, 周石磊, 刘飞 (1337)

额尔齐斯河源区融雪期积雪与河流的水化学特征 ..... 韦虹, 吴锦奎, 沈永平, 张伟, 刘世伟, 周嘉欣 (1345)

太原汾河景区浮游植物群落结构及其与环境因子关系分析 ..... 冯佳, 郭宇宁, 王飞, 吕俊平, 刘琪, 谢树莲, 程革, 张建民 (1353)

铜陵市河流沉积物中硝化和反硝化微生物分布特征 ..... 程建华, 窦智勇, 孙庆业 (1362)

基流对亚热带农业流域氮素输出的贡献研究 ..... 马秋梅, 李玮, 王毅, 刘新亮, 李勇, 吴金水 (1371)

重庆南山表层岩溶泉与地下河三氮运移及氮通量估算 ..... 张远瞩, 贺秋芳, 蒋勇军, 李勇 (1379)

山美水库沉积物氮磷和有机质污染特征及评价 ..... 邱祖凯, 胡小贞, 姚程, 张文慧, 许秋瑾, 黄天寅 (1389)

伊乐藻-固定化脱氮微生物技术对入贡湖河道脱氮机制的影响 ..... 韩华杨, 李正魁, 王浩, 朱倩 (1397)

环太湖不同性质河流水体磷的时空分布特征 ..... 高永霞, 宋玉芝, 于江华, 朱广伟 (1404)

藻类与扰动共存下水体中不同形态磷的数量分布规律 ..... 陈俊, 李勇, 李大鹏, 黄勇, 朱培颖 (1413)

扰动对悬浮颗粒物粒径及上覆水中磷形态分布的影响 ..... 郭俊锐, 李大鹏, 刘焱见 (1422)

锆改性高岭土覆盖对底泥与上覆水之间磷迁移转化的影响 ..... 章喆, 林建伟, 詹艳慧, 王虹 (1427)

电化学还原-氧化工艺降解 4-氯酚的毒性研究 ..... 王岩, 施钦, 王辉, 卞兆勇 (1437)

水合氧化铝负载的磁性核/壳结构 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>@SiO<sub>2</sub> 纳米颗粒对水中磷的去除及再利用 ..... 赖立, 谢强, 方文侃, 邢明超, 吴德意 (1444)

多环芳烃及其衍生物在北京典型污水处理厂中的存在及去除 ..... 乔梦, 齐维晓, 赵旭, 刘会娟, 曲久辉 (1451)

污水处理厂污泥水溶性有机物的光谱特性分析 ..... 牛天浩, 周振, 胡大龙, 魏海娟, 李晶, 窦微笑, 葛红花 (1460)

高含氟的光伏废水反硝化可行性及经济性分析 ..... 李祥, 朱亮, 黄勇, 杨朋兵, 崔剑虹, 马航 (1467)

连续流反应器短程硝化的快速启动与维持机制 ..... 吴鹏, 张诗颖, 宋吟吟, 徐乐中, 沈耀良 (1472)

反硝化颗粒污泥在纳米零价铁胁迫下的性能恢复 ..... 王翻翻, 钱飞跃, 沈耀良, 王建芳, 张月茹, 刘郭洵 (1478)

低浓度环丙沙星对曝气生物滤池生物膜硝化过程及硝化微生物的作用影响 ..... 何势, 顾超超, 魏欣, 黄圣琳, 刘振鸿, 薛罡, 高品 (1485)

低碳源条件下改良双污泥系统脱氮除磷优化研究 ..... 杨伟强, 王冬波, 李小明, 杨麒, 徐秋翔, 张志贝, 李志军, 向海弘, 王亚利, 孙剑 (1492)

短期保护性耕作措施对大豆-冬小麦轮作系统温室气体排放的影响 ..... 谢燕, 陈曦, 胡正华, 陈书涛, 张寒, 凌慧, 申双和 (1499)

不同封育年限荒漠草原土壤呼吸日、季动态变化及其影响因子 ..... 崔海, 张亚红 (1507)

塔里木盆地南缘典型绿洲土壤有机碳、无机碳与环境因子的相关性 ..... 贡璐, 朱美玲, 刘曾媛, 张雪妮, 解丽娜 (1516)

小分子有机酸对紫色土及其溶液中 Pb 的赋存影响 ..... 刘江, 江韬, 黄容, 张进忠, 陈宏 (1523)

鸢尾对石油烃污染土壤的修复以及根系代谢分析 ..... 王亚男, 程立娟, 周启星 (1531)

水锰矿氧化水溶性硫化物过程及其影响因素 ..... 罗瑶, 李珊, 谭文峰, 刘凡, 蔡崇法, 邱国红 (1539)

高温纤维素降解菌群筛选及产酶特性 ..... 冯红梅, 秦永胜, 李筱帆, 周金星, 彭霞薇 (1546)

基于固相萃取及高效液相色谱-荧光检测分析的污泥中氟喹诺酮类抗生素研究方法的开发 ..... 戴晓虎, 薛勇刚, 刘华杰, 戴翎翎, 严寒, 李宁 (1553)

养殖场周边土壤-蔬菜系统磺胺类药物残留及风险评价 ..... 金彩霞, 司晓薇, 王子英, 张琴文 (1562)

4 种典型 PPCPs 对蚕豆和大蒜根尖细胞微核率的影响 ..... 王兰君, 王金凤, 朱鲁生, 王军, 赵祥 (1568)

新型污染物卤代吡啉的环境行为及生态毒理效应 ..... 林坤德, 陈艳秋, 袁东星 (1576)

水源地土壤环境保护优先区划分方法与实例研究 ..... 李蕾, 王铁宇, 王晓军, 肖荣波, 李奇锋, 彭驰, 韩存亮 (1584)

《环境科学》征订启事(1218) 《环境科学》征稿简则(1370) 信息(1352, 1412, 1498)

# 曹妃甸围填海土壤重金属积累的磁化率指示研究

薛勇<sup>1,2</sup>, 周倩<sup>1</sup>, 李远<sup>1</sup>, 章海波<sup>1\*</sup>, 胡雪峰<sup>2</sup>, 骆永明<sup>1</sup>

(1. 中国科学院烟台海岸带研究所海岸带环境过程与生态修复重点实验室, 烟台 264003; 2. 上海大学环境与化学工程学院, 上海 200444)

**摘要:** 环境磁学方法在土壤重金属污染识别中被广泛运用, 其具有简单、快速、无破坏性和灵敏度高的特点. 本研究以北方典型的围填海区——曹妃甸工业区土壤为例, 开展土壤磁化率对重金属积累的指示研究. 根据研究区的土地功能规划特征, 将研究区土壤分为工业区土壤、生活区土壤以及自然滩涂和湿地土壤共 3 类. 共采集 35 个表土(0~10 cm)样品和 3 个土壤剖面柱状样, 分析土壤中的磁化率( $\chi_{lf}$ )、铁( $Fe_2O_3$ )含量及重金属(Cr、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Mn、V)元素含量. 结果表明: 工业区表土磁化率和重金属含量空间分异性较高, 受工业生产的影响明显; 工业区和生活区剖面中 0~20cm 的表层土壤中, 各重金属均出现不同程度的富集现象, 而远离工业区的潮滩剖面中重金属含量变化不明显. 研究区表土磁化率与重金属含量总体上有相关性; 其中工业区表土磁化率与  $Fe_2O_3$ 、Ni、Cu、As 和 V 呈现极显著( $P < 0.01$ )正相关, 可以作为指示土壤重金属积累的指标. 但在生活区和自然潮滩湿地土壤中, 土壤磁化率的高低不能很好地指示重金属的积累情况, 推测可能与土壤中磁性物质来源以及潮滩湿地的环境条件有关.

**关键词:** 吹填物质; 土壤; 磁学特征; 污染指示; 海岸带

中图分类号: X131.3; X53 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2016)04-1306-07 DOI: 10.13227/j.hjks.2016.04.015

## Heavy Metals Accumulation in the Caofeidian Reclamation Soils: Indicated by Soil Magnetic Susceptibility

XUE Yong<sup>1,2</sup>, ZHOU Qian<sup>1</sup>, LI Yuan<sup>1</sup>, ZHANG Hai-bo<sup>1\*</sup>, HU Xue-feng<sup>2</sup>, LUO Yong-ming<sup>1</sup>

(1. Key Laboratory of Coastal Environmental Processes and Ecological Remediation, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences, Yantai 264003, China; 2. School of Environmental and Chemical Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

**Abstract:** The environmental magnetism method has been widely applied to identify soil heavy metal pollution, which is characterized by simplicity, efficiency, non-destructivity and sensitivity. The present study used magnetic susceptibility to assess the accumulation of heavy metals in soils of the Caofeidian industrial zone which is a typical reclamation area in northern China. The study area was divided into three sub-zones based on the function, including industrial zone, living zone, natural tidal flat and wetland. A total of 35 topsoil samples (0-10 cm) and 3 soil profiles were collected from the three sub-zones. Magnetic susceptibility ( $\chi_{lf}$ ), iron oxide ( $Fe_2O_3$ ) contents and heavy metals contents (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Mn and V) of the samples were analyzed. The results showed that  $\chi_{lf}$  values and heavy metals contents exhibited higher spatial variability in the top soil of the industrial zone, indicating the severe impacts of industrial activities. In the soil profiles of the industrial and living zones, all heavy metals were enriched to different degrees in the upper layer (0-20 cm). However, there was no significant change of heavy metal contents in the soil profiles of tidal flat which was far from the industrial area. The  $\chi_{lf}$  value was significantly ( $P < 0.01$ ) positively correlated with the contents of  $Fe_2O_3$ , Ni, Cu, As and V in the industrial top soil. This indicated that  $\chi_{lf}$  could be used as an indicator for heavy metal accumulation in the industrial zone. However, the  $\chi_{lf}$  value was not suitable to be an indicator to show the heavy metal accumulation in the soils of living zone and natural tidal flat. This might be associated with the different sources of magnetic materials among the different sub-zones and the special characteristics of the soils in the tidal flat and wetland.

**Key words:** reclaimed sediment; soil; magnetic characteristic; pollution indicators; coastal zone

环境磁学通过研究环境物质的磁性特征, 探索磁性矿物在不同环境系统中的迁移、转化和组合规律, 利用物质在磁性特征上的联系, 研究不同时空尺度的环境问题、环境过程和作用机制<sup>[1]</sup>. 由于大多数重金属污染物中都含有磁性矿物, 所以讨论土壤磁性与重金属元素含量之间的关系对识别土壤重金属污染并追溯污染来源等都具有重要意义. 环境磁学方法具有简单、快速、无破坏性和灵敏度高的特

点, 正得到越来越多的应用<sup>[2,3]</sup>. 研究表明, 靠近城市和工业中心区域的土壤磁化率普遍高于其他区域<sup>[4]</sup>, 且表土磁化率最高<sup>[5]</sup>. 近年来, 国内外利用土

收稿日期: 2015-09-18; 修订日期: 2015-11-30

基金项目: 中国科学院重点部署项目(KZZD-EW-14); 国家自然科学基金重点项目(41230858)

作者简介: 薛勇(1989~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为土壤磁学, E-mail: xy198908@163.com

\* 通讯联系人, E-mail: hbzhang@yic.ac.cn

壤磁化率来识别不同用地功能下土壤的重金属污染研究也日趋增加。Dankoub 等<sup>[6]</sup>研究指出城市表土中,磁化率与 Fe、Pb、Zn、Cu、Mn 等金属元素含量存在线性关系。Bityukova 等<sup>[7]</sup>指出,在钢铁工业区的土壤中,磁化率与重金属 Cr、Pb、Zn、Cu、Ni 存在极显著相关性。李晓庆等<sup>[8]</sup>的研究表明,重污染工业区表层土壤磁化率与 Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Mn、Fe 存在极显著的正相关,而在农业区两者无相关性。俞立中等<sup>[9]</sup>对长江潮滩现代沉积物的研究表明,沉积物的磁性特征与现代污染存在着明显的相关,排污口附近沉积物的磁性增强最为明显。总之,工业生产、燃料燃烧以及交通运输都会向环境排放磁性颗粒物,从而导致土壤磁化率增高<sup>[6,8,10]</sup>。

尽管很多研究都表明,城市表土和工业区土壤磁化率与其重金属含量有很好的相关性。但影响土壤磁化率的因素还包括成土母质<sup>[11]</sup>、成土过程以及土壤性质<sup>[12]</sup>。曹妃甸地区的土质主要为全新世以来海相、陆相及海陆交互层,多为粉砂、细砂及极少的黏性土层;围填海地区则主要为近海沉积物经吹填后堆积形成,最长吹填时间已有 10 年以上,土壤弱发育,多为新成土<sup>[13]</sup>。本研究根据曹妃甸工业区空间分布情况,分别针对钢铁厂和电厂为主的工业区、附近生活区以及自然的滩涂和湿地,探讨不同情况下土壤磁化率的分布规律及其对主要重金属积累指示的可行性,以期围填海区土壤污染的快速识别提供方法学基础。

## 1 材料与方法

### 1.1 研究区域概况

曹妃甸位于河北省唐山市南部沿海、渤海湾中心地带,是由古滦河废弃三角洲长期演变而成。“面向大海有深槽,背靠陆地有滩涂”是该地区最明显的特征和优势<sup>[14]</sup>。自 2002 年全面开发建设曹妃甸工业区以来,这里形成了以大港口、大钢铁、大化工和大电能为重的重工业基地。有著名的首钢集团、华润电厂,还有运输码头、石油化工企业等大型工业园区。

### 1.2 样品的采集与制备

根据空间分布的均匀性,结合土地的利用方式,在研究区域共布置 35 个表土(0~10 cm)采样点和 3 个剖面采样点(图 1)。为确保表土样品的代表性,采用多点混合采样法:在同一采样点的区域内采取 5~6 个土样混合为一个样品。

将样品带回实验室后,在室温下自然风干,剔除




图 1 曹妃甸围填海区采样点分布示意

Fig. 1 Map showing the spatial distribution of soil sampling sites in the Caofeidian reclamation area

树叶、树根、杂草、石块、贝壳等杂质。研磨过 2 mm 尼龙筛后储存备用;然后用四分法在过 2 mm 的样品中取出一部分进一步研磨,直至完全通过 100 目尼龙筛,储存供重金属全量分析使用。

### 1.3 样品分析

土壤基本理化性质测定<sup>[15]</sup>:土壤 pH 采用电极法(pH 计,瑞士梅特勒 FE20K)测定,土:水比为 1:2.5。土壤有机碳采用碳氮分析仪(TOC-VCPH 型,日本岛津)测定,先将过 10 目土样用 0.1 mol·L<sup>-1</sup>稀盐酸浸泡直至完全除去碳酸盐,离心去除上清液,冷冻干燥后上机测定。

土壤重金属全量测定:将研磨后(过 100 目筛)的土样放入烘箱除去水分(无鼓风条件下 105℃ 保持 24 h)。称取约 4 g 除水样品,压制土壤薄片,放入 X 射线荧光光谱仪(Magix Pro PW2440,荷兰 Philips)测定,其中主要重金属包括:Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Mn 和 V 等 9 种元素。测试过程中用标准土样 GSS-1 和 GSS-3 确定检测结果的准确性。检验结果表明,以上元素的相对误差均 < 10%,其中 Fe 的相对误差 < 5%。

土壤磁化率测定:称取 6 g(精确到 0.001 g)通过 10 目尼龙筛的风干土样,用保鲜膜包好后放入圆柱形聚乙烯样品盒中,采用双频磁化率仪(英国 Bartington MS-2 型)测定低频(0.47 kHz)和高频(4.7 kHz)磁化率。每个样品分别测试 3 次低频和高频磁化率,以确保数据有良好的重现性。另外,每测 5 个样品进行一次仪器校准,确保仪器稳定性。频率磁化率的计算方法为:

$$\chi_{fd}(\%) = (\chi_{lf} - \chi_{hf}) \times 100 / \chi_{lf}$$

式中, $\chi_{lf}$ 是低频磁化率, $\chi_{hf}$ 是高频磁化率,测量的相

对误差 < 0.3%。

## 2 结果与分析

### 2.1 表土中主要金属含量的空间分布特征

研究区土壤物质的来源主要为从渤海湾吹填的沉积物质, pH 较高, 为 8.1 ~ 9.2 之间, 基本保持了近海沉积物的碱性特征。根据研究区的不同规划功能区可以分为: 钢铁厂和电厂为主的重工业区、工业区附近的生活区、以及远离工业区的自然滩涂和湿地。这 3 个功能区表层土壤中有机碳含量区域分布特征明显。生活区表土有机碳含量最高, 约为 2.09 ~ 14.1 g·kg<sup>-1</sup>, 平均为 6.22 g·kg<sup>-1</sup> (见表 1)。表土中 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量和主要重金属元素 (Cr、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Mn 和 V) 含量结果如表 1 和表 2 所示。其中, 工业区附近的生活区表土中除 Pb 以外, 其余各元素的平均含量均为最大, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Cr、Ni、Cu、Zn 的平均含量均高出其余两类表土中相应平均含量的 10% 以上。这主要是由于工业生产过程中, 特别是钢铁、电厂等燃煤类重工业生产时会向附近环境中排放大量 Fe、Cr、Cu 和 Zn 等重金属颗粒物<sup>[16~18]</sup>。当这些重金属颗粒物进入大气后, 较重的颗粒物会因自身重力发生干沉降作用降落在附近地表, 而较轻的颗粒物则会发生迁移直至通过降水等湿沉降进入地表。

表 1 曹妃甸不同功能区表土基本性质

Table 1 Basic soil characteristics of the different functional subzones in Caofeidian area

样品	项目	pH	有机碳 /g·kg <sup>-1</sup>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /g·kg <sup>-1</sup>
工业区表土 (n=17)	最大值	8.9	5.1	96.8
	最小值	8.3	0.6	15.2
	平均值	8.6	2.2	34.7
	标准差 SD	0.21	1.4	18.4
	变异系数 CV/%	2.4	64.2	53.1
生活区表土 (n=6)	最大值	8.6	14.1	55.3
	最小值	8.1	2.1	25.8
	平均值	8.4	6.2	38.3
	标准差 SD	0.23	4.6	10.5
	变异系数 CV/%	2.7	74.3	27.5
滩涂和湿地表土 (n=12)	最大值	9.2	7.7	48.4
	最小值	8.3	0.13	19.3
	平均值	8.6	2.7	30.7
	标准差 SD	0.26	2.4	9.6
	变异系数 CV/%	3.0	88.6	31.4

1) n 代表样品数, 下同

虽然工业区附近生活区表土中金属元素平均含量高于工业区表土, 但是 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Cr、Zn、As 和 Pb

的最大值均出现在工业区表土中, 尤其是 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在工业区表土中的最高含量达到 96.8 g·kg<sup>-1</sup>, 而生活区表土以及滩涂和湿地表土中的最高含量只有 55.3 g·kg<sup>-1</sup> 和 48.4 g·kg<sup>-1</sup>。另一方面, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Cr、Zn、Pb 和 V 等 5 种元素含量的变异系数也高于生活区表土、滩涂和湿地表土。这与姜琪等<sup>[19]</sup>的研究结果相似, 即工业区表土中重金属含量空间分异较大。工业活动 (如铁矿石运输、金属冶炼、燃煤发电等) 通常会排放 Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Mn 和 V 等污染物<sup>[6,20]</sup>; 而曹妃甸地区滩涂土壤中本身这些元素的本底值较低, 所以研究区域内表土重金属含量很大程度上受到工业活动的影响。

### 2.2 表土磁化率的空间分布特征

磁化率 ( $\chi_{ir}$ ), 测定结果 (表 3) 显示, 工业区表土磁化率普遍高于生活区表土、滩涂和湿地表土的磁化率。工业区表土、生活区表土以及滩涂和湿地表土的平均磁化率分别为  $104.4 \times 10^{-8}$ 、 $40.7 \times 10^{-8}$ 、 $51.2 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ , 变异系数分别为 168.9%、34.6%、32.2%。可见工业区表土磁化率普遍较高, 并且空间分异程度大。其中, 工业区表土磁化率的最大值出现在钢铁厂内铁矿石堆场附近表土, 其磁化率高达  $780.6 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ , 是生活区表土磁化率最大值的 14 倍多, 也是滩涂和湿地表土最大值的 8 倍多 (表 3)。该点磁性的异常增强现象很大程度上与铁矿石堆场有关, 铁矿石搬运的过程中, 强磁性粉尘进入附近表土, 极大地增强了土壤磁性。在滩涂和湿地表土中, 最大磁化率为  $97.3 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ , 该点为曹妃甸车辆收费站附近的一滩涂表土。该表土磁性增强应该归因于交通运输, 因为该处过往车辆明显较多, 而交通工具产生的大量尾气也可以导致土壤磁化率的异常增高<sup>[21]</sup>。

频率磁化率 ( $\chi_{fd}$ ) 是当外加磁场频率增大时磁化率增减的百分率, 可指示磁性矿物的粒径大小, 区分土壤中的超细顺磁性颗粒 (SP,  $d < 0.03 \mu\text{m}$ ) 和单畴颗粒 (SD,  $0.03 \mu\text{m} < d < 0.10 \mu\text{m}$ ), 能够很好地鉴别土壤中磁性颗粒的来源<sup>[19]</sup>。卢升高等<sup>[22]</sup>的研究认为,  $\chi_{fd} = 5\%$  可以作为土壤中是否含有 SP 的临界点。显然本研究的 35 个表土样品的频率磁化率无一超过 5% (表 3), 表明这些土样中不含由成土作用而成的超细顺磁颗粒。又有研究表明<sup>[23]</sup>: 工业活动排放的磁性颗粒主要为单畴颗粒 (SD,  $0.03 \mu\text{m} < d < 0.10 \mu\text{m}$ ) 和多畴颗粒 (MD,  $d > 1 \sim 2 \mu\text{m}$ ), 并且 SD 和 MD 的频率磁化率均小于 2%。在本研究中, 工业区表土、滩涂和湿地表土

以及大部分生活区表土的  $\chi_{rd}$  小于 2%, 说明这些表土中的磁性颗粒多为 MD. 此外, 工业区表土的  $\chi_{rd}$  平均值为 0.53, 生活区、滩涂和湿地的  $\chi_{rd}$  平均

值分别为 0.72 和 0.73. 虽然仅仅稍微高于工业区表土, 但是这可以表明, 后者表土中的磁性颗粒较前者偏细.

表 2 曹妃甸表土重金属含量

Table 2 Contents of heavy metals in the topsoil of Caofeidian area

样品	项目	Cr	Ni	Cu	Zn	As	Pb	Mn	V
		/mg·kg <sup>-1</sup>							
工业区表土 (n=17)	最大值	79.0	32.5	27.8	100.7	12.2	34.9	717.5	67.7
	最小值	28.3	7.9	5.6	21.5	4.2	15.3	298.4	10.6
	平均值	52.4	16.4	13.4	48.3	6.3	19.9	468.1	12.9
	标准差 SD	14.0	6.4	5.7	19.3	2.0	4.7	110.4	24.3
	变异系数 CV/%	26.8	38.8	42.9	40.0	32.0	23.6	23.6	53.1
生活区表土 (n=6)	最大值	78.4	37.0	33.5	90.6	12.0	21.9	701.7	74.2
	最小值	49.7	13.1	9.9	35.1	4.7	15.5	389.0	52.3
	平均值	61.8	24.1	21.4	55.9	7.7	18.6	517.8	62.3
	标准差 SD	10.9	8.7	9.2	19.9	2.4	2.6	118.1	8.2
	变异系数 CV/%	17.6	35.9	43.1	35.6	31.0	13.8	22.8	13.2
滩涂和湿地表土 (n=12)	最大值	70.9	32.7	28.7	77.8	10.7	20.7	786.3	72.4
	最小值	35.1	7.6	5.8	24.0	3.4	14.0	315.0	32.9
	平均值	52.5	17.4	13.3	44.1	6.4	17.6	510.6	53.6
	标准差 SD	10.6	8.1	7.3	17.5	2.4	2.2	142.6	13.2
	变异系数 CV/%	20.3	46.3	55.2	39.7	37.4	12.5	27.9	24.6

表 3 曹妃甸表土磁性特征比较

Table 3 Comparison of magnetic characteristics in the topsoil of Caofeidian area

样品	$\chi_{lf} \times 10^{-8} / m^3 \cdot kg^{-1}$					$\chi_{rd} / \%$				
	最小值	最大值	平均值	标准差 SD	变异系数 CV/%	最小值	最大值	平均值	标准差 SD	变异系数 CV
工业区表土 (n=17)	32.0	780.6	104.4	176.2	168.9	0	1.9	0.5	0.6	107.6
生活区表土 (n=6)	14.1	53.0	40.7	14.1	34.6	0	3.0	0.7	1.1	158.3
滩涂和湿地表土 (n=12)	27.9	97.3	51.2	16.5	32.2	0	1.9	0.7	0.6	79.2

### 2.3 剖面土壤磁化率与重金属的分布特征

有研究表明<sup>[5, 24, 25]</sup>: 工业区土壤剖面中会出现不同程度的重金属富集现象, 并且土壤磁化率与重金属含量呈现较好的相关性. 曹妃甸工业区土层主要由粉、细砂及黏性土组成, 上层砂类土为松散状态, 其下为稍密实的粉细砂、粉土、粉质黏土层及密实的粉细砂层, 并且呈现垂直分布比较稳定, 层次明显, 结构简单的特点<sup>[13]</sup>. 由于受不同的颗粒大小的影响, 重金属在土壤剖面中的分布可能出现差异, 磁化率也会表现出不同的特征. 本研究通过在电厂附近的荒地、生活区和滩涂采集的 P1、P2、P3 这 3 个典型剖面, 分析土壤磁化率和重金属含量的剖面分布规律.

由图 2 和表 4 知, 3 个剖面的土壤磁化率总体上呈现随深度增大的趋势, 但变化量很小. 各金属元素含量的变化趋势则相对复杂. 剖面 P1 中, 磁化

率在 20 ~ 30 cm 处最大, 但是该处的各重金属含量均不是最大; 相反, 该剖面在 20 ~ 40 cm 土层中各重金属含量最小. 剖面 P2 和 P3 中重金属含量的变化相似, 都是表土 (0 ~ 20 cm) 中含量最高, 随深度的增加, 总体上呈下降趋势; 不同的是, 剖面 P2 中 20 cm 以下, 除 Pb 元素以外均明显下降, 而剖面 P3 中的元素含量均未出现明显下降. 总体而言, 重金属在 P1、P2 剖面 20 cm 以上的土壤中明显富集, 而远离工业区的滩涂土壤剖面中, 各重金属的含量变化较小. 这可能有两方面原因: 一是工业生产过程中释放的重金属颗粒物 (如 Cr、Cu、Pb、Zn 等) 在通过干湿沉降进入土壤的过程中, 大部分会沉降在工业区及其附近的土壤中<sup>[5]</sup>, 只有少量轻颗粒物会随风迁移到远处; 另一方面, 研究区域的工业发展不足十年, 短时间内不会出现明显的重金属污染富集现象.

表 4 土壤剖面不同层次主要金属的平均含量

Table 4 Average contents of the major metals at different horizons of soil profiles

剖面代号	深度 /cm	Fe /g·kg <sup>-1</sup>	Cr /mg·kg <sup>-1</sup>	Ni /mg·kg <sup>-1</sup>	Cu /mg·kg <sup>-1</sup>	Zn /mg·kg <sup>-1</sup>	As /mg·kg <sup>-1</sup>	Pb /mg·kg <sup>-1</sup>	Mn /mg·kg <sup>-1</sup>	V /mg·kg <sup>-1</sup>
P1(电厂附近土壤)	0~10	21.5	51.7	18.9	15.7	44.8	6.6	18.4	431.8	53.3
	10~20	23.0	60.0	19.8	14.3	46.7	7.5	17.3	486.7	59.7
	20~30	13.9	36.1	10.3	8.1	25.2	4.8	17.3	419.2	39.7
	30~40	13.2	33.9	7.6	4.8	22.5	5.2	15.6	396.2	34.3
	40~60	18.2	60.0	16.3	12.1	36.2	8.0	17.2	449.7	49.2
	60~80	16.3	52.9	14.3	9.3	31.0	5.4	17.3	391.1	44.1
	80~100	21.5	54.5	20.2	13.6	44.8	7.4	14.0	421.2	55.5
P2(生活区土壤)	0~10	38.6	78.4	37.0	33.5	90.6	12.0	19.9	701.7	74.2
	10~20	33.5	69.5	32.8	25.6	74.4	10.7	16.4	611.1	72.2
	20~40	19.6	59.9	15.9	10.8	39.2	5.8	16.4	415.2	52.6
	40~60	16.6	59.5	10.4	6.7	26.5	4.8	16.0	415.9	54.4
	60~80	15.9	58.3	11.9	6.0	27.4	4.5	14.4	409.5	49.0
P3(滩涂土壤)	0~10	23.4	55.2	20.8	17.1	53.1	6.8	18.3	506.8	55.1
	10~20	25.4	59.0	24.1	17.8	56.7	7.2	17.6	547.8	62.2
	20~30	23.7	49.7	20.4	16.8	51.1	7.2	14.2	504.0	57.2
	30~40	20.5	51.0	16.0	12.5	42.9	6.0	15.7	447.6	52.1
	40~60	22.3	48.8	17.6	16.0	47.0	6.1	15.1	488.8	54.3
	60~80	20.5	50.7	17.6	12.6	44.6	5.7	14.9	459.3	53.9




图 2 典型剖面土壤磁化率随深度的变化

Fig. 2 Depth distribution of soil magnetic susceptibility in three typical soil profiles

### 3 讨论

#### 3.1 土壤磁化率与重金属含量的相关性分析

国内外关于表土磁化率与重金属含量相关性的报道已有很多. 卢瑛等<sup>[26]</sup>指出,南京城市表土磁化率与重金属 Cu、Zn、Pb、Cr 存在极显著正相关. 陈秀端等<sup>[27]</sup>的研究表明,西安市的表土磁化率与其 Co、Cr、Cu、Pb、Sn、Sr、Ba 含量呈显著正相关.

Bityukova 等<sup>[7]</sup>在研究工业区表土时发现其磁化率与重金属 Cu、Zn、Pb、Cr、Ni 存在极显著相关性. Hu 等<sup>[16]</sup>的研究也表明,上海市宝山区表土磁化率与各种重金属元素含量呈显著正相关性. 此外,由于含 Pb 汽油的使用和汽车轮胎的磨损,公路附近的表土磁化率往往比较高,且与土壤重金属呈现显著相关,尤其是与 Pb 呈现极显著正相关<sup>[21]</sup>.

本研究中土壤剖面磁化率与重金属变化趋势不

同,无明显相关性。但是,研究区不同功能区表土磁化率与重金属呈现了一定的相关性。如表 5 所示,工业区表土磁化率与重金属 Ni、Cu、As、V 及  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的含量呈极显著正相关( $P < 0.01$ ),与 Cr、Zn 和 Mn 呈显著正相关( $P < 0.05$ );生活区表土磁化率与重金属 Cu、As 及  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的含量呈极显著正相关( $P < 0.01$ ),与 Zn、Mn 和 V 呈显著正相关( $P < 0.05$ );而滩涂和湿地表土磁化率仅与  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的含量呈极显著正相关( $P < 0.01$ ),与 Cr、As 和 Pb 呈显著正相关( $P < 0.05$ )。由此可见,本研究中表土磁化率与其重金属的相关性分析结果与前人基本一致,尤其是工业区的相关性分析结果表明:该区表土磁化率异常增高的现象与工业生产排放的重金属有必然的关系。

从表 2 中可以看出,分析的 8 种重金属中除 Pb

表 5 曹妃甸表土磁化率( $\chi_{\text{fr}}$ )与主要重金属含量相关性分析<sup>1)</sup>

Table 5 Correlation between magnetic susceptibility and the contents of major heavy metals in the topsoil of Caofeidian area

项目	Fe	Cr	Ni	Cu	Zn	As	Pb	Mn	V
工业区表土	0.894 **	0.513 *	0.633 **	0.647 **	0.468 *	0.768 **	0.391	0.605 *	0.649 **
生活区表土	0.819 **	0.390	0.365	0.334 **	0.367 *	0.545 **	0.393	0.474 *	0.464 *
滩涂和湿地表土	0.761 **	0.367 *	0.290	0.279	0.318	0.423 *	0.383 *	0.328	0.381

1) \*\* 表示极显著水平  $P < 0.01$ ; \* 表示显著水平  $P < 0.05$

### 3.2 潮滩土壤磁化率的特性分析

本研究区中,自然滩涂和湿地表土磁化率的平均值为  $51.2 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ ,高于生活区表土的  $40.7 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ ,但前者的重金属含量都不同程度地低于后者。这表明,该地区滩涂和湿地表土中磁性物质的来源可能不是来源于工业活动的输入。过去研究表明,远离工业排放源并且几乎不受人类活动影响的表土磁化率主要受到母质的影响。母质不同,发育的土壤的磁化率一般不同,如兰州市土壤磁化率背景值<sup>[28]</sup>约为  $35.0 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ ,而上海土壤磁化率背景值<sup>[16]</sup>约为  $29.1 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ 。曹妃甸围填海区大部分土壤是由海相沉积物吹填和陆相滩涂淤积而成。因此,这里的成土母质既受到河流长距离搬运的影响,同时也受到海水长时间浸渍的作用。在这些过程中,原有的铁磁性矿物可能受到水化、溶解以及还原等作用,磁性变弱。但是,在围填后,氧化还原交替作用,并经历草甸化或沼泽化的过程,在腐殖质积累等作用下,产生一些次生铁磁性矿物,可能使土壤磁化率升高<sup>[29]</sup>,具体原因还需要开展进一步研究证实。

## 4 结论

围填海土壤是一类非常特殊的新成土壤,发育

之外平均含量在生活区表土中都高于工业区附近表土,尤其是 Cr、Ni、Cu 和 Zn 的平均含量在生活区表土中比工业区表土中高出 10% 以上。但是生活区表土的平均磁化率明显低于工业区表土(表 3)。同时,在工业区表土中,磁化率高的土样,其各重金属含量也明显增高。相关性分析(表 5)也显示,在分析的 9 种重金属中,工业区表土磁化率与 5 种重金属的元素含量呈现极显著相关,与 3 种重金属含量呈显著相关。所以说,工业区表土磁化率与主要重金属元素含量确实存在密切的关系。这可能是由于重金属的来源不同引起的。工业区表土的重金属主要来自铁矿石粉尘、燃煤粉尘等强磁性物质的伴随输入,所以,同时表现出高磁性与高重金属含量;但生活区的表土的重金属来源可能主要为非磁性物质中的重金属物质输入带来。

程度弱,多数还保留着近海沉积物的性质。当前,在沿海地区发展大型工业园区是我国大部分填海造地的目的,以解决沿海地区工业发展的土地矛盾。因此,未来围填海地区的污染及其生态环境问题必须要引起高度重视。同时,部分围填海土壤也在自然植被的恢复和演替过程中经过沼泽化、草甸化等过程逐渐发育。所以这类地区的土壤重金属积累与土壤磁性特征的关系并非如一般城市或工业区土壤那样具有直接的相关性。本研究结果也显示,在重工业区,这种相关性依然存在,磁化率能够很好地指示土壤重金属积累情况;但在一般的非污染或自然潮滩区,土壤磁性特征可能主要受到沼泽化等因素影响,而与重金属含量的相关性较差。因此,未来还需要进一步深入探究该区域土壤磁化率等参数的基线特征及其磁性物质的来源和影响因素等,揭示围填海土壤的磁性变化规律及其对土壤污染的指示作用。

### 参考文献:

- [1] 张卫国,俞立中,许羽. 环境磁学研究的简介[J]. 地球物理学进展, 1995, 10(3): 95-105.
- [2] Kim W, Doh S J, Yu Y. Anthropogenic contribution of magnetic particulates in urban roadside dust [J]. Atmospheric Environment, 2009, 43(19): 3137-3144.

- [ 3 ] Kim W, Doh S J, Park Y H, *et al.* Two-year magnetic monitoring in conjunction with geochemical and electron microscopic data of roadside dust in Seoul, Korea [ J ]. *Atmospheric Environment*, 2007, **41**(35): 7627-7641.
- [ 4 ] Thompson R, Olafeld F. *Environmental magnetism* [ M ]. London Boston: Allen & Unwin, 1986. 227.
- [ 5 ] 张果, 胡雪峰, 吴小红, 等. 上海城市土壤磁化率的垂向分布特征及环境指示意义[ J ]. *土壤学报*, 2011, **48**(2): 429-434.
- [ 6 ] Dankoub Z, Ayoubi S, Khademi H, *et al.* Spatial distribution of magnetic properties and selected heavy metals in calcareous soils as affected by land use in the Isfahan Region, Central Iran [ J ]. *Pedosphere*, 2012, **22**(1): 33-47.
- [ 7 ] Bityukova L, Scholger R, Birke M. Magnetic susceptibility as indicator of environmental pollution of soils in Tallinn [ J ]. *Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy*, 1999, **24**(9): 829-835.
- [ 8 ] 李晓庆, 胡雪峰, 孙为民, 等. 城市土壤污染的磁学监测研究[ J ]. *土壤*, 2006, **38**(1): 66-74.
- [ 9 ] 俞立中, 张卫国. 利用磁信息研究潮滩重金属污染的探讨[ J ]. *环境科学进展*, 1993, **1**(5): 37-44.
- [ 10 ] Qian P, Zheng X M, Zhou L M, *et al.* Magnetic properties as indicator of heavy metal contaminations in roadside soil and dust along G312 highways [ J ]. *Procedia Environmental Sciences*, 2011, **10**: 1370-1375.
- [ 11 ] Shi R P, Cioppa M T. Magnetic survey of topsoils in Windsor-Essex County, Canada [ J ]. *Journal of Applied Geophysics*, 2006, **60**(3-4): 201-212.
- [ 12 ] Mullins C E. Magnetic susceptibility of the soil and its significance in soil science-a review [ J ]. *Journal of Soil Science*, 1977, **28**(2): 223-246.
- [ 13 ] 河北省海洋局. 曹妃甸周边重点海域调查研究报告 [ M ]. 北京: 海洋出版社, 2012. 26.
- [ 14 ] 鲁如坤. *土壤农业化学分析方法* [ M ]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000. 474-489.
- [ 15 ] 夏家淇. *土壤环境质量标准详解* [ M ]. 北京: 中国环境科学出版社, 1996. 84-86.
- [ 16 ] Hu X F, Su Y, Ye R, *et al.* Magnetic properties of the urban soils in Shanghai and their environmental implications [ J ]. *Catena*, 2007, **70**(3): 428-436.
- [ 17 ] 李珊, 胡雪峰, 杜艳, 等. 上海嘉定区表土磁性强度的空间分异及环境指示意义 [ J ]. *土壤学报*, 2012, **49**(1): 9-17.
- [ 18 ] Wang B, Xia D S, Yu Y, *et al.* Detection and differentiation of pollution in urban surface soils using magnetic properties in arid and semi-arid regions of northwestern China [ J ]. *Environmental Pollution*, 2014, **184**: 335-346.
- [ 19 ] 姜琪, 胡雪峰, 李珊, 等. 上海宝山和青浦区表土磁性特征的差异及环境指示意义 [ J ]. *土壤通报*, 2012, **43**(4): 774-780.
- [ 20 ] Zhang M K, Wang M Q, Liu X M, *et al.* Characterization of soil quality under vegetable production along an urban-rural gradient [ J ]. *Pedosphere*, 2003, **13**(2): 173-180.
- [ 21 ] Muxworthy A R, Schmidbauer E, Petersen N. Magnetic properties and Mössbauer spectra of urban atmospheric particulate matter: a case study from Munich, Germany [ J ]. *Geophysical Journal International*, 2002, **150**(2): 558-570.
- [ 22 ] 卢升高, 俞劲炎, 章明奎, 等. 长江中下游第四纪沉积物发育土壤磁性增强的环境磁学机制 [ J ]. *沉积学报*, 2000, **18**(3): 336-340.
- [ 23 ] Hay K L, Dearing J A, Baban S M J, *et al.* A preliminary attempt to identify atmospherically-derived pollution particles in English topsoils from magnetic susceptibility measurements [ J ]. *Physics and Chemistry of the Earth*, 1997, **22**(1-2): 207-210.
- [ 24 ] 张引娥. 重金属元素在厦门-漳州土壤剖面中的分布特征及其环境意义 [ J ]. *地球与环境*, 2013, **41**(1): 13-19.
- [ 25 ] 陈轶楠, 张永清, 张希云, 等. 晋南某钢厂周边土壤重金属与磁化率分布规律及其相关性研究 [ J ]. *干旱区资源与环境*, 2014, **28**(1): 85-91.
- [ 26 ] 卢瑛, 龚子同, 张甘霖. 城市土壤磁化率特征及其环境意义 [ J ]. *华南农业大学学报*, 2001, **22**(4): 26-28.
- [ 27 ] 陈秀端, 卢新卫, 杨光. 城市表层土壤磁化率与重金属含量分布的相关性研究 [ J ]. *环境科学*, 2013, **34**(3): 1086-1093.
- [ 28 ] 王博, 夏敦胜, 余晔, 等. 兰州城市表层土壤重金属污染的环境磁学记录 [ J ]. *科学通报*, 2012, **57**(32): 3078-3089.
- [ 29 ] 俞劲炎, 吴玉卫, 詹硕仁. 浙江省海涂盐土的磁化率及其在土壤分类上的意义 [ J ]. *浙江农业科学*, 1982, (3): 134-136, 151.

## CONTENTS

Chemical Characteristics of Particulate Matters and Trajectory Influence on Air Quality in Shanghai During the Heavy Haze Episode in December, 2013 .....	ZHOU Min, QIAO Li-ping, ZHU Shu-hui, <i>et al.</i> (1179)
Analysis of Single Particle Aging and Mixing State at an Agriculture Site (Quzhou) in the North China Plain in Summer Using a Single Particle Aerosol Mass Spectrometer .....	HUANG Zi-long, ZENG Li-min, DONG Hua-bin, <i>et al.</i> (1188)
Investigation of Aerosol Mixed State and CCN Activity in Nanjing .....	ZHU Lin, MA Yan, ZHENG Jun, <i>et al.</i> (1199)
Characteristics of Number Concentration Size Distributions of Aerosols Under Different Weather Processes in Beijing .....	SU Jie, ZHAO Pu-sheng, CHEN Yi-na (1208)
Temporal and Spatial Distribution Characteristics of PM <sub>2.5</sub> in Chongqing Urban Areas .....	LIU Yong-lin, SUN Qi-min, ZHONG Ming-yang, <i>et al.</i> (1219)
Comparison of Monitoring Methods of Organic Carbon and Element Carbon in Atmospheric Fine Particles .....	PANG Bo, JI Dong-sheng, LIU Zi-rui, <i>et al.</i> (1230)
Residue Characteristics of Perfluorinated Compounds in the Atmosphere of Shenzhen .....	HE Peng-fei, ZHANG Hong, LI Jing, <i>et al.</i> (1240)
Monitoring Atmospheric CO <sub>2</sub> and δ <sup>13</sup> C(CO <sub>2</sub> ) Background Levels at Shangdianzi Station in Beijing, China .....	XIA Ling-jun, ZHOU Ling-xi, LIU Li-xin, <i>et al.</i> (1248)
Concentration and Size Distribution of Bioaerosols in Indoor Environment of University Dormitory During the Plum Rain Period .....	LIU Ting, LI Lu, ZHANG Jia-quan, <i>et al.</i> (1256)
Air Microbial Pollution and Health Risk of Urban Black Odorous Water .....	LIU Jian-fu, CHEN Jing-xiong, GU Shi-you (1264)
Particle Size Distribution, Seasonal Variation Characteristics and Human Exposure Assessment of Heavy Metals in Typical Settled Dust from Beijing .....	CAO Zhi-guo, YU Gang, LÜ Xiang-ying, <i>et al.</i> (1272)
Distribution Characteristics and Source Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Surface Dust of Xi'an City, China .....	WANG Li, WANG Li-jun, SHI Xing-min, <i>et al.</i> (1279)
Toluene, Benzene and Acetone Adsorption by Activated Carbon Coated with PDMS .....	LIU Han-bing, JIANG Xin, WANG Xin, <i>et al.</i> (1287)
Distribution Characteristics, Sources and Pollution Assessment of Trace Elements in Surficial Sediments of the Coastal Wetlands, Northeastern Hainan Island .....	ZHANG Wei-kun, GAN Hua-yang, BI Xiang-yang, <i>et al.</i> (1295)
Heavy Metals Accumulation in the Caofeidian Reclamation Soils: Indicated by Soil Magnetic Susceptibility .....	XUE Yong, ZHOU Qian, LI Yuan, <i>et al.</i> (1306)
Characteristics of Stable Isotopes in Precipitation and Their Moisture Sources in Mengzi Region, Southern Yunnan .....	LI Guang, ZHANG Xin-ping, XU You-peng, <i>et al.</i> (1313)
GIS Spatial Distribution and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Sediments of Shallow Lakes in Jiangsu Province .....	LI Ying-jie, ZHANG Lie-yu, WU Yi-wen, <i>et al.</i> (1321)
Microcosm Simulation Study and Methylmercury Forming Mechanism at Landscape Water of City .....	LIU Xiao-hong, SI You-bin, GUO Zi-wei, <i>et al.</i> (1330)
Seasonal Stratification and the Response of Water Quality of a Temperate Reservoir—Zhoucun Reservoir in North of China .....	ZENG Ming-zheng, HUANG Ting-lin, QIU Xiao-peng, <i>et al.</i> (1337)
Hydrochemical Characteristics of Snow Meltwater and River Water During Snow-melting Period in the Headwaters of the Ertis River, Xinjiang .....	WEI Hong, WU Jin-kui, SHEN Yong-ping, <i>et al.</i> (1345)
Relationship Between the Phytoplankton Distribution and Environmental Factors in Fenhe Scenic Spot of Taiyuan .....	FENG Jia, GUO Yu-ning, WANG Fei, <i>et al.</i> (1353)
Distribution Characteristics of Nitrifiers and Denitrifiers in the River Sediments of Tongling City .....	CHENG Jian-hua, DOU Zhi-yong, SUN Qing-ye (1362)
Contribution of Base Flow to Total Nitrogen Loading in Subtropical Agricultural Catchments .....	MA Qiu-mei, LI Wei, WANG Yi, <i>et al.</i> (1371)
Characteristics and Transport Patterns of Ammonia, Nitrites, Nitrates and Inorganic Nitrogen Flux at Epikarst Springs and a Subterranean Stream in Nanshan, Chongqing .....	ZHANG Yuan-zhu, HE Qiu-fang, JIANG Yong-jun, <i>et al.</i> (1379)
Pollution Characteristics and Evaluation of Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter in Sediments of Shanmei Reservoir in Fujian, China .....	QIU Zu-kai, HU Xiao-zhen, YAO Cheng, <i>et al.</i> (1389)
Effect of <i>Elodea natallii</i> -immobilized Nitrogen Cycling Bacteria on Nitrogen Removal Mechanism in an Inflow River, Gonghu Bay .....	HAN Hua-yang, LI Zheng-kui, WANG Hao, <i>et al.</i> (1397)
Spatial and Temporal Distribution Characteristics of Different Forms of Phosphorus in Three Sorts of Rivers around Lake Taihu .....	GAO Yong-xia, SONG Yu-zhi, YU Jiang-hua, <i>et al.</i> (1404)
Distribution of Phosphorus Forms in the Overlying Water Under Disturbance with the Addition of Algae .....	CHEN Jun, LI Yong, LI Da-peng, <i>et al.</i> (1413)
Impacts of Sediment Disturbance on the Distribution of Suspended Particle Size and Phosphorus .....	GUO Jun-rui, LI Da-peng, LIU Yan-jian (1422)
Effect of Zirconium Modified Kaolin-Based Cap on Migration and Transformation of Phosphorus Between Sediment and Overlying Water .....	ZHANG Zhe, LIN Jian-wei, ZHAN Yan-hui, <i>et al.</i> (1427)
Toxicity of 4-Chlorophenol Solution Under Electrochemical Reduction-oxidation Process .....	WANG Yan, SHI Qin, WANG Hui, <i>et al.</i> (1437)
Removal and Recycle of Phosphor from Water Using Magnetic Core/Shell Structured Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> @SiO <sub>2</sub> Nanoparticles Functionalized with Hydrous Aluminum Oxide .....	LAI Li, XIE Qiang, FANG Wen-kan, <i>et al.</i> (1444)
Occurrence and Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Their Derivatives in Typical Wastewater Treatment Plants in Beijing .....	QIAO Meng, QI Wei-xiao, ZHAO Xu, <i>et al.</i> (1451)
Spectral Characteristics of Dissolved Organic Matters in Reject Water from Wastewater Treatment Plants .....	NIU Tian-hao, ZHOU Zhen, HU Da-long, <i>et al.</i> (1460)
Feasibility and Economic Analysis of Denitrification of Photovoltaic Wastewater Containing High Fluorine .....	LI Xiang, ZHU Liang, HUANG Yong, <i>et al.</i> (1467)
Quick Start-up and Sustaining of Shortcut Nitrification in Continuous Flow Reactor .....	WU Peng, ZHANG Shi-ying, SONG Yin-ling, <i>et al.</i> (1472)
Performance Recoverability of Denitrifying Granular Sludge Under the Stressing Effect of Nanoscale Zero-valent Iron .....	WANG Fan-fan, QIAN Fei-yue, SHEN Yao-liang, <i>et al.</i> (1478)
Effect of Low-concentration Ciprofloxacin on the Nitrification and Nitrifying Microorganisms of Biofilms in Biological Aerated Filter .....	HE Shi, GU Chao-chao, WEI Xin, <i>et al.</i> (1485)
Optimization Study on the Nitrogen and Phosphorus Removal of Modified Two-sludge System Under the Condition of Low Carbon Source .....	YANG Wei-qiang, WANG Dong-bo, LI Xiao-ming, <i>et al.</i> (1492)
Effects of Short-time Conservation Tillage Managements on Greenhouse Gases Emissions from Soybean-Winter Wheat Rotation System .....	XIE Yan, CHEN Xi, HU Zheng-hua, <i>et al.</i> (1499)
Diurnal and Seasonal Dynamic Variation of Soil Respiration and Its Influencing Factors of Different Fenced Enclosure Years in Desert Steppe .....	CUI Hai, ZHANG Ya-hong (1507)
Correlation Among Soil Organic Carbon, Soil Inorganic Carbon and the Environmental Factors in a Typical Oasis in the Southern Edge of the Tarim Basin .....	GONG Lu, ZHU Mei-ling, LIU Zeng-yuan, <i>et al.</i> (1516)
Effects of Low-Molecular-Weight Organic Acids on the Speciation of Pb in Purple Soil and Soil Solution .....	LIU Jiang, JIANG Tao, HUANG Rong, <i>et al.</i> (1523)
Phytoremediation of Petroleum Contaminated Soils with <i>Iris pseudacorus</i> L. and the Metabolic Analysis in Roots .....	WANG Ya-nan, CHENG Li-juan, ZHOU Qi-xing (1531)
Oxidation Process of Dissolvable Sulfide by Manganite and Its Influencing Factors .....	LUO Yao, LI Shan, TAN Wen-feng, <i>et al.</i> (1539)
Screening and Enzyme Production Characteristics of Thermophilic Cellulase-producing Strains .....	FENG Hong-mei, QIN Yong-sheng, LI Xiao-fan, <i>et al.</i> (1546)
Development of Determination Method of Fluoroquinolone Antibiotics in Sludge Based on Solid Phase Extraction and HPLC-Fluorescence Detection Analysis .....	DAI Xiao-hu, XUE Yong-gang, LIU Hua-jie, <i>et al.</i> (1553)
Distribution and Risk Assessment of Sulfonamides Antibiotics in Soil and Vegetables from Feedlot Livestock .....	JIN Cai-xia, SI Xiao-wei, WANG Zi-ying, <i>et al.</i> (1562)
Influence of Four Kinds of PPCPs on Micronucleus Rate of the Root-Tip Cells of <i>Vicia-faba</i> and Garlic .....	WANG Lan-jun, WANG Jin-hua, ZHU Lu-sheng, <i>et al.</i> (1568)
Environmental Behaviors and Ecotoxicology of the Emerging Contaminants Polyhalogenated Carbazoles .....	LIN Kun-de, CHEN Yan-qiu, YUAN Dong-xing (1576)
Classification of Priority Area for Soil Environmental Protection Around Water Sources; Method Proposed and Case Demonstration .....	LI Lei, WANG Tie-yu, WANG Xiao-jun, <i>et al.</i> (1584)

# 《环境科学》第6届编辑委员会

主 编: 欧阳自远

副主编: 赵景柱 郝吉明 田 刚

编 委: (按姓氏笔画排序)

万国江 王华聪 王凯军 王绪绪 田 刚 田 静 史培军  
朱永官 刘志培 刘 毅 汤鸿霄 孟 伟 周宗灿 林金明  
欧阳自远 赵景柱 姜 林 郝郑平 郝吉明 聂永丰 黄 霞  
黄 耀 鲍 强 潘 纲 潘 涛 魏复盛

环 境 科 学

(HUANJING KEXUE)

(月刊 1976年8月创刊)

2016年4月15日 第37卷 第4期

ENVIRONMENTAL SCIENCE

(Monthly Started in 1976)

Vol. 37 No. 4 Apr. 15, 2016

主 管	中国科学院	Superintended	by	Chinese Academy of Sciences
主 办	中国科学院生态环境研究中心	Sponsored	by	Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences
协 办	(以参加先后为序) 北京市环境保护科学研究院 清华大学环境学院	Co-Sponsored	by	Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection School of Environment, Tsinghua University
主 编	欧阳自远	Editor-in -Chief		OUYANG Zi-yuan
编 辑	《环境科学》编辑委员会 北京市2871信箱(海淀区双清路 18号, 邮政编码:100085) 电话:010-62941102, 010-62849343 传真:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn	Edited	by	The Editorial Board of Environmental Science ( HUANJING KEXUE) P. O. Box 2871, Beijing 100085, China Tel:010-62941102, 010-62849343; Fax:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn
出 版	科 学 出 版 社 北京东黄城根北街16号 邮政编码:100717	Published	by	Science Press 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷 装 订	北京北林印刷厂	Printed	by	Beijing Bei Lin Printing House
发 行	科 学 出 版 社 电话:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com	Distributed	by	Science Press Tel:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com
订 购 处	全国各地邮电局	Domestic		All Local Post Offices in China
国外总发行	中国国际图书贸易总公司 (北京399信箱)	Foreign		China International Book Trading Corporation (Guoji Shudian), P. O. Box 399, Beijing 100044, China

中国标准刊号: ISSN 0250-3301  
CN 11-1895/X

国内邮发代号: 2-821

国内定价: 120.00元

国外发行代号: M 205

国内外公开发行