2,6-二叔丁基酚降解菌的降解特性研究

方振炜¹, 徐德强^{2*}, 张亚雷¹, 肖义平², 赵建夫¹

(1. 同济大学污染控制和资源化研究国家重点实验室, 上海 200092, E-mail: fangzhw@eyou.com; 2. 复旦大学生命科学学院, 上海 200433)

摘要:从腈纶废水处理构筑物的生物膜中分离、筛选得到 1 株能降解 2,6-二叔丁基酚的菌株, 经驯化, 其对 2,6-二叔丁基酚的降解率提高了 26%, 具有了较高降解能力。经形态和生理生化鉴定, 该菌株属于产碱菌属(*Alcaligenes* sp.)。通过摇瓶试验考察了生长条件对菌株的生长和底物降解的影响, 得出该菌株的最适生长条件为温度 37℃, 初始 pH 为 7.0, 接种量为 0.1%。在该条件下, 对初始底物浓度为 100 mg/L 的降解过程进行了考察, 结果表明其 11 d 的降解率达 62.4%, 而且降解过程符合 Eckenfelder 动力学模型, 半衰期为 9.38 d。还对不同初始底物浓度对菌株降解性能的影响进行了研究, 结果表明最佳初始底物浓度为 200 mg/L, 当小于该值时, 初始底物浓度的增加促进该菌株的生长和底物的降解, 而当大于这个值时, 则起抑制作用。

关键词: 2,6-二叔丁基酚; 生物降解; 产碱菌

中图分类号: X172 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2004)03-0098-04

The Degradation Characteristics of Degrading Bacterium of 2, 6-Di-tert-butylphenol

FANG Zhen-wei¹, XU De-qiang^{2*}, ZHANG Ya-lei¹, XIAO Yi-ping², ZHAO Jian-fu¹

(1. State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji University, Shanghai 200092, China E-mail: fangzhw@eyou.com; 2. School of Life Science, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: A degrading bacterial strain F-3-4 for 2,6-Di-tert-butylphenol (2,6-DTBP) was isolated from biofilm in acrylic fiber wastewater treatment structures. By acclimation, its capacity for degradation of 2,6-DTBP was enhanced by 26%. It was identified as *Alcaligenes* sp. according to morphological, physiological and biochemical characters. By tests in shaking flasks, the effects of the conditions of growth was studied, and it was determined that the optimum conditions of growth for the strain was 37℃, pH 7.0 and inoculum amount 0.1%. Under these conditions, the kinetics of degradation for 2,6-DTBP of initial concentration 100 mg/L was studied, and the result indicated that the removal rate of 2,6-DTBP within 11 days was 62.4%, and the degradation process followed Eckenfelder kinetics. The half life of 2,6-DTBP was 9.38 days. The effect of initial concentration on degradation ability of the strain also was investigated. The results showed that the optimum initial concentration was 200 mg/L. When the initial concentrations were below it, the growth of strain and removal of 2,6-DTBP increased with the increase of initial concentration, while when above the value, they were inhibited.

Key words: 2,6-Di-tert-butylphenol; biodegradation; *Alcaligenes* sp. strain F-3-4

酚类物质被广泛地用在钢铁、制药、石化和农药等行业, 是这些行业废水中的主要有毒有害成分之一。含酚废水通常污染水源, 毒死鱼虾, 危害农作物, 并严重威胁人类的健康。国内外许多学者对这类物质的生物降解进行了研究^[1~6], 但其中对 2,6-二叔丁基酚的生物降解研究还鲜有报道。2,6-二叔丁基酚在制药、化纤和橡胶行业上广泛地被作为中间媒介, 用在制备抗氧化剂、抗紫外剂上, 是这些行业排放的污染物之一。该物质对水体中的鱼类、藻类和微生物有很大的毒害作用^[7], 而且难生物降解^[8]。本研究针对上海某石化腈纶厂的废水, 从该厂的废水处理构筑物生物膜中经分离、筛选和驯化获得一株高效 2,6-二叔丁基酚降解菌, 并对其降解性能进行了研究, 为进一步开展此类废水的工业化处理提供

良好的微生物菌源。

1 材料和方法

1.1 供试底物

2,6-二叔丁基酚(分析纯, 北京助剂研究所)。

1.2 培养基

肉汤培养基成分见文献[9]。

Bushnell-Hass(B.H.)基础培养基成分如下^[10]:

MgSO₄·7H₂O, 0.2g; KH₂PO₄, 1g; (NH₄)₂SO₄, 1g;
CaCl₂, 0.02g; K₂HPO₄, 1g; FeCl₃, 2 滴浓缩液; 蒸馏

收稿日期: 2003-08-28; 修订日期: 2003-12-04

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(50008011)

作者简介: 方振炜(1980-), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为水污染控制技术。

* 通讯联系人

水 1 L.

1.3 微生物来源

采自上海某石化腈纶厂废水处理站的塔式生物滤池和沉淀池水,经分离和筛选得到 1 株能降解 2,6-二叔丁基酚的 F-3-4 菌株.

1.4 菌悬液的制备

将 37℃ 下生长 24h 的斜面菌种接种到装有 30 mL 肉汤培养基的 250 mL 三角烧瓶中,在 37℃、250 r/min 的恒温摇床中培养 24h,然后将种子液离心、洗涤,最后配成一定浓度的菌悬液.

1.5 菌株驯化

将 3 mL 浓度为 3% [以单位体积的细胞湿重 (W/V) 表示] 的 F-3-4 菌悬液接种到含 2,6-二叔丁基酚 500 mg/L 的 B.H. 基础培养基中,于 37℃ 下在转速为 250 r/min 的恒温摇床中培养 4d,此时培养液明显浑浊.然后取上述驯化液 3 mL 加入到含 2,6-二叔丁基酚 500 mg/L 的新鲜 B.H. 基础培养基中继续驯化,重复多次,最后取上述驯化液进行试验.

1.6 样品预处理和分析

在各摇瓶(包括空白对照样瓶)中加入 10 mL 正己烷,并将该混合液振荡 2 min 后迅速倒入离心管中,在 4℃、10 000 r/min 条件下离心 8 min,抽取上清液作适当的稀释,最后在 276 nm 处用 UV-2201 型紫外-可见分光光度计(日本岛津公司)测定 2,6-二叔丁基酚的浓度.培养液的光密度在 640 nm 处采用 SP-1105 型可见分光光度计进行分析.

1.7 菌株鉴定

主要参考文献[11~16],对驯化后的 2,6-二叔丁基酚降解菌进行鉴定.

2 结果与讨论

2.1 菌株驯化对 2,6-二叔丁基酚降解的影响

分别将未经驯化、2 次驯化和多次驯化的菌种制备成菌悬液,接种到含 2,6-二叔丁基酚 100 mg/L 的 B.H. 基础培养基中进行培养,定时取样,测定 2,6-二叔丁基酚的含量变化.结果(图 1)表明,通过驯化,F-3-4 菌株对底物的降解能力有了一定的提高.在初始浓度为 100 mg/L 时,经 11 d 培养,其降解率比未驯化的提高了 26%,而且起始反应速率也得到了提高.

2.2 生长条件对菌株生长和 2,6-二叔丁基酚降解的影响

在装有 30 mL B.H. 基础培养基的 250 mL 三角烧瓶中加入 2,6-二叔丁基酚作为唯一碳源,并使其

浓度达 100 mg/L.分别对温度(25、30、37、40、45℃) 初始 pH 值(5.0、6.0、7.0、8.0、9.0) 和接种量(0.01、0.05、0.1、0.15、0.20%) 进行单因素条件试验.测定培养 11 d 时培养液的光密度和 2,6-二叔丁基酚浓度.各条件对菌株 F-3-4 降解 2,6-二叔丁基酚的影响如图 2~4 所示.

图 2 表明,温度对菌株 F-3-4 生长的影响很显

图 1 驯化对 2,6-二叔丁基酚降解的影响

Fig. 1 2,6-DTBP degradation of acclimated strain F-3-4

图 2 温度对菌株生长和 2,6-二叔丁基酚降解的影响

Fig. 2 Effects of temperature on strain growth and 2,6-DTBP degradation

图 3 接种量对菌株生长和 2,6-二叔丁基酚降解的影响

Fig. 3 Effects of amount size on strain growth and 2,6-DTBP degradation

著.在温度小于 30℃ 时,菌株的生长基本停止,而 2,6-二叔丁基酚降解率也很小,温度在 30℃ 和 37℃

图 4 初始 pH 对菌株生长和 2,6-二叔丁基酚降解的影响

Fig. 4 Effects of initial pH on strain growth and

2,6-DTBP degradation

之间时,菌株的生长和 2,6-二叔丁基酚降解率随温度的升高而同步上升,在温度大于 37℃,它们则随温度的升高而同步下降.图 3 表明,当接种量小于 0.1%时,菌株 F-3-4 的生长量(以净增 OD 值表示)和 2,6-二叔丁基酚的降解率随接种量的增加而梯度上升,当大于 0.1%时,菌株生长量反而随接种量的增加而降低,2,6-二叔丁基酚的降解率的上升则明显趋缓.图 4 表明,酸性环境相比碱性环境,对菌株的生长和 2,6-二叔丁基酚的降解有更明显的抑制作用;该菌株适合在中性或偏碱的环境中生存.

以底物去除率高、菌体生长量大以及经济可行性为原则,根据以上试验结果确定菌株 F-3-4 降解 2,6-二叔丁基酚的最适条件为:温度 37℃,初始 pH 为 7.0,接种量为 0.1%.

2.3 最适生长条件下的 2,6-二叔丁基酚降解

在最适生长条件下,以 2,6-二叔丁基酚为唯一碳源,进行 F-3-4 菌株降解 2,6-二叔丁基酚的摇瓶试验研究.接种的摇瓶和不接种的空白对照瓶均以磨口玻璃塞密闭并在瓶口缠 Parafilm 密封,置于恒温摇床中培养.按一定时间间隔取样,分析摇瓶中的底物浓度变化.当底物浓度为 100 mg/L 时,F-3-4 菌株对底物的降解情况如图 5.结果表明,F-3-4 菌株对 2,6-二叔丁基酚有较好的降解能力.在上述的培养条件下,培养 11 d 时,底物的降解率达 62.4%.

在实验中建立 Monod 模型,根据实际条件推导,发现该模型实际上符合 Eckenfelder 模式,由数据处理可得动力学方程 $\ln S = -0.0739t + 4.4677$, R^2 为 0.9596,半衰期 $t_{1/2}$ 为 9.38 d.由图 5 可以看出,所得的动力学方程能较好地描述试验中的反应趋势.

2.4 初始底物浓度对菌株降解性能的影响

初始底物浓度分别为 41、72、106、153、200、

404 595 和 1007 mg/L 时,在最适条件下通过摇瓶试验考察初始底物浓度的影响.培养 11 d 取样分析.

图 5 最佳生长条件下的 2,6-二叔丁基酚降解

Fig. 5 2,6-DTBP Degradation by F-3-4 in the

optimum growth conditions

图 6 表明,在底物 2,6-二叔丁基酚浓度小于 200 mg/L 时,菌株的生长和底物的降解量都随初始底物浓度的增大而增加;在 200 mg/L 和 1000 mg/L 之间时,菌株的生长和底物的降解量随底物浓度的增加出现了停滞现象.这说明,在低浓度范围内,底物浓度的增加对菌株的生长和底物的降解有促进作用,而高浓度则带来了毒害作用,产生了一定的抑制. Patrick 在研究 2,6-二氯酚的生物降解时,对这种高浓度现象的解释是:由于反应体系的能量有限,高浓度底物的存在分散了能量的分布^[3].基于这样

图 6 初始底物浓度对菌株降解性能的影响

Fig. 6 The effect of initial concentrations of 2,6-DTBP

on the degradation ability of strain F-3-4

的原因,引发底物降解反应所需的能量难以达到活化能,从而使底物的降解受到了抑制.另外,在这个高浓度段,F-3-4 菌株对底物的降解能力仅是略微下降,说明该菌株对 2,6-二叔丁基酚有很强的耐受性,适应范围广.浓度为 200 mg/L 时,F-3-4 菌株的生长量最大,净增 OD 值达 0.974,2,6-二叔丁基酚的降解量达 94.3 mg/L,降解率达 47.8%.

表 1 2,6-二叔丁基酚降解菌的形态学和生理生化特征

Table 1 The morphological, physiological and biochemical characters of the bacterium for degrading 2,6-Di-tert-butylphenol

菌落特征	菌体特征	生理生化特征	
		阳性	阴性
圆形,Φ0.5~1.0mm,麦杆黄,不透明,表面光滑,湿润,低凸起,边缘裂叶状,有水果香味.	杆短杆或近球,单个存在,大小为(0.5~0.6)×(0.6~2.0)μm,有1~5根周生鞭毛.	需氧性(好氧)	革兰氏染色
		过氧化氢酶	NO ₃ ⁻ →NO ₂ ⁻
		氧化酶	从硝酸盐产氮气
		氧化型代谢(产碱)	利用为唯一碳源和能源:
		从亚硝酸盐产气	葡萄糖
		利用酰胺类和有机盐产碱:	D 果糖
		乙酰胺	D 甘露糖
		天门冬酰胺	D 木糖
		醋酸钠	D 丝氨酸
		柠檬酸三钠	苯丙氨酸
		丙酸钠	利用碳水化合物产酸:
		利用为唯一碳源和能源:	葡萄糖
		赖氨酸(弱)	D 果糖
		丙氨酸	D 甘露醇
		柠檬酸	D 木糖
反丁烯二酸	七叶灵水解		
苹果酸	纤维素水解		
适宜生长温度(20~37℃)	明胶水解		
	吡啶产生		
	氧化乙醇为乙酸		
	生长需要 NaCl		

3 结论

(1) 由试验得出 F-3-4 菌株的最适生长条件:温度 37℃,初始 pH 为 7.0,接种量为 1.0%.

(2) 在最适生长条件下,2,6-二叔丁基酚的初始浓度为 100 mg/L 时,菌株对底物的降解率达 62.4%,底物降解过程符合 Eckenfelder 动力学模型,半衰期为 9.38d.

(3) 最佳初始底物降解浓度为 200 mg/L.当低于该浓度时,初始底物浓度的增加促进 F-3-4 菌株的生长和底物的降解;而高于这浓度时,则起抑制作用.

(4) 经鉴定,F-3-4 菌株为产碱菌(*Alcaligenes* sp.).

参考文献:

- [1] Menke B, Rehm H J. Degradation of mixtures of monochlorophenols and phenol as substrates for free and immobilized cells of *Alcaligenes* sp. A7-2 [J]. *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, 1992, 37: 655.
- [2] Huban C M, Plowman R D. Bioaugmentation: Put microbes to work [J]. *Chemical Engineering*, 1997, 104(3): 74~84.
- [3] Patrick S, Stucki G, Stettler R, et al. Aerobic mineralization of 2,6-Dichlorophenol by *Ralstonia* sp. strain RK1 [J]. *Appl.*

2.5 2,6-二叔丁基酚降解菌株的鉴定

根据文献[11~16],对 2,6-二叔丁基酚降解菌 F-3-4 菌株进行了形态学和生理生化特征研究(表 1).

上述结果表明:F-3-4 菌株符合产碱菌属(*Alcaligenes*)的特征^[11~13],故确认 F-3-4 菌株属于产碱菌属(*Alcaligenes* sp.).

Environ. Microbiol., 1998, 64: 2566~2571.

- [4] Tirrola M A, Männistö M K, Puhakka J A, et al. Isolation and Characterization of *Novosphingobium* sp. strain MT1, a Dominant Polychlorophenol-Degrading Strain in a Groundwater Bioremediation System [J]. *Appl. Environ. Microbiol.*, 2002, 68: 173~180.
- [5] 任源,慎义勇,韦朝海.驯化筛选微生物对油制气废水的降解特性[J].*环境科学*,2002,23(5):76~79.
- [6] 陈明,张维,徐玉泉,等.醋酸钙不动杆菌 PHEA-2 对苯酚的降解特性研究[J].*中国环境科学*,2001,21(3):226~229.
- [7] U.S. Environmental Protection Agency. G034. 2,6-Di-tert-butylphenol test results [128-39-2].
- [8] 张亚雷.难降解有机废水(腈纶废水)处理工艺及其污染物生物降解性能研究[D].上海:同济大学,1999.77~79.
- [9] 周群英,高廷耀编著.环境工程微生物学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2000.330.
- [10] Bushnell L D, Hass H F. The utilization of certain hydrocarbons by microorganisms [J]. *Journal of Bacteriology*, 1941, 41(5): 653~673.
- [11] Krieg N R, Holt J G. *Bergey's manual of systematic bacteriology* (Volume 1) [M]. Baltimore: The Williams & Wilkins Co., 1984. 361~373.
- [12] Holt J G, Krieg N R, Sneath P H A, et al. *Bergey's manual of determinative bacteriology* (9th ed.) [M]. Baltimore: The Williams & Wilkins Co., 1994. 75: 131.
- [13] 东秀珠,蔡妙英,等.常见细菌系统鉴定手册[M].北京:科学出版社,2001.180~181,353~388.
- [14] 中国科学院微生物研究所细菌分类组编著.一般细菌常用鉴定手册[M].北京:科学出版社,1978.64~65.
- [15] Oberhofer T R, Rowen J W. Acetamide agar for differentiation of nonfermentative Bacteria [J]. *Appl. Microbiol.*, 1974, 28(4): 720~721.
- [16] Oberhofer T R, Rowen J W, Cunningham G F. Characterization and Identification of Gram-negative, nonfermentative Bacteria [J]. *J. Clin. Microbiol.*, 1977, 5(2): 208~220.