环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第35卷 第12期

Vol.35 No.12

2014

中国科学院生态环境研究中心 主办

科学出版社 出版

目次(卷终)

北京雾霾天气生物气溶胶浓度和粒径特征 高敏,仇天雷,贾瑞志,韩梅琳,宋渊,王旭明(4415)

杭州大气颗粒物散射消光特性及霾天气污染特征 徐昶,叶辉,沈建东,孙鸿良,洪盛茂,焦荔,黄侃(4422)

太原市采暖季 PM_{2.5} 中元素特征及重金属健康风险评价 李丽娟,温彦平,彭林,白慧玲,刘凤娴,史美鲜(4431)

成都市城区 PM_{2.5} 中二次水溶性无机离子污染特征 李友平,周洪,张智胜,王启元,罗磊(4439)

北京市臭氧的时空分布特征 王占山,李云婷,陈添,张大伟,孙峰,孙瑞雯,董欣,孙乃迪,潘丽波(4446)

南京北郊大气 VOCs 变化特征及来源解析 安俊琳,朱彬,王红磊,杨辉(4454)

祁连山中段降水化学的环境意义研究 李宗杰,李宗省,田青,宋玲玲,贾冰,郭瑞,宋耀选,苏索南,韩春坛(4465)

中亚热带典型林分不同层次氮硫湿沉降动态变化 孙涛,马明,王定勇,黄礼昕(4475)

本底大气 CO₂ 观测分析过程中 QA/QC 方法的建立与评估 刘立新,周凌晔,夏玲君,王红阳,方双喜(4482)

轻型汽油车 CH₄ 和 N₂O 排放因子研究 何立强,宋敬浩,胡京南,解淑霞,祖雷(4489)

煤燃烧超细微粒粒径谱演变及排放因子的实验研究 孙在,杨文俊,谢小芳,陈秋方,蔡志良(4495)

春、夏季长江口及其邻近海域溶解 N₂O 的分布和海-气交换通量 王岚,张桂玲,孙明爽,任景玲(4502)

珠江口水体组分的吸收特性分析 王珊珊,王永波,扶卿华,尹斌,李云梅(4511)

河流汇合处水体磷素形态特征及紫外光照的影响:以渠江-嘉陵江、涪江-嘉陵江交汇为例 闫金龙,江韬,魏世强,李玲,郭念,李璐璐,刘江(4522)

基于太湖微囊藻毒素的叶绿素 a 阈值研究 魏代春,苏婧,纪丹凤,伏小勇,王骥,霍守亮,崔驰飞,唐军,席北斗(4530)

百花湖周边城市近郊小流域氮、磷输出时空特征 冯源嵩,林陶,杨庆媛(4537)

自然光照对淹水条件下三峡库区消落带典型土壤磷释放影响 郭念,江韬,魏世强,闫金龙,梁俭,卢松,高洁(4544)

垂直流人工湿地 LDHs 覆膜改性沸石基质强化除磷效果及其机制 张翔凌,陈俊杰,郭露,陈巧珍,王晓晓(4553)

三峡库区消落带 3 种植物淹水后汞的动态变化及其对水体的影响 张翔,张成,孙荣国,王定勇(4560)

纳米 TiO₂ 对底泥中汞释放及活化的影响 张金洋,李楚娴,王定勇,周雄,孙荣国,张成,梁丽(4567)

首都水源地——洋河流域人为源多环芳烃(PAHs)排放清单估算及其影响分析 高佳佳,罗维,奚晓霞(4573)

石化工业园区有毒废水来源识别研究 杨茜,于茵,周岳溪,陈学民,伏小勇,王淼(4582)

污水处理厂中红霉素抗药性基因的污染特征及选择性因子 李侃竹,吴立乐,黄圣琳,何势,刘振鸿,薛罡,高品(4589)

2 种填料 BAF 深度处理印染废水沿程污染物变化规律研究 刘俊峰,范举红,刘锐,陈吕军,张永明(4596)

硫酸盐还原型甲烷厌氧氧化菌群驯化及其群落特征 席婧茹,刘素琴,李琳,刘俊新(4602)

MBR 处理腈纶废水的效能及微生物群落结构分析 魏健,宋永会,赵乐(4610)

制革废水的厌氧氨氧化 ABR 脱氮工艺研究 曾国驱,贾晓珊(4618)

生物滤池工艺的数值模拟与运行优化 邹宗森,施汉昌,陈向强,谢小青(4627)

气升装置对厌氧氨氧化污泥形态及性能的影响 李祥,黄勇,袁怡,周呈,陈宗短,张大林(4636)

给水厂污泥改良生物滞留填料除磷效果的研究 王建军,李田,张颖(4642)

北京地区不同城镇污水处理厂堆肥污泥的营养含量和重金属污染 白莉萍,齐洪涛,伏亚萍,李萍(4648)

电子垃圾拆解区污染池塘中鱼类多氯联苯及其代谢产物的组织分配及暴露风险 唐斌,罗孝俊,曾艳红,麦碧娴(4655)

广东罗非鱼养殖区水体和鱼体中重金属、HCHs、DDTs 含量及风险评价 谢文平,朱新平,郑光明,马丽莎(4663)

崇明典型水生生物中雌激素含量和分布特征 耿婧婧,叶爱丽,杨毅,刘敏,张婧,周俊良(4671)

啮虫脒光催化降解动力学的优化及其降解产物的分析 周文常,阳海,胡志斌,兰世林(4678)

氮添加对生长季寒温带针叶林土壤有效氮和酸化的影响 陈高起,傅瓦利,罗亚晨,高文龙,李胜功,杨浩(4686)

土地利用方式对缙云山土壤团聚体稳定性及其有机碳的影响 李鉴霖,江长胜,郝庆菊(4695)

上海市郊设施大棚次生盐渍化土壤盐分含量调查及典型对应分析 唐冬,毛亮,支月娥,张进忠,周培,柴晓彤(4705)

某铅酸蓄电池污染场地表层土壤重金属 Pb 空间分布预测研究 刘庚,牛俊杰,张朝,赵鑫,郭观林(4712)

海泡石对镉-铅复合污染钝化修复效应及其土壤环境质量影响研究 孙约兵,王朋超,徐应明,孙扬,秦旭,赵立杰,王林,梁学峰(4720)

盐碱区不同开发年限水田温室气体排放规律及影响因素 汤洁,方天儒,侯克怡,赵仁竹,梁爽(4727)

不同热解温度生物炭对 Cd(II) 的吸附特性 王震宇,刘国成,Monica Xing,李锋民,郑浩(4735)

碱土金属钙沉积对 Mn-Ce/TiO₂ 低温 SCR 催化剂脱硝性能的影响 周爱奕,毛华峰,盛重义,谭月,杨柳(4745)

国内外水泥工业大气污染物排放标准比较研究 江梅,李晓倩,纪亮,邹兰,魏玉霞,赵国华,车飞,李刚,张国宁(4752)

我国水泥工业大气污染物排放标准的修订历程与思考 江梅,李晓倩,纪亮,邹兰,魏玉霞,赵国华,车飞,李刚,张国宁(4759)

《环境科学》第35卷(2014年)总目录 (4767)

《环境科学》征订启事(4617) 《环境科学》征稿简则(4654) 信息(4474, 4529, 4536, 4744)

某铅酸蓄电池污染场地表层土壤重金属 Pb 空间分布预测研究

刘庚¹, 牛俊杰¹, 张朝², 赵鑫², 郭观林^{2*}

(1. 太原师范学院汾河流域科学发展研究中心, 太原 030012; 2. 中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012)

摘要: 为准确界定某典型蓄电池企业污染场地土壤中特征性污染物 Pb 的空间分布范围, 分析和比较了数据拆分后的分区预测模型($OK_{LC} + TIN$)、数据正态变换后克里格模型(OK_{BC})、反距离加权模型(IDW)以及样条函数模型(Spline)对土壤 Pb 污染空间分布预测和污染评价的影响。结果表明, 原始数据集具有高偏倚特征, 局部区域存在较大的空间变异性; 分区预测模型取得了最高的预测精度, 预测的污染物空间分布比较符合场地实际污染状况, 其它 3 种模型受适用原理及数据特征影响, 预测精度较低, 预测结果不能很好反映高污染区域的细部变化特征, 不适合该场地 Pb 的空间分布预测与制图。研究结果对于此类型工业污染场地后续的修复范围确定和修复治理决策制定提供了参考。

关键词: 污染场地; 重金属; 空间分布预测; 污染评价; 异常值

中图分类号: X131.3; X53 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2014)12-4712-08 DOI: 10.13227/j.hjxx.2014.12.039

Spatial Distribution Prediction of Surface Soil Pb in a Battery Contaminated Site

LIU Geng¹, NIU Jun-jie¹, ZHANG Chao², ZHAO Xin², GUO Guan-lin²

(1. Research Center for Scientific Development in Fenhe River Valley, Taiyuan Normal University, Taiyuan 030012, China; 2. State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China)

Abstract: In order to enhance the reliability of risk estimation and to improve the accuracy of pollution scope determination in a battery contaminated site with the soil characteristic pollutant Pb, four spatial interpolation models, including Combination Prediction Model ($OK_{LC} + TIN$), kriging model(OK_{BC}), Inverse Distance Weighting model (IDW), and Spline model were employed to compare their effects on the spatial distribution and pollution assessment of soil Pb. The results showed that Pb concentration varied significantly and the data was severely skewed. The variation coefficient of the site was higher in the local region. $OK_{LC} + TIN$ was found to be more accurate than the other three models in predicting the actual pollution situations of the contaminated site. The prediction accuracy of other models was lower, due to the effect of the principle of different models and datum feature. The interpolation results of OK_{BC} , IDW and Spline could not reflect the detailed characteristics of seriously contaminated areas, and were not suitable for mapping and spatial distribution prediction of soil Pb in this site. This study gives great contributions and provides useful references for defining the remediation boundary and making remediation decision of contaminated sites.

Key words: contaminated site; heavy metal; spatial distribution prediction; pollution evaluation; outlier

铅酸蓄电池污染场地是工业污染场地一个重要类型^[1, 2], 赋存在场地土壤中的铅对人体健康和生态环境产生严重危害^[3]。近年来, 由生产过程和工业搬迁等原因产生的铅酸蓄电池污染场地数量呈现上升趋势^[4]。部分污染场地土地利用类型也由此发生变化, 已有大量场地进入到环境调查、风险评估和修复治理过程^[5-7]。在此过程中, 污染物在场地的空间分布范围是进行场地风险管理的重要基础^[8], 基于土壤采样点数据, 采用空间统计模型对污染物空间分布预测是目前描述污染物空间分布的主要手段^[9, 10]。

铅酸蓄电池企业在生产过程中涉及到重金属, 对场地内土壤产生严重的 Pb 污染, 受历史生产过

程、车间工艺布局、污染源分布等因素影响, 同其它工业污染场地类似, 土壤中污染物的累积较多地受人因素干扰, 局部区域污染严重, 污染物含量极高, 不同区域污染物的污染程度和分布规律都不相同^[11, 12]。受异常值影响, 土壤中污染物具有很强的空间变异性^[13, 14], 在受到人为干扰较大的地区, 污染物含量与土壤属性等环境变量不具有很高的相关性^[15]。对于土壤污染中高值点的空间分布, 现有研

收稿日期: 2014-05-14; 修订日期: 2014-07-12

基金项目: 国家自然科学基金青年基金项目(41401236, 40901249); 国家高技术研究发展计划(863)项目(2013AA06A206)

作者简介: 刘庚(1981~), 男, 博士, 讲师, 主要研究方向为区域土壤环境变化及其效应, E-mail: liugeng9696@126.com

* 通讯联系人, E-mail: guog@cras.org.cn

究大多采用数值模型或空间模拟的方法来表征污染物空间分布规律^[16], 插值计算中需要土壤性质等辅助信息且输入参数较多, 对于受人为干扰因素较大的工业污染场地表层土壤污染分布表征, 有些数据并不容易获取, 因此插值的精度会受建模方法和参数准确性的影响较大。

现有空间插值模型针对较大尺度面源土壤污染预测效果较好, 在使用时对数据统计分布特征、样本量和采样方案以及相关环境辅助数据都有一定要求。Li 等^[17]系统分析了空间统计模型、确定性插值模型等不同插值方法的应用机制和适用条件。不同模型的模型精度优势和插值效果并不一致^[18, 19]。为进一步提高土壤中污染物空间分布预测精度, 相关学者提出了地理加权回归和贝叶斯最大熵模型, 在反映空间变异特征等方面取得了较好的效果^[20, 21]; 同时在数据挖掘^[22]、不同抽样方案^[23]、引入环境数据^[24]等方面也展开了提高预测精度相关内容的研究。本研究针对该目标污染场地土壤 Pb 含量强变异性的分布特点, 采用数据拆分后分区预测的思路, 分别表征反映局部高污染区域真实高值点数据集部分和反映整体污染特征其它数据集部

分的污染范围, 将两部分数据集采用三角网格和对数克里格模型分别插值计算后叠加处理, 并对预测结果与常用的地统计学模型和确定性插值模型进行对比, 分析不同模型的精度优势和对污染评价结果的影响, 弥补现有插值模型对高偏倚性数据集预测的不足, 以期为此类污染场地的环境风险管理工作提供科学指导。

1 材料与方法

1.1 目标污染场地概况

该场地曾经是我国西南地区较大的铅酸蓄电池生产厂家, 有 60 多年生产历史, 生产产品有各类型铅酸蓄电池, 广泛应用于交通、能源、通信等蓄能要求领域。原厂区有生产车间、污水处理站、包装车间、机修车间以及废铅堆放区等功能区域, 该厂区平面布置图如图 1 所示。生产的主要原材料有铅、锌、硫酸等, 在生产过程中涉及到重金属污染物, 通过场地初步调查, 发现 Pb 为该场地的特征污染物。根据场地的水文地质资料和钻孔显示, 场区地层为第四系全新统素填土 (Q_4^m)、残坡积粉质黏土层 (Q_4^{cl+dl})。

图 1 厂区平面布置和样点分布示意

Fig. 1 Factory floor plan and locations of sampling sites

1.2 样品采集与分析

目标场地面积为 13.6 hm^2 , 通过对目标场地的勘察, 结合该厂区车间布局以及生产管理等因素影

响, 现场采样采用随机布点和判断布点相结合的原则, 对已察明的重污染区域和已知污染区域加密布点, 共布设土壤样点 79 个, 采样深度为 0 ~ 9.4 m,

本研究选择表层土壤即 0 ~ 60 cm 深度土壤样点进行分折. 因场地搬迁与拆除造成部分建筑垃圾堆砌在地面, 钻孔采样采用挖掘机和钻机相结合的方式, 在预先设定的采样点位钻探, 获取该点位的土柱样品, 将采样管移出地面后, 将筛选出的土样混合均匀后立即装入 250 mL 直口玻璃瓶中, 并正确密封、填写标签、放入装有适量低温蓝冰的保存箱中, 样品采集完毕后送回实验室并进行检测. 土壤中 Pb 含量采用 USEPA 6010C-2007 方法进行测定^[25].

1.3 不同插值方法介绍

本研究采用 4 种不同插值模型对土壤中 Pb 污染进行空间分布预测. 通过对原始样点含量数据值初步统计分析可知, 数据集具有严重偏倚特征, 且含有异常值. 对于正态分布数据集, 大概 99.7% 的样本值落在距平均值和 3 个标准差范围内, 由于本研究中的高值点含量极大, 因此本研究采用①平均值加 4 倍标准差的方法来识别异常值, 识别出异常值后, 对异常值进行拆分, 并以原始数据的中值代替拆分出的高值, 对于高值点部分, 采用三角网格插值方法 (TIN) 进行预测, 对于拆分出高值点后的数据集, 符合对数正态分布特征, 采用对数克里格方法 (OK_{LG}) 进行预测, 最后对两部分预测结果叠加处理, 形成整个场地的污染分布预测. 使用对偏斜数据正态分布变换效果较好的 BOX-COX 方法对原始数据做正态变换处理, 然后使用②普通克里格 (OK_{BC}) 以及③确定性插值模型中的反距离加权方法 (IDW) 和样条函数方法 (Spline) 对正态变换后的数据插值计算, 将插值后的结果根据正态变换公式进行逆变换, 转换到原始数据单位. 最后对 4 种模型的预测精度和污染评价进行对比分析.

1.4 数据处理方法

本研究中 Pb 含量的描述性统计分析采用软件 SPSS 16.0, 空间变异分析采用地统计学软件 GS + 7.0, 空间插值计算与污染评价采用地理信息系统软件 ESRI ArcGIS 10.0. 不同插值方法预测结果精度验证采用交叉验证法中常用的评价指标平均误差 (ME) 和均方根误差 (RMSE) 进行评价^[26], ME 越接近于 0, RMSE 越小表明插值精度就越高.

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [u(x_i) - u^*(x_i)] \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [u(x_i) - u^*(x_i)]^2} \quad (2)$$

式中, $u(x_i)$ 为预测值, $u^*(x_i)$ 原始样点值.

2 结果与分析

2.1 场地土壤中 Pb 含量的描述性统计特征

场地土壤中 Pb 含量的频率分布特征如图 2 所示, 可以看出, 由于 Pb 含量数据中有真实高值点存在, 其频率分布直方图具有很大的右偏斜, 不符合正态分布特征. 约有 75% 的样点含量集中在 23.60 ~ 8 000 $mg \cdot kg^{-1}$ 范围内. 最大值为 166 000 $mg \cdot kg^{-1}$, 最小值为 23.60 $mg \cdot kg^{-1}$, 样点含量的极差很大. 描述性统计指标中的标准差为 26 970.67 $mg \cdot kg^{-1}$, 偏度为 3.57, 峰度为 14.87, 变异系数为 1.95, 表明原始样点含量数据具有很强的空间变异特征. 采用平均值加 4 倍标准差的方法识别数据集中高值点, 共发现有 9 个异常真实高值点存在, 将这 9 个异常真实高值点用中值代替后再进行描述性统计分析, 发现新数据集的偏度、峰度以及变异系数都明显降低, 基本符合对数正态分布特征, 表明真实高值点是原始数据集产生严重右偏倚性的主要原因. 将采样样点叠加到原厂区平面分布图上可以看出, 真实高值点以及超标较为严重的样点分布区域包括废铅堆放区, 五车间和配件厂、二车间、一车间和四车间等, 说明上述车间在生产过程中对土壤中 Pb 的累积影响较大. 样点含量数据的均值和中值分别为 13 839.83 $mg \cdot kg^{-1}$ 和 2 855 $mg \cdot kg^{-1}$, 远超过北京住宅用地标准中的 400 $mg \cdot kg^{-1}$, 目标场地已经存在较大的环境风险.

图 2 场地土壤中 Pb 含量频率分布直方图

Fig. 2 Frequency distribution of soil Pb

2.2 场地土壤中 Pb 含量的空间变异特征

该目标污染场地是我国典型的铅酸蓄电池生产企业, 部分车间生产以及材料的存放过程中对局部

区域产生较严重的土壤 Pb 污染,样点含量含有异常真实高值,造成样点污染物数据在场地中具有很强的空间变异性以及分布的不连续特征. 从原始样点 Pb 含量数据的描述性统计分析结果已经看出,原始数据集具有很强的偏倚性和离散特征. 本研究采用泰森多边形的方法来进一步揭示土壤中 Pb 污染的空间变异,分析采样样点间的相似性和局部变化特征. 采用土壤钻孔样点构建整个场地的泰森多边形,并依据每个样点的含量计算每个多边形的标准差和平均值,来确定多边形的变异系数 (coefficient of variation, CV),对所有多边形变异系数值统计得出最小值为 0.51,最大值为 2.58,均值为 1.27,标准差为 0.48,计算出的土壤钻孔样点含量变异系数分布如图 3 所示,从中可以看出,土壤中 Pb 污染的变异程度较强,空间变异系数在场地的中部区域较高,其它

区域相对较低. 土壤中 Pb 污染的局部变异系数特征与原厂区生产车间产生污染源的分布情况较为一致,场地的中部区域主要为废铅堆放区,五车间和配件厂、二车间、一车间和四车间等,是产生土壤 Pb 污染的主要来源,在该区域的采样样点含量都较高,且含有真实高值点,造成了污染物在空间上强的空间变异性,因此污染物含量的空间变异系数值也较大. 其它区域主要有库房、成品车间、办公楼以及配件厂等,对土壤的 Pb 污染较轻,污染物的分布相对较为连续,污染物含量的空间变异系数值较小. 局部变异系数值较大的地方,是将来需要加密采样以及修复治理等相关工作重点关注的区域. 通过分析土壤中 Pb 含量的空间变异分布特征,可以直观获取污染物在空间上的离散特性和离散程度,对选择合理的插值方法,辅助分析污染评价结果具有重要作用.

图 3 土壤中 Pb 含量的空间变异特征

Fig. 3 Spatial variation of Pb concentration in soil of part regions

2.3 数据变换后统计分析及半变异函数拟合

对拆分后的数据集做对数正态变换以及原始数据集做 BOX-COX 正态变换,两种正态变换后数据的描述性统计分析结果及频率分布直方图如图 4 所示,可以看出,经正态变换后,两种数据集的偏度和峰度均有较大程度降低,能够通过正态分布检验,频

率分布直方图显示符合正态分布特征.

对正态变换后的数据集进行半变异函数拟合,拟合的最优理论模型和参数如表 1 所示,两种数据正态变换后数据拟合的半变异函数理论模型分别符合指数和高斯模型,空间相关度分别为 0.53 和 0.50,表明正态变换后的数据具有中等程度相关性,拟合的决定

图4 数据正态变换后频繁分布直方图

Fig. 4 Histograms of Pb concentrations in soils after normality transformation

表1 半变异函数模型参数

Table 1 Parameters of variogram models

数据变换类型	理论模型	块金值	基台值	变程 m	空间相关度	决定系数
拆分后对数变换	指数模型	0.57	1.08	26.80	0.53	0.92
BOX-COX 变换	高斯模型	0.62	1.23	31.50	0.50	0.86

系数分别为 0.96 和 0.82, 具有较为稳健的效果, 能够满足对数克里格和普通克里格插值要求。

2.4 不同插值方法对土壤中 Pb 含量的预测精度分析

4 种方法预测后的交叉验证结果精度如表 2 所示, 4 种方法的预测统计结果与插值精度差异较大。OK_{LG} + TIN、OK_{BC}、IDW、Spline 预测的最大值分别为 175 699.2、115 014.3、84 752.0、55 864.8 mg·kg⁻¹, 预测的最小值分别为 82.2、96.0、87.5、102.4 mg·kg⁻¹, 预测的平均值分别为 14 143.2、11 753.4、10 857.3、9 862.4 mg·kg⁻¹, 可以看出, OK_{BC}、IDW、Spline 预测的最大值和平均值远低于实测的最大值和平均值, 而预测的最小值均高于实测的最小值, 表明该 3 种方法在插值计算过程中对高值和低值部分都有一定的平滑效应, 即高值点部分受其周边低值点的影响, 在插值预测后其含量被拉低, 低值点部分受周围高值点的影响, 预测后的含量被抬高。OK_{LG} + TIN 方法预测的最大值、平均值和实测最大值、平均值较为接近, 其原因是高值点被拆分后采用

TIN 方法插值, 能够最大程度反映污染的局部特征, 拆分掉高值点部分的数据集符合对数克里格插值原理, 能够反映出场地的整体污染特征, 因此 OK_{LG} + TIN 方法插值计算结果有效降低了预测过程中的平滑效应, 其预测的最小值虽也高于实测最小值, 但最小值远低于北京住宅用地标准规定的 400 mg·kg⁻¹, 不是修复治理过程重点关注的区域。从不同方法预测精度的交叉验证结果来看, OK_{LG} + TIN 具有最小的 ME 和 RMSE, 其次分别是 OK_{BC}、IDW 和 Spline, 表明 OK_{LG} + TIN 具有最高的插值精度, 其预测结果能够较为真实地反映场地的实际污染状况。OK_{BC} 方法在对原始数据正态变换和逆变换过程中, 产生了较大的平滑效应, IDW 方法对样点分布位置和样点数量要求较高, 样点越多且分布越均匀其预测精度越高, Spline 方法一般要求数据集有连续的一阶和二阶导数, 受场地部分建筑物和硬化地面等实际情况影响, 很难做到高密度和均匀网格布点采样, 因此 OK_{BC}、IDW 和 Spline 的预测精度都较低。

表2 不同插值方法预测统计结果与预测误差/mg·kg⁻¹Table 2 Statistical summary and cross validation error for estimated Pb concentrations of different interpolation methods/mg·kg⁻¹

项目	实测值	OK _{LG} + TIN	OK _{BC}	IDW	Spline
最大值	166 000.0	175 699.2	115 014.3	84 752.0	55 864.8
最小值	23.6	82.2	96.0	87.5	102.4
平均值	13 839.8	14 143.2	11 753.4	10 857.3	9 862.4
标准差	26 970.7	11 873.6	17 060.5	15 587.1	14 696.4
平均误差	—	15.7	48.6	51.9	64.3
均方根误差	—	80.6	167.5	172.5	214.7

2.5 不同插值方法对土壤中 Pb 的污染插值结果比较

在对原始数据进行相应的预处理后, 使用 OK_{LG} + TIN、IDW、Spline、OK_{BC} 方法对土壤中 Pb 含量的

分布进行空间插值计算, 最终形成的污染物空间分布如图 5 所示, 从中可以看出, 4 种插值方法对污染物空间分布预测的总体趋势相似, 但在细部特征上

图中(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)分别表示用OK_{LC}、TIN、OK_{LC} + TIN、IDW、Spline、OK_{BC}方法的插值预测结果

图5 不同插值方法对土壤Pb污染的空间分布预测

Fig. 5 Soil Pb pollution prediction according to different models

差异较大. 总体上来看, 4 种插值方法预测污染较为严重的区域主要分布在厂区的中部和东南部分区域, 分布在厂区中部的主要车间有废铅堆放区、极片生产二车间、一车间等, 场地东南区域的车间主要有四车间、五车间等, 上述车间在生产以及材料存储过程中涉及到 Pb, 对土壤中 Pb 污染的程度较为严重. 从污染预测图的细部变化上来看, $OK_{LG} + TIN$ 方法由于对高值点部分采用了 TIN 方法预测, 较好地反映场地局部高污染特征, 对拆分出高值点的数据集部分采用 OK_{LG} 方法预测, 符合对数克里格模型的插值原理, 能够反映出场地整体的污染趋势, 叠加后的污染预测图比较符合场地的实际污染状况. IDW 和 Spline 方法属于确定性插值模型, 在计算过程中只依据数据的几何结构特征, 未考虑样点的空间信息, 对样点要求较高, 受样点分布位置和样点数量的影响, 其插值结果虽能反映出场地污染的总体趋势, 但难以准确反映出污染的局部尤其是高污染区的细部特征. OK_{BC} 方法对原始数据做了正态变换处理, 符合克里格插值原理, 但在数据正态变换以及插值结果的逆变换过程中, 对高值点部分产生了很大的平滑效应, 同样难以反映出高污染区域的细部特征. 在污染场地风险评估以及修复治理过程中, 重点关注的是高污染和高风险区域, 受采样样点数量、样点分布以及插值方法适用原理等因素影响, IDW、Spline、 OK_{BC} 方法预测结果难以反映场地高污染区域的细部变化特征.

参照北京市住宅标准所规定的 Pb 含量值 $400 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 原始样点超标率为 58.9%, 将预测结果转化为栅格数据进行统计计算, 将高于 $400 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的区域界定为污染范围, 统计结果发现, $OK_{LG} + TIN$ 预测的污染范围与样点超标率较为接近, 污染超标范围为 55.4%, IDW 和 Spline 预测的污染范围高于样点超标率, 污染超标范围分别为 65.7% 和 67.9%, OK_{BC} 预测的污染范围低于样点超标率, 污染超标范围为 51.8%. 污染范围界定过大, 在修复过程中虽能消除整个场地的污染危害, 但会增加修复的投资, 影响实际修复工程的开展, 污染范围界定过小, 降低了修复工程的成本, 但不能确保消除整个污染场地的风险. 因此选择合理的插值模型, 准确界定污染范围和修复边界, 对于指导实际修复工作、消除场地风险和危害具有重要作用.

3 结论

(1) 受历史生产过程及人为因素干扰, 场地土

壤中 Pb 含量的样点数据集具有严重偏斜特征, 统计发现含有异常真实高值点, 在局部区域有很强的变异性和污染物空间分布的不连续性. 污染物空间变异特征与污染源对土壤中 Pb 的累积释放影响较为一致.

(2) 不同插值方法预测结果都能反映出场地的总体污染趋势, 但现有确定性插值模型和地统计学模型中的 IDW、Spline、 OK_{BC} 方法预测结果不能很好反映场地高污染区域的细部变化, 对高污染区域产生很大的平滑效应, 预测结果精度较低, 难以精确表征场地土壤 Pb 污染的实际污染特征.

(3) $OK_{LG} + TIN$ 对原始数据集拆分后, 对高值点部分和其它数据集部分采用分区预测的思路, 分别插值计算后再进行叠加处理, 可以较好地反映出场地局部区域和整体趋势的污染变化, 取得了最高的预测精度, 预测结果比较符合场地的实际污染状况, 能够较为有效指导污染场地污染范围界定和场地修复方案决策的制定.

参考文献:

- [1] Forslund J, Samakovlis E, Johansson M V, *et al.* Does remediation save lives? -On the cost of cleaning up arsenic-contaminated sites in Sweden [J]. *Science of the Total Environment*, 2010, **408**(16): 3085-3091.
- [2] 岳希, 孙体昌, 黄锦楼. 某铅蓄电池厂表土不同粒径中铅分布规律研究[J]. *环境科学*, 2013, **34**(9): 3679-3683.
- [3] Blake W H, Walsh R P D, Reed J M, *et al.* Impacts of landscape remediation on the heavy metal pollution dynamics of a lake surrounded by non-ferrous smelter waste [J]. *Environmental Pollution*, 2007, **148**(1): 268-280.
- [4] 骆永明. 中国污染场地修复的研究进展、问题与展望[J]. *环境监测管理与技术*, 2011, **23**(3): 1-6.
- [5] 郭观林, 王翔, 关亮, 等. 基于特定场地的挥发/半挥发有机化合物(VOC/SVOC)空间分布与修复边界确定[J]. *环境科学学报*, 2009, **29**(12): 2597-2605.
- [6] 林佳佳, 王维, 居婕, 等. 无锡市锡山区棕(褐)地环境风险评价研究[J]. *中国环境科学*, 2013, **33**(4): 748-753.
- [7] 姜林, 钟茂生, 朱笑盈, 等. 多证据分析技术在场地重金属污染评价中的应用研究[J]. *环境科学*, 2013, **34**(9): 3641-3647.
- [8] 刘庚, 郭观林, 南锋, 等. 某大型焦化企业污染场地中多环芳烃空间分布的分异性特征[J]. *环境科学*, 2012, **33**(12): 4256-4262.
- [9] Franco C, Soares A, Delgado J. Geostatistical modelling of heavy metal contamination in the topsoil of Guadiana river margins (S Spain) using a stochastic simulation technique [J]. *Geoderma*, 2006, **136**(3-4): 852-864.
- [10] Kamaruddin S A, Sulaiman W N A, Rahman N A, *et al.* A review of laboratory and numerical simulations of hydrocarbons migration in subsurface environments [J]. *Journal of*

- Environmental Science and Technology, 2011, **4** (3): 191-214.
- [11] Lark R M. Modelling complex soil properties as contaminated regionalized variables [J]. Geoderma, 2002, **106**(3-4): 173-190.
- [12] Rawlins B G, Lark R M, O'Donnell K E, *et al.* The assessment of point and diffuse metal pollution of soils from an urban geochemical survey of Sheffield, England [J]. Soil Use and Management, 2005, **21**(4): 353-362.
- [13] 吴运金, 何跃, 邓绍坡, 等. 污染场地土壤重金属空间异常值识别及其点源效应的分离[J]. 生态与农村环境学报, 2013, **29**(6): 789-795.
- [14] Juang K W, Lee D Y. A comparison of three kriging methods using auxiliary variables in heavy-metal contaminated soils [J]. Journal of Environmental Quality, 1998, **27**(2): 355-363.
- [15] Wu C F, Wu J P, Luo Y M, *et al.* Statistical and geochemical characterization of heavy metal concentrations in a contaminated area taking into account soil map units [J]. Geoderma, 2008, **144**(1-2): 171-179.
- [16] Marchant B P, Saby N P A, Lark R M, *et al.* Robust analysis of soil properties at the national scale: cadmium content of French soils [J]. European Journal of Soil Science, 2010, **61**(1): 144-152.
- [17] Li J, Heap A D. A review of comparative studies of spatial interpolation methods in environmental sciences: Performance and impact factors [J]. Ecological Informatics, 2011, **6**(3-4): 228-241.
- [18] Beelen R, Hoek G, Pebesma E, *et al.* Mapping of background air pollution at a fine spatial scale across the European Union [J]. Science of the Total Environment, 2009, **407**(6): 1852-1867.
- [19] Grunwald S. Multi-criteria characterization of recent digital soil mapping and modeling approaches [J]. Geoderma, 2009, **152**(3-4): 195-207.
- [20] 郭龙, 张海涛, 陈家赢, 等. 基于协同克里格插值和地理加权回归模型的土壤属性空间预测比较[J]. 土壤学报, 2012, **49**(5): 1037-1042.
- [21] D'Or D, Bogaert P. Continuous-Valued map reconstruction with the Bayesian Maximum Entropy [J]. Geoderma, 2003, **112**(3-4): 169-178.
- [22] Wu J, Norvell W A, Welch R M. Kriging on highly skewed data for DTPA-extractable soil Zn with auxiliary information for pH and organic carbon [J]. Geoderma, 2006, **134**(1-2): 187-199.
- [23] Juang K W, Liao W J, Liu T L, *et al.* Additional sampling based on regulation threshold and kriging variance to reduce the probability of false delineation in a contaminated site [J]. Science of the Total Environment, 2008, **389**(1): 20-28.
- [24] 张贝, 李卫东, 杨勇, 等. 贝叶斯最大熵地统计学方法及其在土壤和环境科学上的应用[J]. 土壤学报, 2011, **48**(4): 831-839.
- [25] <http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/6010c.pdf>.
- [26] Robinson T P, Metternicht G. Testing the performance of spatial interpolation techniques for mapping soil properties [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2006, **50**(2): 97-108.

CONTENTS

Concentration and Size Distribution of Bioaerosols at Non-haze and Haze Days in Beijing	GAO Min, QIU Tian-lei, JIA Rui-zhi, <i>et al.</i> (4415)
Light Scattering Extinction Properties of Atmospheric Particle and Pollution Characteristics in Hazy Weather in Hangzhou	XU Chang, YE Hui, SHEN Jian-dong, <i>et al.</i> (4422)
Characteristic of Elements in PM _{2.5} and Health Risk Assessment of Heavy Metals During Heating Season in Taiyuan	LI Li-juan, WEN Yan-ping, PENG Lin, <i>et al.</i> (4431)
Pollution Characteristics of Secondary Water-soluble Inorganic Ions of PM _{2.5} in Urban Chengdu, China	LI You-ping, ZHOU Hong, ZHANG Zhi-sheng, <i>et al.</i> (4439)
Temporal and Spatial Distribution Characteristics of Ozone in Beijing	WANG Zhan-shan, LI Yun-ting, CHEN Tian, <i>et al.</i> (4446)
Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds (VOCs) in the Northern Suburb of Nanjing	AN Jun-lin, ZHU Bin, WANG Hong-lei, <i>et al.</i> (4454)
Environmental Significance of Wet Deposition Composition in the Central Qilian Mountains, China	LI Zong-jie, LI Zong-xing, TIAN Qing, <i>et al.</i> (4465)
Dynamics of Nitrogen and Sulfur Wet Deposition in Typical Forest Stand at Different Spatial Levels in Simian Mountain, Mid-subtropical Region	SUN Tao, MA Ming, WANG Ding-yong, <i>et al.</i> (4475)
Establishment and Assessment of QA/QC Method for Sampling and Analysis of Atmosphere Background CO ₂	LIU Li-xin, ZHOU Ling-xi, XIA Ling-jun, <i>et al.</i> (4482)
An Investigation of the CH ₄ and N ₂ O Emission Factors of Light-duty Gasoline Vehicles	HE Li-qiang, SONG Jing-hao, HU Jing-nan, <i>et al.</i> (4489)
Experimental Study on the Size Spectra and Emission Factor of Ultrafine Particle from Coal Combustion	SUN Zai, YANG Wen-jun, XIE Xiao-fang, <i>et al.</i> (4495)
Distributions and Air-Sea Fluxes of Dissolved Nitrous Oxide in the Yangtze River Estuary and Its Adjacent Marine Area in Spring and Summer	WANG Lan, ZHANG Gui-ling, SUN Ming-shuang, <i>et al.</i> (4502)
Spectral Absorption Properties of the Water Constituents in the Estuary of Zhujiang River	WANG Shan-shan, WANG Yong-bo, FU Qing-hua, <i>et al.</i> (4511)
Characteristics of Phosphorus Forms and the Effects of UV Light in the Confluences Water of Qujiang-Jialing River and Fujiang-Jialing River	YAN Jin-long, JIANG Tao, WEI Shi-qiang, <i>et al.</i> (4522)
Research on the Threshold of Chl-a in Lake Taihu Based on Microcystins	WEI Dai-chun, SU Jing, JI Dan-feng, <i>et al.</i> (4530)
Temporal and Spatial Characteristic of Nitrogen and Phosphorus Output in the Suburb Watershed Around the Baihua Lake	FENG Yuan-song, LIN Tao, YANG Qing-yuan (4537)
Effects of Light Irradiation on Phosphorous Releases from Typical Submerged Soils of Water-Level Fluctuation Zones of Three Gorges Reservoirs Areas	GUO Nian, JIANG Tao, WEI Shi-qiang, <i>et al.</i> (4544)
Analysis on the Removal Efficiency and Mechanisms of Phosphorus by Modified Zeolites Substrates Coated with LDHs Reacted by Different Metal Compounds in Laboratory-Scale Vertical-Flow Constructed Wetlands	ZHANG Xiang-ling, CHEN Jun-jie, GUO Lu, <i>et al.</i> (4553)
Mercury Dynamics of Several Plants Collected from the Water-Level Fluctuation Zone of the Three Gorges Reservoir Area During Flooding and Its Impact on Water Body	ZHANG Xiang, ZHANG Cheng, SUN Rong-guo, <i>et al.</i> (4560)
Effect of Nano-TiO ₂ on the Release and Activation of Mercury in Sediment	ZHANG Jin-yang, LI Chu-xian, WANG Ding-yong, <i>et al.</i> (4567)
Estimation Inventory of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Anthropogenic Sources and Its Impacts within the Yanghe Watershed, an Important Water-Source Site of Beijing, China	GAO Jia-jia, LUO Wei, XI Xiao-xia (4573)
Source Identification of Toxic Wastewaters in a Petrochemical Industrial Park	YANG Qian, YU Yin, ZHOU Yue-xi, <i>et al.</i> (4582)
Investigation of Pollution Characteristics of Erythromycin Resistance Genes in a Sewage Treatment Plant and the Relevant Selective Factors	LI Kan-zhu, WU Li-le, HUANG Sheng-lin, <i>et al.</i> (4589)
Variation of Pollutants Along the Height of Two Media BAF During Advanced Treatment of Dyeing Wastewater	LIU Jun-feng, FAN Ju-hong, LIU Rui, <i>et al.</i> (4596)
Acclimatization and Characteristics of Microbial Community in Sulphate-Dependent Anaerobic Methane Oxidation	XI Jing-ru, LIU Su-qin, LI Lin, <i>et al.</i> (4602)
Capability and Microbial Community Analysis of a Membrane Bioreactor for Acrylic Fiber Wastewater Treatment	WEI Jian, SONG Yong-hui, ZHAO Le (4610)
Nitrogen Removal Performance of ANAMMOX ABR Process in Tannery Wastewater Treatment	ZENG Guo-qu, JIA Xiao-shan (4618)
Numerical Simulation and Operation Optimization of Biological Filter	ZOU Zong-sen, SHI Han-chang, CHEN Xiang-qiang, <i>et al.</i> (4627)
Effect of Gas-lift Device on the Morphology and Performance of ANAMMOX Sludge	LI Xiang, HUANG Yong, YUAN Yi, <i>et al.</i> (4636)
Water Treatment Residual as a Bioretention Media Amendment for Phosphorus Removal	WANG Jian-jun, LI Tian, ZHANG Ying (4642)
Nutrient Contents and Heavy Metal Pollutions in Composted Sewage Sludge from Different Municipal Wastewater Treatment Plants in Beijing Region	BAI Li-ping, QI Hong-tao, FU Ya-ping, <i>et al.</i> (4648)
Polychlorinated Biphenyls and Their Methylsulfonyl Metabolites in Fish from an Electronic Waste Recycling Site in South China: Tissue Distribution and Human Dietary Exposure	TANG Bin, LUO Xiao-jun, ZENG Yan-hong, <i>et al.</i> (4655)
Residues and Health Risk Assessment of HCHs, DDTs and Heavy Metals in Water and <i>Tilapia</i> s from Fish Ponds of Guangdong	XIE Wen-ping, ZHU Xin-ping, ZHENG Guang-ming, <i>et al.</i> (4663)
Concentration and Distribution Characteristics of Estrogen in Aquatic Organism from Chongming Island	GENG Jing-jing, YE Ai-li, YANG Yi, <i>et al.</i> (4671)
Photocatalytic Degradation of Acetamiprid by TiO ₂ and Xe Lamp: Kinetics and Degradation Intermediates	ZHOU Wen-chang, YANG Hai, HU Zhi-bin, <i>et al.</i> (4678)
Effects of Nitrogen Addition on Available Nitrogen Content and Acidification in Cold-temperate Coniferous Forest Soil in the Growing Season	CHEN Gao-qi, FU Wa-li, LUO Ya-chen, <i>et al.</i> (4686)
Impact of Land Use Type on Stability and Organic Carbon of Soil Aggregates in Jinyun Mountain	LI Jian-lin, JIANG Chang-sheng, HAO Qing-ju (4695)
Investigation and Canonical Correspondence Analysis of Salinity Contents in Secondary Salinization Greenhouse Soils in Shanghai Suburb	TANG Dong, MAO Liang, ZHI Yue-e, <i>et al.</i> (4705)
Spatial Distribution Prediction of Surface Soil Pb in a Battery Contaminated Site	LIU Geng, NIU Jun-jie, ZHANG Chao, <i>et al.</i> (4712)
Immobilization Remediation of Cd and Pb Contaminated Soil: Remediation Potential and Soil Environmental Quality	SUN Yue-bing, WANG Peng-chao, XU Ying-ming, <i>et al.</i> (4720)
Rules and Impact Factors of Greenhouse Gases Emission in the Saline-Alkali Paddy Fields in Different Years	TANG Jie, FANG Tian-ru, HOU Ke-yi, <i>et al.</i> (4727)
Adsorption of Cd(II) Varies with Biochars Derived at Different Pyrolysis Temperatures	WANG Zhen-yu, LIU Guo-cheng, Monica Xing, <i>et al.</i> (4735)
Poisoning Effect of Ca Depositing Over Mn-Ce/TiO ₂ Catalyst for Low-temperature Selective Catalytic Reduction of NO by NH ₃	ZHOU Ai-yi, MAO Hua-feng, SHENG Zhong-yi, <i>et al.</i> (4745)
A Comparative Study on Domestic and Foreign Emission Standards of Air Pollutants for Cement Industry	JIANG Mei, LI Xiao-qian, JI Liang, <i>et al.</i> (4752)
Revision Process and Thinking of Emission Standard of Air Pollutants for Cement Industry	JIANG Mei, LI Xiao-qian, JI Liang, <i>et al.</i> (4759)

《环境科学》第6届编辑委员会

主 编: 欧阳自远

副主编: 赵景柱 郝吉明 田 刚

编 委: (按姓氏笔画排序)

万国江 王华聪 王凯军 王绪绪 田 刚 田 静 史培军
朱永官 刘志培 汤鸿霄 陈吉宁 孟 伟 周宗灿 林金明
欧阳自远 赵景柱 姜 林 郝郑平 郝吉明 聂永丰 黄 霞
黄 耀 鲍 强 潘 纲 潘 涛 魏复盛

环 境 科 学

(HUANJING KEXUE)

(月刊 1976年8月创刊)

2014年12月15日 第35卷 第12期

ENVIRONMENTAL SCIENCE

(Monthly Started in 1976)

Vol. 35 No. 12 Dec. 15, 2014

主 管	中国科学院	Superintended	by	Chinese Academy of Sciences
主 办	中国科学院生态环境研究中心	Sponsored	by	Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences
协 办	(以参加先后为序) 北京市环境保护科学研究院 清华大学环境学院	Co-Sponsored	by	Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection School of Environment, Tsinghua University
主 编	欧阳自远	Editor-in -Chief		OUYANG Zi-yuan
编 辑	《环境科学》编辑委员会 北京市2871信箱(海淀区双清路 18号, 邮政编码:100085) 电话:010-62941102, 010-62849343 传真:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn	Edited	by	The Editorial Board of Environmental Science (HUANJING KEXUE) P. O. Box 2871, Beijing 100085, China Tel:010-62941102, 010-62849343; Fax:010-62849343 E-mail: hjkx@rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn
出 版	科 学 出 版 社 北京东黄城根北街16号 邮政编码:100717	Published	by	Science Press 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷 装 订	北京北林印刷厂	Printed	by	Beijing Bei Lin Printing House
发 行	科 学 出 版 社 电话:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com	Distributed	by	Science Press Tel:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com
订 购 处	全国各地邮电局	Domestic		All Local Post Offices in China
国外总发行	中国国际图书贸易总公司 (北京399信箱)	Foreign		China International Book Trading Corporation (Guoji Shudian), P. O. Box 399, Beijing 100044, China

中国标准刊号: ISSN 0250-3301
CN 11-1895/X

国内邮发代号: 2-821

国内定价: 90.00元

国外发行代号: M 205

国内外公开发行