

环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第36卷 第9期

Vol.36 No.9

2015

中国科学院生态环境研究中心 主办
科学出版社 出版



目次

长江三角洲 PM _{2.5} 质量浓度遥感估算与时空分布特征	徐建辉, 江洪 (3119)
宁波市 PM _{2.5} 中碳组分的时空分布特征和二次有机碳估算	杜博涵, 黄晓锋, 何凌燕, 胡敏, 王川, 任宇超, 应红梅, 周军, 汪伟峰, 许丹丹 (3128)
青岛大气中酸碱气体及 PM _{2.5} 中水溶性离子的浓度特征和气粒平衡关系	周佳佳, 石金辉, 李丽平, 姚小红, 高会旺 (3135)
北京雾霾天大气颗粒物中微生物气溶胶的浓度及粒谱特征	胡凌飞, 张柯, 王洪宝, 李娜, 王洁, 杨文慧, 殷喆, 焦周光, 温占波, 李劲松 (3144)
2015 年春节北京市空气质量分析	程念亮, 陈添, 张大伟, 李云婷, 孙峰, 魏强, 刘嘉林, 刘保献, 孙瑞雯 (3150)
上海市大气挥发性有机化学消耗与臭氧生成的关系	王红丽 (3159)
生物滴滤塔净化氯代烃混合废气的研究	陈东之, 缪孝平, 欧阳杜娟, 叶杰旭, 陈建孟 (3168)
一种基于 GOCI 数据的叶绿素 a 浓度三波段估算模型	郭宇龙, 李云梅, 李渊, 吕恒, 刘阁, 王旭东, 张思敏 (3175)
巢湖溶解性有机物时空分布规律及其影响因素	叶琳琳, 吴晓东, 刘波, 闫德智, 张玫琪, 周阳 (3186)
河北洺河溶解性有机物光谱学特性	虞敏达, 张慧, 何小松, 檀文炳, 张媛, 马丽娜, 席北斗, 党秋玲, 高如泰 (3194)
东山岛地下水“三氮”空间分布特征	吴海燕, 傅世锋, 蔡晓琼, 汤坤贤, 曹超, 陈庆辉, 梁修雨 (3203)
重庆典型岩溶区地下河中溶解态正构烷烃、脂肪酸来源、迁移及转化	梁作兵, 孙玉川, 王尊波, 师阳, 江泽利, 张媚, 谢正兰, 廖昱 (3212)
硫酸对乌江中上游段岩溶水化学及 $\delta^{13}\text{C}_{\text{DIC}}$ 的影响	黄奇波, 覃小群, 刘朋雨, 张连凯, 苏春田 (3220)
阆中市思依镇水化学特征及其成因分析	张艳, 吴勇, 杨军, 孙厚云 (3230)
东南沿海河流-水库系统藻类生长营养盐限制季节变动	陈聪聪, 饶拉, 黄金良, 白敏冬 (3238)
水体氮磷营养盐水平与氯霉素浓度复合水体对苦草的生理生化影响	胡珍珍, 崔益斌, 李梅, 余静 (3248)
溶藻活性物质对棕囊藻溶藻及其脂肪酸影响的模拟	杨秋婵, 赵玲, 尹平河, 谭烁, 舒万姣, 侯少玲 (3255)
坡岸截留强化处理设施在不同运行条件下对农业面源污染物去除效果	李怀正, 陈珂莉, 危忠, 王卫刚 (3262)
典型材料屋面积尘重金属形态分布与风险评估	李敦柱, 管运涛, 刘安, 李思远 (3269)
南水北调丹江口水库水氯(胺)化消毒副产物产生特性与消毒工艺对比	张民盛, 徐斌, 张天阳, 程拓, 夏圣骥, 楚文海 (3278)
臭氧-混凝交互作用对混凝效果的影响	刘海龙, 郭雪峰, 王敏慧, 焦茹媛, 石健 (3285)
含溴水臭氧化过程阴离子对溴酸盐生成的影响	吴悦, 吴纯德, 刘吕刚, 袁博杰 (3292)
厌氧环境雌黄溶解产物形态的 XAS 研究	王莹, 许丽英, 王少锋, 肖翻, 贾永峰 (3298)
印染及染料行业废水生物处理系统中的 AOX 污染研究	申洋洋, 刘锐, 徐灿灿, 舒小铭, 许江军, 兰亚琼, 陈吕军 (3304)
螺旋霉素制药废水处理过程中耐药菌和抗性基因的转归特征	覃彩霞, 佟娟, 申佩弘, 魏源送 (3311)
两种膜生物反应器处理养猪沼液的比较研究	税勇, 川岸朋树, 宋小燕, 刘锐, 陈吕军 (3319)
农村污水膜生物反应器系统中微生物群落解析	孔晓, 崔丙健, 金德才, 吴尚华, 杨波, 邓晔, 庄国强, 庄绪亮 (3329)
四区一体反应器冬季启动脱氮特性及硝化菌群结构分析	张岩, 孙凤侠, 谢杭冀, 陈敬, 睦稀, 甘志明, 王修平, 史扬 (3339)
从亚硝酸还原厌氧氨氧化转变为硫酸盐型厌氧氨氧化	刘正川, 袁林江, 周国标, 李晶 (3345)
提高有机负荷对好氧颗粒污泥形成与稳定过程的影响	刘小鹏, 王建芳, 钱飞跃, 王琰, 陈重军, 沈耀良 (3352)
常规施肥条件下农田不同途径氮素损失的原位研究: 以长江中下游地区夏玉米季为例	桑蒙蒙, 范会, 姜珊珊, 蒋静艳 (3358)
水氮组合模式对双季稻甲烷和氧化亚氮排放的影响	傅志强, 龙攀, 刘依依, 钟娟, 龙文飞 (3365)
厌氧条件下砂壤水稻土 N ₂ 、N ₂ O、NO、CO ₂ 和 CH ₄ 排放特征	曹娜, 王睿, 廖婷婷, 陈诺, 郑循华, 姚志生, 张海, Klaus Butterbach-Bahl (3373)
黄土丘陵区不同有机碳背景下侵蚀坡面土壤呼吸特征	陈盖, 许明祥, 张亚锋, 王超华, 樊会敏, 王闪闪 (3383)
生物炭添加对半干旱地区土壤温室气体排放的影响	郭艳亮, 王丹丹, 郑纪勇, 赵世伟, 张兴昌 (3393)
宁南山区林地土壤原位矿化过程中碳氮转化耦合特征	倪银霞, 黄懿梅, 牛丹, 赵彤, 闫浩, 蒋跃利 (3401)
石漠化山地植被恢复过程土壤团聚体氮分布及与氮素矿化关系研究	胡宁, 马志敏, 蓝家程, 伍宇春, 陈高起, 傅瓦利, 文志林, 王文净 (3411)
江汉平原农田土壤有机碳分布与变化特点: 以潜江市为例	王玉竹, 肖和艾, 周萍, 童成立, 葛体达, 曾冠军, 吴金水 (3422)
缙云山不同土地利用方式下土壤团聚体中活性有机碳分布特征	李睿, 江长胜, 郝庆菊 (3429)
西北典型工矿型城市街道尘埃重金属污染的环境磁学响应	聂燕, 王新, 王博, 许淑婧, 高福元, 余晔, 夏敦胜, 夏听鸣 (3438)
电镀厂周边环境重金属分布特征及人体健康暴露风险评价	郭鹏然, 雷永乾, 周巧丽, 王畅, 潘佳钊 (3447)
典型电力电容器污染土壤中多氯联苯水平及特性	刘洁, 李晓东, 赵中华, 祁志福, 陈彤, 严建华 (3457)
紫色土对硫丹的吸附与解吸特征	赵炎, 郑国灿, 朱恒, 张进忠, 朱秀英, 胡淑春, 吴娅林 (3464)
紫茉莉对石油污染盐碱土壤微生物群落与石油烃降解的影响	焦海华, 崔丙健, 吴尚华, 白志辉, 黄占斌 (3471)
4 株外生菌根真菌对 Al ³⁺ 吸收与吸附的研究	王明霞, 袁玲, 黄建国, 周志峰 (3479)
长春市郊区蔬菜有机磷农药残留与健康风险评价	于锐, 刘景双, 王其存, 刘强, 王洋 (3486)
北京市北神树生活垃圾填埋场产甲烷菌的群落结构和演替规律	宋立娜, 王磊, 夏孟婧, 苏月, 李振山 (3493)
城市分散式粪便颗粒化有机肥用作叶菜肥的肥力及环境影响	吕文洲, 乔宇祥, 余宁, 史荣华, 王光明 (3501)
V ₂ O ₅ -WO ₃ /TiO ₂ 催化剂与活性炭混合降解气相二噁英	任咏, 纪莎莎, 俞明峰, 李晓东, 严建华 (3508)
基于出行服务的纯电动公交车节能减排效益分析	林晓丹, 田良, 吕彬, 杨建新 (3515)
我国挥发性有机物定义和控制指标的探讨	江梅, 邹兰, 李晓倩, 车飞, 赵国华, 李刚, 张国宁 (3522)
异化铁还原对土壤中重金属形态转化及其有效性影响	司友斌, 王娟 (3533)
《环境科学》征订启事 (3297) 《环境科学》征稿简则 (3303) 信息 (3127, 3202, 3277, 3318)	

螺旋霉素制药废水处理过程中耐药菌和抗性基因的转归特征

覃彩霞^{1,2}, 佟娟^{2*}, 申佩弘^{1*}, 魏源送^{2,3}

(1. 广西大学生命科学与技术学院, 南宁 530005; 2. 中国科学院生态环境研究中心, 北京 100085; 3. 江西省科学院能源研究所, 南昌 330096)

摘要: 抗生素耐药菌和抗性基因对环境和人体健康构成了巨大的潜在危害。因此本研究通过现场采样, 分析了某抗生素制药厂污水处理站不同季节螺旋霉素制药废水生物处理过程中大环内酯类耐药菌、6 种大环内酯类抗性基因 *ermB*、*ermF*、*ermX*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和 3 种转移元件 *ISCR1*、*intI1*、*Tn916/1545* 的转归特征。结果表明, 废水生物处理能有效削减异养菌和肠球菌 1.6~2.1 logs 和 3.7 logs, 4 个处理单元(调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池)出水中分离出的 94 株肠球菌均对螺旋霉素、阿奇霉素、红霉素、克拉霉素具有抗性, 并且出水中肠球菌的耐药率并没有下降。PCR 和荧光定量 PCR 的分析结果表明, 80% 耐药肠球菌携带抗性基因 *ermB*, 其他的抗性基因未检出, 并且春季和秋季样品中抗性基因 *ermB* 和 *ermF* 的含量均为最高。废水生物处理对抗性基因 *ermB*、*ermF*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *Tn916/1545* 有一定的削减效果, 但 *ermX*、*intI1*、*ISCR1* 出现了一定程度的反弹; *mefA*、*ereA*、*Tn916/1545* 的丰度降低了, 且春季 *mefA*、*ereA*、*Tn916/1545* 的去除效果明显好于秋季, 而 *ermX*、*intI1*、*ISCR1* 的丰度增加了。

关键词: 大环内酯类抗性基因; 肠球菌; 耐药菌; 抗生素废水; 生物处理

中图分类号: X172; X703 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2015)09-3311-08 DOI: 10.13227/j.hj.kx.2015.09.025

Fate of ARB and ARGs During Wastewater Treatment Process of Spiramycin Production

QIN Cai-xia^{1,2}, TONG Juan^{2*}, SHEN Pei-hong^{1*}, WEI Yuan-song^{2,3}

(1. College of Life Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530005, China; 2. Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 3. Institute of Energy, Jiangxi Academy of Sciences, Nanchang 330096, China)

Abstract: Antibiotic resistant bacteria (ARB) and antibiotic resistance gene (ARG) pose great risk to both environment and human health. This study aimed to investigate the fate of macrolide resistant bacteria, six macrolide resistance genes *ermB*, *ermF*, *ermX*, *mefA*, *ereA*, *mphB* and three transfer elements *ISCR1*, *intI1* and *Tn916/1545* during wastewater biological treatment processes of spiramycin production. Samples were collected from an antibiotic wastewater treatment station in different seasons. Results showed that the total heterotrophs and *Enterococci* were mostly removed during wastewater biological treatment, with the reduction of 1.6-2.1 logs for total heterotrophs and of 3.7 logs for *Enterococci*, respectively. For 94 antibiotic resistant *Enterococci* individually isolated from four different treatment units including adjusting tank, anaerobic tank, anoxic tank, and aerobic tank, all of these strains showed resistance to spiramycin, azithromycin, erythromycin, and clarithromycin; moreover, the antibiotic resistance rates was not reduced in the effluent. Results of PCR and quantitative PCR showed that 80% of antibiotic resistant *Enterococci* were positive for PCR amplification of *ermB*, but negative for PCR amplification of other genes. Concentrations of *ermB* and *ermF* were peaked in the spring and autumn samples. Resistance genes of *ermB*, *ermF*, *mefA*, *ereA*, *mphB* and transfer element of *Tn916/1545* were reduced to some degree during antibiotic production wastewater treatment, but concentrations of *ermX*, *intI1*, *ISCR1* in the effluent were higher than those in the influent. The abundance of *mefA*, *ereA* and *Tn916/1545* were reduced during wastewater treatment process, and the better removal performance for *mefA*, *ereA*, *Tn916/1545* occurred in spring than in autumn; however, the abundance of *ermX*, *intI1* and *ISCR1* were increased.

Key words: macrolide resistance gene; *Enterococci*; antibiotic resistant bacteria; antibiotic production wastewater; biological wastewater treatment

由于抗生素广泛用于人类医疗、畜禽养殖、水产养殖等,大量残留的抗生素进入环境,致使微生物

收稿日期: 2015-02-06; 修订日期: 2015-04-22

基金项目: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07203-002); 国家自然科学基金项目(21207147); 公益性行业(农业)科研专项(201303091)

作者简介: 覃彩霞(1990~),女,硕士研究生,主要研究方向为资源与环境微生物, E-mail: qincaixia1990@163.com

* 通讯联系人, E-mail: hitj@163.com; sos89@126.com

在持续抗生素选择压力下产生了耐药性,形成了耐药菌^[1]。抗性基因是耐药菌具有抗性的主要原因之一,它可以通过多种形式的可移动遗传元件如质粒、整合子、转座子、插入序列等,突破细菌之间的种属关系广泛传播,加重抗性污染^[2]。近几年,国内外细菌的耐药率成逐年上升的趋势^[3~5],并且国内外已有报道指出,耐药菌和抗性基因可能成为一种新型的环境污染物,其风险将比抗生素药物本身的污染风险更高^[6],这将对环境和人类健康构成严重的威胁^[7, 8]。

大环内酯与林可霉素、链阳菌素类抗生素具有细菌染色体上重叠的作用位点,因此导致一类抗性基因对所有这些抗生素具有抗药性,称为大环内酯类-林可霉素类-链阳菌素 (macrolide-lincosamide-streptogramin, MLS) 抗性基因^[9]。已有研究表明,MLS 抗性基因不仅能在 G^+ 和 G^- 菌之间传播^[10, 11],而且广泛存在于污水中,例如,MLS 抗性基因广泛存在于污水处理厂和海河流域的河水^[12]、养猪废水^[13]和临床医院废水^[14],其中在临床医院废水中分离出的红霉素耐药链球菌 (*Streptococcus*) 中有 78.7% 携带 MLS 抗性基因^[14]。MLS 抗性基因宿主广泛,且抗生素制药废水通常含有非常高的微生物量和丰富的营养,是耐药菌、MLS 抗性基因产生和扩散传播的高发区。抗生素废水有机物浓度高,难于处理,目前人们主要关注的是常规污染物 (如 COD、氨氮) 的去除效果,缺乏对抗生素废水抗性污染控制的深入研究。

本文以江苏无锡某螺旋霉素生产废水为研究对象,通过现场采样分析,重点考察耐药菌 (antibiotic resistance bacteria, ARB) 与抗性基因 (antibiotic resistance genes, ARG) 在螺旋霉素抗生素废水处理过程中的分布和转归特征,以期对抗生素制药废水的抗性污染防治提供科技支撑。

1 材料与方法

1.1 样品采集

本研究的样品采集于江苏省无锡市某制药废水处理站,主要采用活性污泥法处理螺旋霉素生产废水,污水处理流程为:调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池。本研究采样分两次进行,分别于 2014 年 4 月 (春季) 和 2014 年 9 月 (秋季) 采集不同污水处理单元 (调节池、厌氧池、缺氧池、二沉池) 的出水样品,分别标记为 A1 ~ A4 和 S1 ~ S4。采集的样品置于便携式冰箱运回实验室,并于 4℃ 冰箱中保存待用。

1.2 样品的处理

1.2.1 水质分析

根据国家标准方法^[15]对污水的常规指标 (SS、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐等) 进行检测。

1.2.2 样品总 DNA 提取

由于污水样品为泥水混合物,为了使泥水能够分离,同时又不会把水样中的微生物沉淀下去,并考虑到泥水混合物中大颗粒物与微生物的沉降速度不同,故通过低速离心使其分离,根据各采样点的水质不同分别取 20 ~ 100 mL 经过 0.22 μm 滤膜过滤,将滤膜剪碎,采用试剂盒 Fast DNA Spin Kit for soil (USA) 对滤膜上截留的生物量提取基因组总 DNA。提取的 DNA 溶液在 Nanodrop 分光光度计 (Nanodrop, US) 上测定浓度和质量,并进行琼脂糖凝胶电泳 (TBE 缓冲液,质量体积比 1%)。

1.2.3 样品中可培养细菌和肠球菌丰度的分析

总异养菌浓度的分析主要采用 R2A 培养基进行培养计数^[16],用 1 mL 灭菌移液吸管吸取污水样品 1 mL,缓慢注入含有 9 mL 灭菌 PBS 缓冲液的试管内,振荡试管混合均匀,制成 10^{-1} 稀释菌液。同法依次连续稀释至 10^{-2} 、 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 稀释菌液。每个采样点水样选择 3 个适宜稀释度,每个稀释梯度做 3 个平行样,吸取 0.1 mL 稀释菌液,加在已经倒入灭菌培养基并凝固备用的平板上。涂布法涂布均匀,37℃ 恒温生化培养箱中培养 2 d 后计数,以上无菌操作均在超净台中进行。

肠球菌的浓度分析主要采用滤膜法测定^[17],污水样品同上经过稀释,不同采样点的样品采用 PBS 缓冲液稀释成适宜的稀释液,用孔径 0.45 μm 醋酸纤维滤膜过滤,将滤膜以截留面朝上贴附在灭菌滤膜肠球菌培养基并凝固备用的平板上,平板倒置于生化培养箱中,37℃ 恒温培养 2 ~ 5 d,根据菌落生长情况确定培养时间 (t)。计数每个平板上的菌落数,并根据稀释倍数计算样品中肠球菌的丰度。挑取乳白色菌落划线于胆盐七叶苷琼脂培养基上,挑取有棕色光泽的菌落保存进行下一步实验。

1.3 菌株药敏测试

药敏测试采用 CLSI 推荐的 Kirby-Bauer 纸片法^[18],将待检菌株菌液的浊度用无菌生理盐水调节至 0.5 麦氏浊度后,用棉签蘸取菌液涂布于 Muller-Hinton 琼脂 (Oxoid) 平板上,贴上 4 种抗生素药敏纸片 (Oxoid): 阿奇霉素 (AZI)、红霉素 (ERY)、螺旋霉素 (SP)、克拉霉素 (CLR)。将平板倒置于生化培

养箱中,37℃恒温培养 24 h,测定抑菌圈直径,采用 CLSI 标准判断菌株的抗性,该研究以 ATCC25922 菌株为质控菌株。

1.4 抗性基因和转移元件的检测

1.4.1 抗性基因定性和肠球菌携带抗性基因的检测

采用 PCR 方法检测大环内酯类抗性基因 *ermB*、*ermF*、*ermX*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *ISCR1*、*intI1*、*Tn916/1545*,PCR 所用引物见表 1。抗性基因定性检测反应体系为:10 μL Green qPCR Master Mix,0.5 μL 引物(F),0.5 μL 引物(R),DNA 模板 1 μL,加 ddH₂O 至 20 μL。反应程序为:94℃ 5 min;

94℃ 30 s,55℃ 30 s,72℃ 1 min,34 次循环;72℃ 5 min,并在 4℃ 保存。每次运行使用无菌水做阴性对照,PCR 产物以 1% 的琼脂凝胶电泳分析。

采用菌液 PCR 的方法检测肠球菌携带抗性基因 *ermB*、*mefA* 和转移元件 *intI1* 的情况,基因引物同上。菌液 PCR 反应体系为:10 μL Green qPCR Master Mix,0.5 μL 引物(F),0.5 μL 引物(R),菌液 0.5 μL,加 ddH₂O 至 20 μL。反应程序为:94℃ 15 min;94℃ 30 s,55℃ 30 s,72℃ 1 min,34 次循环;72℃ 5 min,并于 4℃ 保存。每次运行使用无菌水做阴性对照,PCR 产物以 1% 的琼脂凝胶电泳分析。

表 1 抗性基因和转移元件所用引物序列

Table 1 Primers for resistance genes and mobile elements				
抗性基因	引物序列(5'→3')	片段大小/bp	退火温度/℃	文献
<i>ermB</i>	F:5' GATACCGTTTACGAAATGG3' R:5' GAATCGAGACTTGAGTGTGC3'	364	58	[19]
<i>ermF</i>	F:5' CGACACAGCTTTGGTTGAAC 3' R:5' GGACCTACCTCATAGACAAG 3'	309	56	[20]
<i>ermX</i>	F:5' GAGATCGGRCCAGGAAGC 3' R:5' GTGTGCACCATCGCCTGA 3'	488	58	[20]
<i>mefA</i>	F:5'AGTATCATTAATCACTAGTGC3' R:5'TTCTTCTGGTACTAAAAAGTGG3'	348	48	[20]
<i>ereA</i>	F:5'AACACCCTGAACCCAAGGGACG3' R:5'CTTCACATCCGGATTCCGTCGA3'	420	56	[20]
<i>mphB</i>	F:5'CACACCAGAAGAAGCAAGA3' R:5'CTCATATTCCTCAATTCAGAC3'	420	47	本研究
<i>ISCR1</i>	Orf513-F: 5'ATGGTTTCATGCGGGTT3' Orf513-R 5'CTGAGGGTGTGAGCGAG3'	475	60	[21]
<i>intI1</i>	F:5' CTGGATTTCGATCACGGCAGC 3' R:5' ACATGCGTGTAATCATCGCTCG 3'	473	64	[22]
<i>Tn916/1545</i>	F:5'GACAGTATTAAGCCATCAGAC3' R:5'TCTCCGAACACAATCATCT3'	142	50	本研究

1.4.2 抗性基因的定量检测

采用 SYBR-Green 实时定量 PCR 方法对各基因进行定量分析,检测仪器为 StepOne 型荧光定量 PCR 仪(ABI,美国)。PCR 产物经过克隆测序确认后,使用生工质粒提取试剂盒 SK1131 从阳性克隆子中提取质粒,用作标准曲线。使用 NanoDrop 微量分光光度计(Thermo Scientific,美国)测定质粒浓度。制作标准曲线时按照 10 倍梯度稀释构建好的各质粒,于 90 μL 稀释液中加入 10 μL 质粒,做 4~6 个点,通过预实验选取合适标准品用于制备标准曲线。标准质粒、环境样品、阴性对照均做 3 个平行,取平均值进行计算。

质粒拷贝数换算公式($\text{copies} \cdot \mu\text{L}^{-1}$) = [质粒浓度($\text{ng} \cdot \mu\text{L}^{-1}$) $\times 10^{-9} \times 6.02 \times 10^{23}$] / [克隆产物碱基数 $\times 660(\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$]

载体(pMD 18-T)碱基数 = 2 692 bp,载体

(pGEMX-T Easy)碱基数 = 3 023 bp

荧光定量 PCR 反应体系为:12.5 μL 2 × SYBR, 1.0 μL DNA ($10 \text{ ng} \cdot \mu\text{L}^{-1}$),0.5 μL 引物 F ($10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$),0.5 μL 引物 R ($10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$),10.5 μL 水,总体积 25.0 μL。荧光定量 PCR 反应程序为:① 50℃,2 min,② 95℃,5 min,③ 95℃,20 s,④ 退火,30 s,⑤ 72℃,31 s,⑥ Plate read,重复③~⑤,39 次重复,⑦ Melt-curve 分析:60℃ to 95℃。每隔 0.2℃ 采集一次荧光以生成溶解曲线,根据溶解曲线的变化检测扩增结果的特异性。退火温度和反应时间根据引物不同进行调整。

2 结果与讨论

2.1 水质净化效果

从表 2 可知,进水的 COD 和氨氮浓度较高,经过厌氧池、缺氧池和好氧池之后,逐级下降,二沉池

出水中 COD 和氨氮的浓度分别为 $142.5\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 和 $26.1\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, COD 和氨氮的去除率分别为 90% ~ 94% 和 87% ~ 90%, 基本达到了发酵类制药工业水污染物排放标准(GB 21903-2008)的要求.

图 1 显示了总异养菌和肠球菌在 4 个污水处理单元的去 除效果. 调节池出水中总异养菌浓度 ($\text{CFU}\cdot 100\text{ mL}^{-1}$) 介于 $8.2\sim 8.4\text{ logs}$, 肠球菌浓度 ($\text{CFU}\cdot 100\text{ mL}^{-1}$) 介于 $5.3\sim 5.6\text{ logs}$, 这表明春季和

秋季进水中都有着丰富的异养菌和肠球菌.

以往的研究表明, 污水处理过程中可以去 除 0 ~ 5 个数量级的总异养菌和肠球菌^[17]. 本研 究表明, 经过厌氧池、缺氧池、好氧池处理阶段后, 总异养菌和肠球菌都大幅度地被去除, 二沉池出 水中总异养菌和肠球菌的浓度分别降低了 1.6 ~ 2.1 logs 和 3.7 logs, 有效降低了细菌抗性的传播 风险.

表 2 抗生素制药废水处理过程的常规化学指标¹⁾/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$

Table 2 Chemical characteristics of wastewater treatment process of antibiotic production/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$

样品编号	COD	NH_4^+-N	NO_2^-	NO_3^-	PO_4^{3-}
A1	2 280	223.52	ND	42.83	ND
A2	525	217.55	ND	21.92	ND
A3	1 300	196.04	0.02	23.64	ND
A4	135	23.35	0.02	66.07	ND
S1	1 480	218.61	ND	49.42	1.86
S2	950	165.12	0.02	32.43	1.56
S3	850	146.80	0.03	37.42	0.24
S4	150	28.63	1.64	68.08	0.05




图 1 抗生素制药废水处理过程中总异养菌和肠球菌的丰度分布

Fig. 1 Amount of enterococci and cultivable bacteria during wastewater treatment process of antibiotic production

2.2 肠球菌的耐药率

从春季和秋季采集的 4 个污水生物处理单元的 出水中分离出了 94 株肠球菌, 它们对 4 种大环内酯 类抗生素的耐药率变化情况如表 3 所示, 所有的肠 球菌对阿奇霉素、克拉霉素、红霉素和螺旋霉素都 具有抗性. 然而经过污水处理之后, 肠球菌的耐药 率不仅没有得到削减, 而且在春季和秋季没有显著 差异, 这说明肠球菌的耐药率与季节并没有直接的 相关性. Ma 等^[23]认为污水生物处理能有效削减微 生物量包括病原菌, 但却不能有效削减一些携带抗 性基因和整合子的细菌. 本研究结果表明, 螺旋霉 素生产废水生物处理能有效地削减总异养菌和肠球 菌的数量, 但却不能削减耐药菌的比例.

2.3 抗性基因的分布和转归特征

2.3.1 肠球菌携带抗性基因的检出率

从 4 个污水生物处理单元出水中分离出来的

表 3 肠球菌的耐药率

Table 3 Antibiotic resistance rates of *Enterococci* in this study

样品	分离株数	肠球菌的耐药率/%			
		AZI	CLR	ERY	SP
调节池出水	25	100	100	100	100
厌氧池出水	23	100	100	100	100
缺氧池出水	26	100	100	100	100
二沉池出水	20	100	100	100	100

94 株肠球菌均对大环内酯类抗生素螺旋霉素、阿 奇霉素、克拉霉素、红霉素具有抗性. 通过检测这 94 株肠球菌抗性菌所携带的 MLS 抗性基因 *ermB*、

mefA 和转移元件 *intI1*, 结果显示(见表 4), 有 75 株 肠球菌对 *ermB* 抗性基因呈阳性, 但全部 94 株肠球 菌对 *mefA* 和 *intI1* 都呈阴性. 已有研究报道 *ermB* 抗

性基因的检出率高于 MLS 抗性基因的检出率^[24]. 虽然 Luna 等^[25]分离出的肠球菌携带抗性基因 *mef*, 但是 Portillo 等^[26]分离的肠球菌却没有检测到抗性基因 *mef*, 这与本研究的结果一致, 他认为不同环境中抗性基因 *mef* 的分布特征不同. 春季分离出的 30 株肠球菌中有 73% 携带抗性基因, 而秋季分离出的 64 株肠球菌中有 79% 携带 *ermB* 抗性基因, 这说明气温对肠球菌携带抗性基因没有显著的影响.

在 4 个污水处理单元中 *ermB* 的检出率分别为 84%、73%、76%、75%. *ermB* 抗性基因在厌氧池有一定的去除效果, 但在缺氧池开始出现了反弹. 总体来说, 经过污水处理, 肠球菌中抗性基因 *ermB* 的检出率下降了 9%. *ermB* 抗性基因常常与一些质粒、转座子等转移元件相关联^[24], 在缺氧池中出现反弹的原因很可能与转座子、质粒的相关联有关, 然而环境中的生物千变万化, 也可能与微生物量的变化有着紧密的联系, 具体原因有待进一步研究.

表 4 肠球菌携带抗性基因的检测结果¹⁾

Table 4 Detection of antibiotic resistance genes in <i>Enterococci</i>			
污水处理阶段	<i>ermB</i>	<i>mefA</i>	<i>intI1</i>
调节池 (<i>n</i> = 25)	+(<i>n</i> = 21)	-	-
厌氧池 (<i>n</i> = 23)	+(<i>n</i> = 17)	-	-
缺氧池 (<i>n</i> = 26)	+(<i>n</i> = 20)	-	-
二沉池 (<i>n</i> = 20)	+(<i>n</i> = 15)	-	-

1) “+”表示阳性, “-”表示阴性

2.3.2 抗性基因的分布和转归特征

利用荧光定量 PCR 的方法检测了大环内酯类抗性基因 *ermB*、*ermF*、*ermX*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *ISCR1*、*intI1*、*Tn916/1545* 在 4 个污水处理单元中不同季节的分布特征和变化情况 (图 2). 从图 2(a) 中可知, 春季进水中抗性基因和转移元件的浓度范围为 $4.53 \times 10^5 \sim 3.39 \times 10^7$ copies·mL⁻¹, 二沉池出水中抗性基因的浓度范围为 $0 \sim 7.53 \times 10^6$ copies·mL⁻¹, 污水处理对抗性基因 *ermB*、*ermF*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *Tn916/1545* 都有一定的去除效果, 削减范围为 0.4 ~ 6 logs, 抗性基因和转移元件的削减效果依次为 *mefA* > *Tn916/1545* > *mphB* > *ereA* > *ermF* > *ermB*, 其中 *mefA* 在二沉池出水中未检出, 去除了 6 logs, 去除效果最好; 而 *ermX*、*intI1*、*ISCR1* 不但没有被去除, 反而出现了反弹. 如图 2(b) 中所示, 秋季进水中抗性基因和转移元件的含量范围为 $4.17 \times 10^4 \sim 2.95 \times 10^7$ copies·mL⁻¹, 二沉池出水中抗性基因和转移元件的含量范围为 $1.86 \times 10^3 \sim 8.19 \times 10^6$ copies·mL⁻¹, 抗性基因 *ermB*、*ermF*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *Tn916/1545* 有一定的去除效果, 出水中下降了 0.55 ~ 2.1 logs, 其中 *mefA* 去除效果较好, 下降了 2.1 logs, 而 *ermX*、*intI1*、*ISCR1* 出现了反弹.




图 2 抗生素制药废水处理过程中抗性基因和转移元件的变化

Fig. 2 Changes of resistance genes and transfer elements during wastewater treatment of antibiotic production

从上述结果可知,春季和秋季中 *ermB* 和 *ermF* 抗性基因的浓度均为最高. 已有研究证实了 *erm-TR* 抗性基因的检出率最高,是最广泛存在的大环内酯类抗性基因^[13]. *ermB* 和 *ermF* 的丰度高,一个原因是宿主广泛,已报道的研究中表明宿主覆盖了革兰氏阳性菌(G^+)和革兰氏阴性菌(G^-)、好氧菌和厌氧菌,另一个原因是这些基因常常与水平转移因子有关,比如可连接的转座子和质粒. 抗性基因 *mefA* 为外排泵基因,在春季和秋季样品中的去除效果均是最好的. 但是广泛的宿主和潜在的水平转移能力与该基因在系统中的低浓度似乎有些矛盾. 可能解释的原因是由于 G^- 菌存在外膜,螺旋霉素不能进入 G^- 菌细胞, G^- 细菌具有固有抗性,因此不需要外排泵作用^[27]. 根据水质情况分析,春季中进水的 COD 明显比秋季进水高,已有研究表明有机物浓度的增加利于耐药菌和抗性基因的传播扩散. 本研究中春季样品中抗性基因丰富的原因很可能与高浓度的有机污染物存在有关^[28].

将各抗性基因归一化到 16S rRNA,考察抗性基

因在污水处理过程中的相对丰度变化,可以了解抗性基因在总 DNA 中的相对表达量,结果见图 3. 如图 3(a) 所示春季样品在污水处理过程中抗性基因 *ermF*、*mefA*、*ereA*、*mphB* 和转移元件 *Tn916/1545* 的丰度分别降低了 25.24%、100%、65.14%、93.31% 和 97.90%,而抗性基因 *ermB*、*ermX* 和转移元件 *int11*、*ISCR1* 的丰度均不同程度上升了. 如图 3(b) 所示,秋季样品在污水处理过程中抗性基因 *ermB*、*mefA*、*ereA* 和转移元件 *Tn916/1545* 的丰度降低了 82.73%、93.31%、3.97% 和 92.25%,而抗性基因 *ermF*、*mphB*、*ermX* 和转移元件 *int11*、*ISCR1* 的丰度均不同程度上升了.

污水处理过程中只可以去除部分抗性基因和转移元件,但同时也使部分抗性基因发生了传播. *mefA*、*ereA*、*Tn916/1545* 的丰度在春季和秋季样品中有显著的差异,这些抗性基因和转移元件在春季样品中的去除效果明显好于秋季. 目前,抗性基因在何种环境和条件下会水平转移,在何种情况下会削减尚无一致定论,还有待今后更深入地研究.




图 3 各污水样品中 MLS 抗性基因和转移因子的相对丰度

Fig. 3 Relative abundance of MLS resistance genes and mobile elements in wastewater samples

3 结论

(1)螺旋霉素制药废水生物处理(厌氧-缺氧-好

氧)能有效削减总异养菌和病原菌肠球菌的数量,总异养菌和肠球菌的浓度分别降低了 1.6~2.1 logs 和 3.7 logs.

(2)分离出来的 94 株肠球菌均对大环内酯类抗生素螺旋霉素、阿奇霉素、克拉霉素、红霉素具有抗性。虽然污水处理对肠球菌的耐药率没有削减作用,但经过污水处理后肠球菌中 *ermB* 的检出率下降了 9%。

(3)抗生素制药废水生物处理对抗性基因 *ermB*、*ermF*、*mefA*、*ereA* 和转移元件 *Tn916/1545* 的含量有一定的削减作用,但抗性基因 *ermX* 和 *int1*、*ISCR1* 的含量反而发生了一定程度的反弹。

(4)抗生素制药废水生物处理过程中 *mefA*、*ereA*、*Tn916/1545* 的丰度降低了,且春季 *mefA*、*ereA*、*Tn916/1545* 的去除效果明显好于秋季,而 *ermX* 和转移元件 *int1*、*ISCR1* 的丰度分别增加了。

参考文献:

- [1] 佟娟,魏源送. 污水处理厂削减耐药菌与抗性基因的研究进展[J]. 环境科学学报, 2012, **32**(11): 2650-2659.
- [2] Zhang T, Zhang X X, Ye L. Plasmid metagenome reveals high levels of antibiotic resistance genes and mobile genetic elements in activated sludge[J]. PLoS ONE, 2011, **6**(10): e26041.
- [3] Thiele-Bruhn S, Beck I C. Effects of sulfonamide and tetracycline antibiotics on soil microbial activity and microbial biomass[J]. Chemosphere, 2005, **59**(4): 457-465.
- [4] Borg M A, Zarb P, Scicluna E A, et al. Antibiotic consumption as a driver for resistance in *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* within a developing region[J]. American Journal of Infection Control, 2010, **38**(3): 212-216.
- [5] Shryock T R, Richwine A. The interface between veterinary and human antibiotic use[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, **1213**: 92-105.
- [6] Pruden A, Pei R T, Storteboom H, et al. Antibiotic resistance genes as emerging contaminants: Studies in northern Colorado [J]. Environmental Science & Technology, 2006, **40**(23): 7445-7450.
- [7] Kemper N. Veterinary antibiotics in the aquatic and terrestrial environment[J]. Ecological Indicators, 2008, **8**(1): 1-13.
- [8] Kümmeler K. Antibiotics in the aquatic environment-A review-Part II [J]. Chemosphere, 2009, **75**(4): 435-441.
- [9] Gonzalez J J, Andreu A, the Spanish Group for the Study of Perinatal Infection from the Spanish Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Multicenter study of the mechanisms of resistance and clonal relationships of *Streptococcus agalactiae* isolates resistant to macrolides, lincosamides, and ketolides in Spain[J]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, **49**(6): 2525-2527.
- [10] Brisson-Noël A, Arthur M, Courvalin P. Evidence for natural gene transfer from gram-positive cocci to *Escherichia coli* [J]. Journal of Bacteriology, 1988, **170**(4): 1739-1745.
- [11] Gupta A, Vlamakis H, Shoemaker N, et al. A new bacteroides conjugative transposon that carries an *ermB* gene[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, **69**(11): 6455-6463.
- [12] Jiang H Y, Zhang D D, Xiao S C, et al. Occurrence and sources of antibiotics and their metabolites in river water, WWTPs, and swine wastewater in Jiulongjiang River basin, south China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2013, **20**(12): 9075-9083.
- [13] Koike S, Aminov R I, Yannarell A C, et al. Molecular ecology of macrolide-lincosamide-streptogramin B methylases in waste lagoons and subsurface waters associated with swine production [J]. Microbial Ecology, 2010, **59**(3): 487-498.
- [14] Hraoui M, Boubaker I B B, Rachdi M, et al. Macrolide and tetracycline resistance in clinical strains of *Streptococcus agalactiae* isolated in Tunisia [J]. Journal of Medical Microbiology, 2012, **61**(8): 1109-1113.
- [15] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M]. (第四版). 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
- [16] Munir M, Wong K, Xagoraki I. Release of antibiotic resistant bacteria and genes in the effluent and biosolids of five wastewater utilities in Michigan[J]. Water Research, 2011, **45**(2): 681-693.
- [17] da Silva M F, Tiago I, Verissimo A, et al. Antibiotic resistance of enterococci and related bacteria in an urban wastewater treatment plant[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2006, **55**(2): 322-329.
- [18] Clinical and laboratory standards institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-second informational supplement, M100-S22[Z]. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2012.
- [19] Chen J, Yu Z T, Michel F C Jr, et al. Development and application of real-time PCR assays for quantification of *erm* genes conferring resistance to macrolides-lincosamides-streptogramin B in livestock manure and manure management systems [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2007, **73**(14): 4407-4416.
- [20] Sutcliffe J, Grebe T, Tait-Kamradt A, et al. Detection of erythromycin-resistant determinants by PCR [J]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1996, **40**(11): 2562-2566.
- [21] Quiroga M P, Andres P, Petroni A, et al. Complex class 1 integrons with diverse variable regions, including *aac(6')-Ib-cr*, and a novel allele, *qnrB10*, associated with *ISCR1* in clinical enterobacterial isolates from Argentina[J]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2007, **51**(12): 4466-4470.
- [22] Stokes H W, Nesbø C L, Holley M, et al. Class 1 integrons potentially predating the association with Tn402-like transposition genes are present in a sediment microbial community[J]. Journal of Bacteriology, 2006, **188**(16): 5722-5730.
- [23] Ma L P, Zhang X X, Cheng S P, et al. Occurrence, abundance and elimination of class 1 integrons in one municipal sewage treatment plant[J]. Ecotoxicology, 2011, **20**(5): 968-973.
- [24] Thumu S C R, Halami P M. Acquired resistance to macrolide-lincosamide-streptogramin antibiotics in lactic acid bacteria of food origin[J]. Indian Journal of Microbiology, 2012, **52**(4): 446-451.

- 530-537.
- [25] Luna V A, Coates P, Eady E A, *et al.* A variety of gram-positive bacteria carry mobile *mef* genes [J]. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 1999, **44**(1): 19-25.
- [26] Portillo A, Ruiz-Larrea F, Zarazaga M, *et al.* Macrolide resistance genes in *Enterococcus* spp. [J]. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 2000, **44**(4): 967-971.
- [27] Higgins C F. Multiple molecular mechanisms for multidrug resistance transporters [J]. *Nature*, 2007, **446** (7137): 749-757.
- [28] Kim S, Jensen J N, Aga D S, *et al.* Fate of tetracycline resistant bacteria as a function of activated sludge process organic loading and growth rate[J]. *Water Science & Technology*, 2007, **55**(1-2): 291-297.

关于反对个别作者一稿两投行为的联合声明

为保证所发表论文的首创性和学术严谨性,《环境科学》、《中国环境科学》、《环境科学学报》编辑部和《Journal of Environmental Sciences》编辑部特发表如下联合声明。

我们明确反对个别作者的一稿两投或变相一稿两投行为。自即日起,我们各刊在接受作者投稿时,要求论文全体作者就所投稿件作出以下承诺(附在投稿上):

1) 来稿所报道的研究成果均系全体作者的原创性研究成果,文中报道的研究成果(含图、表中数据的全部或部分)未曾发表亦未曾投其它科技期刊。

2) 在接到所投期刊编辑部关于稿件处理结果之前,所投稿件的全部或部分内容不再投其它科技期刊。

我们将认真对待作者所作的上述承诺,并建立信息共享机制,对违背上述承诺的作者(包括在文中署名的全体作者)采取联合行动。

净化学术环境、促进学术繁荣是学术期刊作者和编者的共同责任。我们诚恳地希望广大作者能够了解我们的上述立场和做法,并积极宣传和配合。

《环境科学》编辑部

《中国环境科学》编辑部

《环境科学学报》编辑部

《Journal of Environmental Sciences》编辑部

CONTENTS

Estimation of PM _{2.5} Concentration over the Yangtze Delta Using Remote Sensing: Analysis of Spatial and Temporal Variations	XU Jian-hui, JIANG Hong (3119)
Seasonal and Spatial Variations of Carbon Fractions in PM _{2.5} in Ningbo and the Estimation of Secondary Organic Carbon	DU Bo-han, HUANG Xiao-feng, HE Ling-yan, <i>et al.</i> (3128)
Concentrations of Acidic Gases, Ammonia and Related Water-Soluble Ions in PM _{2.5} and Gas-Particle Partitioning in Qingdao	ZHOU Jia-jia, SHI Jin-hui, LI Li-ping, <i>et al.</i> (3135)
Concentration and Particle Size Distribution of Microbiological Aerosol During Haze Days in Beijing	HU Ling-fei, ZHANG Ke, WANG Hong-bao, <i>et al.</i> (3144)
Air Quality Characteristics in Beijing During Spring Festival in 2015	CHENG Nian-liang, CHEN Tian, ZHANG Da-wei, <i>et al.</i> (3150)
Chemical Loss of Volatile Organic Compounds and Its Impact on the Formation of Ozone in Shanghai	WANG Hong-li (3159)
Removal of Waste Gas Containing Mixed Chlorinated Hydrocarbons by the Biotrickling Filter	CHEN Dong-zhi, MIAO Xiao-ping, OUYANG Du-juan, <i>et al.</i> (3168)
A Three Band Chlorophyll-a Concentration Estimation Model Based on GOCI Imagery	GUO Yu-long, LI Yun-mei, LI Yuan, <i>et al.</i> (3175)
Temporal and Spatial Distribution Characteristics of Dissolved Organic Matter and Influencing Factors in Lake Chaohu	YE Lin-lin, WU Xiao-dong, LIU Bo, <i>et al.</i> (3186)
Spectral Characteristic of Dissolved Organic Matter in Xiaohe River, Hebei	YU Min-da, ZHANG Hui, HE Xiao-song, <i>et al.</i> (3194)
Spatial Variation of Ammonia-N, Nitrate-N and Nitrite-N in Groundwater of Dongshan Island	WU Hai-yan, FU Shi-feng, CAI Xiao-qiong, <i>et al.</i> (3203)
Sources, Migration and Conversion of Dissolved Alkanes, Dissolved Fatty Acids in a Karst Underground River Water, in Chongqing Area	LIANG Zuo-bing, SUN Yu-chuan, WANG Zun-bo, <i>et al.</i> (3212)
Influence of Sulfuric Acid to Karst Hydrochemical and $\delta^{13}\text{C}_{\text{DIC}}$ in the Upper and Middle Reaches of the Wujiang River	HUANG Qi-bo, QIN Xiao-qun, LIU Peng-yu, <i>et al.</i> (3220)
Hydrochemical Characteristic and Reasoning Analysis in Siyi Town, Langzhong City	ZHANG Yan, WU Yong, YANG Jun, <i>et al.</i> (3230)
Seasonal Variation on Nutrient Limitation for Phytoplankton Growth in a Coastal River-Reservoir System, Southeast China	CHEN Cong-cong, RAO La, HUANG Jin-liang, <i>et al.</i> (3238)
Physiological Effect of <i>Vallisneria natans</i> Under Different Concentrations of Nitrogen, Phosphorus and Chloramphenicol	HU Zhen-zhen, CUI Yi-bin, LI Mei, <i>et al.</i> (3248)
Effects of Algicidal Substance on <i>Phaeocystis globosa</i> and Its Fatty Acids by the Simulation Experiment	YANG Qiu-chan, ZHAO Ling, YIN Ping-he, <i>et al.</i> (3255)
Agricultural Non-Point Source Pollutants Removal by Enhanced Riverbank Interception Facilities Under Different Operating Conditions	LI Huai-zheng, CHEN Ke-li, WEI Zhong, <i>et al.</i> (3262)
Speciation Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Typical Material Roof Dusts	LI Dun-zhu, GUAN Yun-tao, LIU An, <i>et al.</i> (3269)
Formation of Disinfection By-Products During Chlor(am)ination of Danjiangkou Reservoir Water and Comparison of Disinfection Processes	ZHANG Min-sheng, XU Bin, ZHANG Tian-yang, <i>et al.</i> (3278)
Effects of Interaction of Ozonation and Coagulation on Coagulation Results	LIU Hai-long, GUO Xue-feng, WANG Min-hui, <i>et al.</i> (3285)
Effects of Anions on Bromate Formation During Ozonation of Bromide-Containing Water	WU Yue, WU Chun-de, LIU Li-gang, <i>et al.</i> (3292)
XAS Analysis upon Dissolved Species of Orpiment in Anoxic Environment	WANG Ying, XU Li-ying, WANG Shao-feng, <i>et al.</i> (3298)
AOX Pollution in Wastewater Treatment Process of Dyeing and Dyestuff Chemical Industries	SHEN Yang-yang, LIU Rui, XU Can-can, <i>et al.</i> (3304)
Fate of ARB and ARGs During Wastewater Treatment Process of Spiramycin Production	QIN Cai-xia, TONG Juan, SHEN Pei-hong, <i>et al.</i> (3311)
A Comparative Study on Two Membrane Bioreactors for the Treatment of Digested Piggery Wastewater	SHUI Yong, Kawagishi Tomoki, SONG Xiao-yan, <i>et al.</i> (3319)
Analysis of Microbial Community in the Membrane Bio-Reactor (MBR) Rural Sewage Treatment System	KONG Xiao, CUI Bing-jian, JIN De-cai, <i>et al.</i> (3329)
Start-up Characteristics of Four-zone Integrated Reactor for Nitrogen Removal in Winter and Analysis of Nitrobacteria Community	ZHANG Yan, SUN Feng-xia, XIE Hang-ji, <i>et al.</i> (3339)
Achievement of Sulfate-Reducing Anaerobic Ammonium Oxidation Reactor Started with Nitrate-Reducing Anaerobic Ammonium Oxidation	LIU Zheng-chuan, YUAN Lin-jiang, ZHOU Guo-biao, <i>et al.</i> (3345)
Effect of Increasing Organic Loading Rate on the Formation and Stabilization Process of Aerobic Granular Sludge	LIU Xiao-peng, WANG Jian-fang, QIAN Fei-yue, <i>et al.</i> (3352)
Nitrogen Loss Through Different Ways in Cropland Under Conventional Fertilization: An <i>In-situ</i> Study of Summer Maize Season in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River	SANG Meng-meng, FAN Hui, JIANG Shan-shan, <i>et al.</i> (3358)
Effects of Water and Nitrogenous Fertilizer Coupling on CH ₄ and N ₂ O Emission from Double-Season Rice Paddy Field	FU Zhi-qiang, LONG Pan, LIU Yi-yi, <i>et al.</i> (3365)
Characteristics of N ₂ , N ₂ O, NO, CO ₂ and CH ₄ Emissions in Anaerobic Condition from Sandy Loam Paddy Soil	CAO Na, WANG Rui, LIAO Ting-ting, <i>et al.</i> (3373)
Characteristics of Soil Respiration along Eroded Sloping Land with Different SOC Background on the Hilly Loess Plateau	CHEN Gai, XU Ming-xiang, ZHANG Ya-feng, <i>et al.</i> (3383)
Effect of Biochar on Soil Greenhouse Gas Emissions in Semi-arid Region	GUO Yan-liang, WANG Dan-dan, ZHENG Ji-yong, <i>et al.</i> (3393)
Characteristics and Coupling Relationship of Soil Carbon and Nitrogen Transformation During <i>In-situ</i> Mineralization Cultivation in Forestlands in the Mountain Area of Southern Ningxia	NI Yin-xia, HUANG Yi-mei, NIU Dan, <i>et al.</i> (3401)
Nitrogen Fraction Distributions and Impacts on Soil Nitrogen Mineralization in Different Vegetation Restorations of Karst Rocky Desertification	HU Ning, MA Zhi-min, LAN Jia-cheng, <i>et al.</i> (3411)
Distribution and Dynamics of Cropland Soil Organic Carbon in Jiangnan Plain: A Case Study of Qianjiang City	WANG Yu-zhu, XIAO He-ai, ZHOU Ping, <i>et al.</i> (3422)
Impact of Land Utilization Pattern on Distributing Characters of Labile Organic Carbon in Soil Aggregates in Jinyun Mountain	LI Rui, JIANG Chang-sheng, HAO Qing-ju (3429)
Magnetic Responses of Heavy Metals in Street Dust of Typical Mine-Based City, Northwest China	NIE Yan, WANG Xin, WANG Bo, <i>et al.</i> (3438)
Distribution Characteristics of Heavy Metals in Environmental Samples Around Electroplating Factories and the Health Risk Assessment	GUO Peng-ran, LEI Yong-qian, ZHOU Qiao-li, <i>et al.</i> (3447)
Homologues Levels and Distribution Pattern of Polychlorinated Biphenyls in Typical Capacitor Contaminated Soil	LIU Jie, LI Xiao-dong, ZHAO Zhong-hua, <i>et al.</i> (3457)
Adsorption and Desorption Characteristics of Endosulfan in Purple Soil	ZHAO Yan, ZHENG Guo-can, ZHU Heng, <i>et al.</i> (3464)
Influence of <i>Mirabilis jalapa</i> Linn. Growth on the Microbial Community and Petroleum Hydrocarbon Degradation in Petroleum Contaminated Saline-alkali Soil	JIAO Hai-hua, CUI Bing-jian, WU Shang-hua, <i>et al.</i> (3471)
Al ³⁺ Absorption and Assimilation by Four Ectomycorrhizal Fungi	WANG Ming-xia, YUAN Ling, HUANG Jian-guo, <i>et al.</i> (3479)
Contamination of Organophosphorus Pesticides Residue in Fresh Vegetables and Related Health Risk Assessment in Changchun, China	YU Rui, LIU Jing-shuang, WANG Qi-cun, <i>et al.</i> (3486)
Community Structure and Succession of Methanogens in Beishenshu Landfill, Beijing	SONG Li-na, WANG Lei, XIA Meng-jing, <i>et al.</i> (3493)
Fertility and Environmental Impacts of Urban Scattered Human Feces Used as Organic Granular Fertilizer for Leaf Vegetables	LÜ Wen-zhou, QIAO Yu-xiang, YU Ning, <i>et al.</i> (3501)
Degradation of PCDD/Fs by the Mixture of V ₂ O ₅ -WO ₃ /TiO ₂ Catalyst and Activated Carbon	REN Yong, JI Sha-sha, YU Ming-feng, <i>et al.</i> (3508)
Energy Conservation and Emissions Reduction Benefits Analysis for Battery Electric Buses Based on Travel Services	LIN Xiao-dan, TIAN Liang, LÜ Bin, <i>et al.</i> (3515)
Definition and Control Indicators of Volatile Organic Compounds in China	JIANG Mei, ZOU Lan, LI Xiao-qian, <i>et al.</i> (3522)
Influence of Dissimilatory Iron Reduction on the Speciation and Bioavailability of Heavy Metals in Soil	SI You-bin, WANG Juan (3533)

《环境科学》第6届编辑委员会

主 编: 欧阳自远

副主编: 赵景柱 郝吉明 田 刚

编 委: (按姓氏笔画排序)

万国江 王华聪 王凯军 王绪绪 田 刚 田 静 史培军
朱永官 刘志培 刘 毅 汤鸿霄 孟 伟 周宗灿 林金明
欧阳自远 赵景柱 姜 林 郝郑平 郝吉明 聂永丰 黄 霞
黄 耀 鲍 强 潘 纲 潘 涛 魏复盛

环 境 科 学

(HUANJING KEXUE)

(月刊 1976年8月创刊)

2015年9月15日 第36卷 第9期

ENVIRONMENTAL SCIENCE

(Monthly Started in 1976)

Vol. 36 No. 9 Sep. 15, 2015

主 管	中国科学院	Superintended	by	Chinese Academy of Sciences
主 办	中国科学院生态环境研究中心	Sponsored	by	Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences
协 办	(以参加先后为序) 北京市环境保护科学研究院 清华大学环境学院	Co-Sponsored	by	Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection School of Environment, Tsinghua University
主 编	欧阳自远	Editor-in -Chief		OUYANG Zi-yuan
编 辑	《环境科学》编辑委员会 北京市2871信箱(海淀区双清路 18号, 邮政编码:100085) 电话:010-62941102, 010-62849343 传真:010-62849343 E-mail: hjkx@ rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn	Edited	by	The Editorial Board of Environmental Science (HUANJING KEXUE) P. O. Box 2871, Beijing 100085, China Tel:010-62941102, 010-62849343; Fax:010-62849343 E-mail: hjkx@ rcees. ac. cn http://www. hjkx. ac. cn
出 版	科 学 出 版 社 北京东黄城根北街16号 邮政编码:100717	Published	by	Science Press 16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, China
印 刷 装 订	北京北林印刷厂	Printed	by	Beijing Bei Lin Printing House
发 行	科 学 出 版 社 电话:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com	Distributed	by	Science Press Tel:010-64017032 E-mail: journal@ mail. sciencep. com
订 购 处	全国各地邮电局	Domestic		All Local Post Offices in China
国外总发行	中国国际图书贸易总公司 (北京399信箱)	Foreign		China International Book Trading Corporation (Guoji Shudian), P. O. Box 399, Beijing 100044, China

中国标准刊号: ISSN 0250-3301
CN 11-1895/X

国内邮发代号: 2-821

国内定价: 120.00元

国外发行代号: M 205

国内外公开发行