

环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第39卷 第3期

Vol.39 No.3

2018

中国科学院生态环境研究中心 主办
科学出版社 出版



目次

长三角典型站点冬季大气 $PM_{2.5}$ 中 OC、EC 污染特征	康晖, 朱彬, 王红磊, 施双双 (961)
南京北郊能见度变化中二次无机盐消光的重要作用	于超, 于兴娜, 赵天良, 张蕾, 马国煦, 王咏薇 (972)
常州夏冬季 $PM_{2.5}$ 中无机组分昼夜变化特征与来源解析	刘佳澍, 顾远, 马帅帅, 苏亚兰, 叶招莲 (980)
天津市春季道路降尘 $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 中的元素特征	王士宝, 姬亚芹, 李树立, 张伟, 张蕾 (990)
北京、新乡夏季大气颗粒物中重金属的粒径分布及人体健康风险评价	张鑫, 赵小曼, 孟雪洁, 王小颖, 杨帅, 许晓鹏, 王书亭, 谷超, 王梦蕾, 任浩, 张子洋, 闫广轩, 曹治国, 王跃思 (997)
山西省武乡县城大气 $PM_{2.5}$ 痕量重金属的生态和健康风险分析	郭墨霞, 耿红, 张晋宏, 周欢, 彭妍, 翟帅莹, 李金磊, 陈雨杉 (1004)
隧道中机动车排放颗粒物及无机元素特征	李凤华, 张衍杰, 张静, 袁远, 吴琳, 毛洪钧 (1014)
河南省 2013 年大气氨排放清单建立及分布特征	王琛, 尹沙沙, 于世杰, 卫军华, 谷幸珂, 官密秘, 张瑞芹 (1023)
城市道路行道树池裸地扬尘排放特征	李贝贝, 秦建平, 祁丽荣, 杨涛, 曲松, 石爱军, 黄玉虎 (1031)
DOC 和 CDPF 对柴油公交车颗粒物组分影响	楼狄明, 耿小雨, 宋博, 谭丕强, 胡志远, 刘继跃 (1040)
南水北调中线工程总干渠河南段原水中消毒副产物前体物变化规律	黄飘逸, 徐斌, 郭东良 (1046)
广州市流溪河水体中 6 种内分泌干扰素时空分布特征与环境风险	樊静静, 王赛, 唐金鹏, 戴玉女, 王林, 龙胜兴, 何文祥, 刘帅磊, 王佳希, 杨扬 (1053)
西藏拉萨河流域河水主要离子化学特征及来源	张清华, 孙平安, 何师意, 文化, 刘明隆, 于爽 (1065)
太子河下游河流硝酸盐来源及其迁移转化过程	李艳利, 杨梓睿, 尹希杰, 孙伟 (1076)
海南岛北部海湾沉积物重金属来源、分布主控因素及生态风险评价	曾维特, 杨永鹏, 张东强, 刘兵, 张航飞, 吴多誉, 王晓林 (1085)
天津农田重金属污染特征分析及降雨沥浸影响	许萌萌, 刘爱凤, 师荣光, 蓝靖, 田永, 赵宗山 (1095)
太湖出入湖河道与湖体水质季节差异分析	查慧铭, 朱梦圆, 朱广伟, 杨周生, 许海, 沈睿杰, 钟春妮 (1102)
春季敏感时期三峡水库典型支流沉积物-水界面氮释放特性	李欣, 宋林旭, 纪道斌, 刘德富, 苏青青, 吕林鹏, 王雄, 黄亚男, 吴庆 (1113)
不同湖泊入湖河流沉积物可转化态氮的空间分布及其影响因素	周睿, 袁旭音, Marip Ja Bawk, 于辉辉, 章琪, 唐豆豆 (1122)
水文气象因素对东南山区水库硅藻异常增殖的影响	孙祥, 朱广伟, 笄文怡, 余茂蕾, 杨文斌, 朱梦圆, 许海, 国超旋, 余丽 (1129)
深水型水库热分层诱导水质及真菌种群结构垂向演替	商潘路, 陈胜男, 黄廷林, 张海涵, 康鹏亮, 王跃, 钊珍芳, 刘彤彤 (1141)
太湖竺山湾春季浮游细菌群落结构及影响因素	薛银刚, 刘菲, 孙萌, 江晓栋, 耿金菊, 滕加泉, 谢文理, 张皓, 陈心一 (1151)
分层型水源水库沉积物需氧量特性	苏露, 黄廷林, 李楠, 张海涵, 文刚, 李扬, 陈家炜, 王晓江 (1159)
污水氮浓度和 NH_4^+ / NO_3^- 比对粉绿狐尾藻去氮能力和植物体氮组分的影响	马永飞, 杨小珍, 赵小虎, 胡承孝, 谭启玲, 孙学成, 吴金水 (1167)
水体氮磷营养负荷对苦草净化能力和光合荧光特性的影响	周裔文, 许晓光, 韩睿明, 周晓红, 冯德友, 李致春, 王国祥 (1180)
化学预氧化耦合生物锰氧化对水中有机物的去除	菅之奥, 常洋洋, 王立新, 梁金松, 柏耀辉 (1188)
铜铁氧体法处理模拟染料废水	韩志勇, 韩昆, 郝昊天, 于建伟, 石宝友, 庄媛, 孔岩 (1195)
草酸根对 α -FeOOH 多相 UV-Fenton 催化能力的增效实验	苗笑增, 戴慧旺, 陈建新, 蒋柏泉, 龚炯 (1202)
生物质基纳米 HZO 杂化材料的研制及其除磷特性	邱慧, 秦智峰, 刘凤玲, 梁晨, 宋明霞, 许正文, 管益东 (1212)
铁锰氧化物/生物炭复合材料对水中硝酸根的吸附特性	郑晓青, 韦安磊, 张一璇, 史良干, 张潇 (1220)
PAAm/HACC 半互穿网络水凝胶的制备及其对水中腐殖酸的吸附性能	刘泽琨, 周少奇, 马福臻 (1233)
二氧化钛对地下水砷的吸附及再生回用	马文静, 阎莉, 张建锋 (1241)
一体式絮体-超滤工艺去除腐殖酸效能与机制	李文江, 于莉芳, 苗瑞, 马百文 (1248)
中国城镇污水处理厂温室气体排放时空分布特征	闫旭, 邱德志, 郭东丽, 齐星昊, 郑仕侃, 程轲, 孙剑辉, 刘建伟 (1256)
硝化耦合 CANON 的铁锰氮生物净化工艺启动与运行	李冬, 曹瑞华, 杨航, 王艳菊, 吕赛赛, 张杰 (1264)
纤维载体的生物膜 CANON 反应器的启动特性	顾澄伟, 陈方敏, 李祥, 黄勇, 尤星怡, 金润, 张文静, 董石语 (1272)
$DO/NH_4^+ - N$ 实现短程硝化过程中生物膜特性	赵青, 卞伟, 李军, 王文啸, 孙艺齐, 梁东博, 张舒燕 (1278)
AUSB 中置曝气对 CANON 颗粒污泥工艺的影响	成朔, 李冬, 张杰, 李帅, 曹瑞华, 吕赛赛 (1286)
有机碳源对启动及运行 CANON 颗粒污泥工艺的影响	李冬, 王艳菊, 吕育锋, 曹瑞华, 李帅, 张杰 (1294)
中试一体式部分亚硝化-厌氧氨氧化反应器的启动与区域特性	周正, 王凡, 林兴, 董石语, 朱强, 李祥, 黄勇 (1301)
硝化液回流比对 ABR-MBR 工艺反硝化除磷效能的影响	吕亮, 尤雯, 张敏, 吴鹏, 沈耀良 (1309)
磁性纳米铁对厌氧颗粒污泥特性及其微生物群落的影响	宿程远, 郑鹏, 卢宇翔, 袁秋红, 赵力剑, 廖黎明, 黄智 (1316)
好氧颗粒污泥系统中溶解性微生物代谢产物的特征及主要组分	杨丹, 刘东方, 杜丽琼, 黄文力 (1325)
环丙沙星对膜生物反应器中微生物群落及抗性基因的影响	戴琦, 刘锐, 梁玉婷, 舒小铭, 徐灿灿, 陈吕军 (1333)
CEM-UF 组合膜-硝化/反硝化系统处理低 C/N 废水及种群结构分析	邢金良, 张岩, 陈昌明, 张博康, 郭威, 马翔山 (1342)
磷对混养反硝化污泥活性和微生物群落结构的影响	王佩琦, 周伟丽, 何圣兵, 黄荣振 (1350)
甲烷厌氧氧化协同硝酸盐还原菌群驯化及其群落特征	薛松, 张梦竹, 李琳, 刘俊新 (1357)
城市尾水排海过程中微生物及主要致病菌扩散规律	徐爱玲, 牛成洁, 宋志文, 郎秀臻, 郭明月 (1365)
氧四环素的微生物燃料电池处理及微生物群落	严伟富, 肖勇, 王淑华, 丁蕊, 赵峰 (1379)
近 30 年干县耕地土壤碳氮比时空变异特征及其影响因素	江叶枫, 钟珊, 李婕, 王澜珂, 卞荣禧 (1386)
中宁枸杞土壤碳组分分布特征及其空间异质性	王幼奇, 赵云鹏, 白一茹, 张兴 (1396)
滨海滩涂围垦区不同围垦年限土壤酶活性变化及其与理化性质关系	解雪峰, 濮励杰, 王琪琪, 朱明, 王小涵 (1404)
青藏高原中东部表层土壤中多环芳烃的分布特征、来源及生态风险评价	周雯雯, 李军, 胡健, 李兆洲 (1413)
基于 UNMIX 模型的矿区周边农田土壤金属源解析	卢鑫, 胡文友, 黄标, 李元, 祖艳群, 湛方栋, 卞荣禧 (1421)
铁锰双金属材料在不同 pH 条件下对土壤 As 和重金属的稳定化作用	费群, 阎秀兰, 李永华 (1430)
我国 3 个城市人体血清中新型溴代阻燃剂水平趋势及分布特征	王庆华, 袁浩东, 金军, 李鹏, 马玉龙, 王英 (1438)
《环境科学》征订启事 (979) 《环境科学》征稿简则 (996) 信息 (1022, 1064, 1293)	

化学预氧化耦合生物锰氧化对水中有机物的去除

菅之舆^{1,2}, 常洋洋², 王立新¹, 梁金松², 柏耀辉^{2*}

(1. 内蒙古大学生态与环境学院, 呼和浩特 010021; 2. 中国科学院生态环境研究中心, 中国科学院饮用水科学与技术重点实验室, 北京 100085)

摘要: 在饮用水处理过程中, 高锰酸钾与铁锰氧化物预氧化作为化学预氧化的典型工艺, 能有效去除饮用水中有机物的污染, 并控制消毒副产物(DBPs)的产生。但研究发现, 这两种预氧化都会生成具有遗传毒性效应的 Mn^{2+} 。为解决该问题, 研究构想在化学预氧化后耦合生物锰氧化技术, 通过生物作用将 Mn^{2+} 转化为具有较强氧化吸附能力的生物锰氧化物, 从而对水质进一步净化。在以天然有机物酪氨酸(Tyr)和人工合成有机物 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸(BP-4)为基质的模拟污染源水中, 试验结果验证了上述构想。高锰酸钾或铁锰氧化物预氧化能够去除 Tyr, 但无法去除 BP-4, 并会产生 Mn^{2+} ; 在以锰氧化细菌 *Pseudomonas* sp. QJX-1 构建的生物体系中, *Pseudomonas* sp. QJX-1 能利用 Tyr 进行生长并产生锰氧化, 生成的生物锰氧化物能有效去除 BP-4; 在最优试验条件下, 特定强度的高锰酸钾预氧化耦合生物锰氧化试验中 Tyr、BP-4 及 Mn^{2+} 去除率分别为 100%、50% 和 98.9%。

关键词: 饮用水处理; 化学预氧化; 生物锰氧化; *Pseudomonas* sp. QJX-1; 酪氨酸; BP-4

中图分类号: X506 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2018)03-1188-07 DOI: 10.13227/j.hjks.201707103

Removal of Organic Matter from Water by Chemical Preoxidation Coupled with Biogenic Manganese Oxidation

JIAN Zhi-yu^{1,2}, CHANG Yang-yang², WANG Li-xin¹, LIANG Jin-song², BAI Yao-hui^{2*}

(1. School of Ecology and Environment, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China; 2. Key Laboratory of Drinking Water Science and Technology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China)

Abstract: In the process of drinking water treatment, potassium permanganate and iron-manganese oxides are typical pre-oxidation methods that can not only effectively remove organic matters in drinking water, but also reduce the production of disinfection by-products (DBPs). However these two pre-oxidation methods will produce Mn^{2+} that is genotoxic. In order to solve this problem, a concept was proposed to connect biogenic-manganese oxidation technology after chemical oxidation. The manganese-oxidizing microbe may convert Mn^{2+} into the bio-manganese oxide, which can further remove the pollutants by its strong oxidative and adsorption capacity to improve water purification. In the simulated contaminated water composed of natural organic tyrosine (Tyr) and synthetic organic 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenone-5-Sulfonic Acid (BP-4), we verified the proposed the concept. Pre-oxidation by potassium permanganate or iron-manganese oxides efficiently removed Tyr, but had negligible effect on BP-4. During this, Mn^{2+} was generated. In the subsequent biological system, the manganese-oxidizing bacteria *Pseudomonas* sp. QJX-1 could utilize the Tyr for growth and oxidize Mn^{2+} to Mn^{4+} oxide. The generated manganese oxides could then effectively remove BP-4. In comparison, the moderate potassium permanganate preoxidation coupled with bio-manganese oxidation had a desirable treatment effect, with 100%, 50%, and 98.9% removals for Tyr, BP-4, and Mn^{2+} , respectively. Importantly, the study provides a new method for drinking water treatment.

Key words: drinking water treatment; chemical preoxidation; biogenic manganese oxidation; *Pseudomonas* sp. QJX-1; Tyr; BP-4

在世界范围内, 越来越多的淡水系统受到成千上万种类的工业和天然有机物的污染, 这是人类目前所面临的重要环境问题之一^[1]。尽管大多数的有机污染物在水体中含量很低, 但同样会造成不容小视的饮用水水质风险^[2, 3]。其中一个重要的原因是, 在饮用水处理过程中, 部分天然有机物及人工合成有机物在消毒过程中会与氯发生反应, 生成具三致作用的 DBPs^[4, 5]。目前已有大量关于天然有机物及人工合成有机物作为 DBPs 重要前驱体的相关研究, 如天然有机物类物质: 腐殖酸^[6]、富里酸^[7]、天冬氨酸^[8]等, 人工合成有机物类物质: 抗生素^[9~11]、雌激

素^[12]、紫外防晒剂^[13]等。自 1974 年, Rook^[14]在氯化水体中第一次检测到了 DBPs-三氯甲烷, 已有 700 多种的 DBPs 被报道, 因此 DBPs 的控制一直以来都是饮用水安全保障技术领域的关注焦点。

目前, 化学预氧化法是去除水中有机污染物并控制饮用水中 DBPs 生成的一种常规方法。高锰酸

收稿日期: 2017-07-13; 修订日期: 2017-08-18

基金项目: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2015ZX07406006); 国家自然科学基金项目(51578537)

作者简介: 菅之舆(1992~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为生物水处理, E-mail: 949945242@qq.com

* 通信作者, E-mail: yhbai@rcees.ac.cn

钾与铁锰氧化物都是饮用水厂中较为常见的预氧化试剂. 高锰酸钾作为氧化剂在去除饮用水中的微量有机污染物^[15]、致突变物质^[16]、氯仿前质^[17], 及氧化助凝^[18]等方面具有良好的效果. 铁锰氧化物作为氧化剂在对许多有机物污染物如酚类^[19]、苯胺^[20]、抗生素^[21]等具有良好的吸附和降解作用. 但研究发现, 高锰酸钾或铁锰氧化物在与水中有机物发生氧化还原的同时, 会生成具有遗传毒性效应的二价锰离子^[21, 22]. 为解决该问题, 我们考虑结合化学预氧化与生物滤池技术, 通过化学预氧化去除 DBPs 前驱体, 利用接种了锰氧化细菌的常规生物滤池去除预氧化所产生的 Mn^{2+} ^[23, 24], 使该组合工艺达到同时去除水中有机污染物与 Mn^{2+} 的目的.

为验证该组合工艺可行性, 本文选用天然有机物 Tyr、人工合成有机物 BP-4 作为研究对象, 高锰酸钾或铁锰氧化物预氧化后所剩余的反应余液作为基质, 具有强锰氧化能力的 *Pseudomonas* sp. QJX-1^[25] 作为模式菌种, 将化学预氧化同生物锰氧化耦合在一起, 考察该体系去除水中有机污染物、 Mn^{2+} 的效果, 以期为饮用水工艺优化提供新的思路.

1 材料与方法

1.1 主要试剂及模拟污染水配制

试验中所用无机试剂均为优级纯, 有机溶剂均为色谱纯试剂, BP-4 购自百灵威公司, Tyr 购自 Sigma-Aldrich 公司.

模拟污染源水配制: 在超纯水中分别加入 $176\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ Tyr 与 $1\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ BP-4.

1.2 铁锰氧化物(FMO)的制备

根据文献[26], 将 0.015 mol 高锰酸钾 (KMnO_4) 与 0.05 mol 硫酸亚铁 ($\text{FeSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 分别溶于 200 mL 去离子水中. 在磁力搅拌下, 将硫酸亚铁溶液缓慢地加入到高锰酸钾溶液当中, 同时加入 $5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液使得溶液 pH 保持在 7~8 之间. 在悬浮物产生后, 持续搅拌 1 h, 随后在室温下静置 12 h. 将最终所得悬浮物反复用去离子水清洗, 然后在 105°C 烘箱中烘干 4 h, 最后在研钵中将所得 FMO 磨碎至粉末状.

1.3 模拟污染源水的化学预氧化

将高锰酸钾、FMO 分别作为模拟污染源水的预处理氧化剂加入到 500 mL 模拟污染源水中. 其中, 在预氧化时, FMO 为不溶性固体, 直接投放. 高锰酸钾则配制成高浓度溶液, 预氧化时投放高锰酸钾溶液.

在避光条件下 (防止高锰酸钾光解), 将 500

mL pH 为 7 的模拟污染源水加入到 1 L 试剂瓶中, 随后高锰酸钾溶液按照 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0$ 为 2:1、1:1、1:5 的比例分别加入到模拟污染源水中. 在预氧化前期振荡试剂瓶, 使高锰酸钾溶液同模拟污染源水充分混合, 进行预氧化. 在避光条件下, 将 500 mL pH 为 7 的模拟污染源水加入到 1 L 试剂瓶中, FMO 按照质量比 FMO: Tyr 为 2:1、1:1、1:2.5、1:5 的比例分别加入到模拟污染源水中. 在预氧化前期振荡试剂瓶, 使 FMO 同模拟污染源水充分混合, 进行预氧化. 在高锰酸钾、FMO 预氧化过程中定时取样, 测定高锰酸钾、Tyr、 Mn^{2+} 及 BP-4 的浓度. 每组试验均采用 3 次重复.

1.4 以预氧化后余液作为基质的生物锰氧化

1.4.1 菌株及培养基

菌株培养采用 PYG 培养基 (peptone yeast extract-glucose): 葡萄糖 0.25 g , 酵母膏 0.25 g , 蛋白胨 0.25 g , 0.5 g $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 60 mg $\text{CaCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 蒸馏水 1 L , 用 HEPES (*N*-2-Hydroxyethylpiperazine-*N'*-2-ethanesulfonic acid, 4-羟乙基哌嗪乙磺酸) 调节 pH 为 7.0 ± 0.2 , 高温灭菌. 本试验采用的锰氧化菌为 *Pseudomonas* sp. QJX-1.

1.4.2 菌株活化及富集培养

将保存于 -80°C 超低温冰箱中 *Pseudomonas* sp. QJX-1 的菌株取出, 涂布于固体 PYG 培养基 (加入 $5\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}\text{ Mn}^{2+}$) 并在 30°C , $170\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 下进行培养活化. 随后将固体培养基上的菌斑接种到 200 mL 不含 Mn^{2+} 的 PYG 培养基中, 30°C , $170\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 振荡培养 48 h. 将富集培养的菌液移入 10 mL 离心管中, 在 $7500\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 下离心 5 min , 倒掉上清液, 加入无菌水再次离心, 得到的细胞沉淀溶于 1.5 mL 无菌水后作为锰氧化试验的接种菌液.

1.4.3 生物锰氧化

收集 200 mL 上述高锰酸钾、铁锰氧化物处理模拟污染源水所产生的余液, 用 HEPES 缓冲液调节 pH, 使其稳定在 7 左右. 随后在余液中加入 $0.5\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}\text{ MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $60\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}\text{ CaCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 及 $5\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}\text{ KH}_2\text{PO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 作为生物培养所需的微量元素. 在超净台中将上述余液通过 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ 无菌滤头 (津腾, 上海) 加入到无菌锥形瓶中, 然后加入 3 mL *Pseudomonas* sp. QJX-1 菌液, 将锥形瓶用封口膜密封, 置于 30°C 恒温摇床中, 以 $170\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 转速培养 5 d. 将未经过预处理的模拟污染源水同样加入锰氧化细菌与 Mn^{2+} 作为对照. 定时取样测定菌密度 (D_{600})、 Mn^{2+} 、Tyr、BP-4 的浓度. 每组试验均采用

3 次重复.

1.5 分析方法

高锰酸钾吸光度:用岛津 U-3010 型紫外-可见光分光光度计,在波长为 525 nm 处检测反应液吸光度.

MnO₂ 胶体:用马尔文 ZS90 型纳米粒度及 ZETA 电位分析仪,检测反应液中 MnO₂ 胶体粒度.

锰氧化物:将 LBB 溶液(0.04%)滴在预氧化余液中判断是否有锰氧化物的产生^[27].

Mn²⁺ 浓度:培养液样品经 0.22 μm 滤膜过滤后,通过电感耦合等离子体原子发射光谱法(700 series ICP-OES)测定 Mn²⁺ 浓度.

菌密度(*D*₆₀₀):利用紫外-可见光分光光度计(U-3010),在波长为 600 nm 处检测菌液吸光度.

Tyr 浓度:培养液样品由 0.22 μm 滤头过滤后,在超高效液相色谱/串联四级杆质谱联用仪(安捷伦,QQQ6460/UPL-1290)上测定培养液中 Tyr 浓度^[28].

BP-4 浓度:培养液样品由 0.22 μm 滤头过滤后,通过超高效液相色谱/串联四级杆质谱联用仪(沃特世,ACQUITY UPLC/Quattro Premier XE)检测培养液中 BP-4 浓度^[29].


2 结果与讨论

2.1 高锰酸钾、铁锰氧化物对模拟污染源水的预氧化

本研究采用不同手段分析预氧化后余液组成成

分的变化,以此来探究不同的预氧化处理对模拟污染源水中 BP-4、Tyr 产生的影响,如图 1.

在高锰酸钾预氧化过程中,模拟污染源水中组成成分变化如图 1(a).可以看出,模拟污染源水中 BP-4 浓度在预氧化过程中没有明显变化,这表明高锰酸钾无法氧化 BP-4. 试验发现,在高锰酸钾预氧化初期,水颜色迅速发生变化,并伴随着大量胶体的产生. 根据已有报道^[22, 30, 31]及试验现象,推测强氧化性的高锰酸钾迅速氧化了 Tyr,同时生成胶体 MnO₂ 与 Mn²⁺. 由于高锰酸钾与 Tyr 反应过于迅速,无法捕捉到 Tyr 的浓度变化过程,因此试验采用实时分光光度法测定了高锰酸钾浓度的连续变化过程,来验证该推断. 结果发现[图 1(a)],高锰酸钾浓度在预氧化前期迅速下降,随后很快达到稳定,由此证明了高锰酸钾对 Tyr 的快速氧化. 接着,试验进一步通过 LBB 法证明了预氧化胶体余液中 Mn⁴⁺(MnO₂)的产生,并通过胶体粒度的测定发现胶体粒径随时间缓慢变小,预氧化 40 min 后形成粒径为 50 nm 的稳定胶体. 综上所述,试验证明了高锰酸钾对 Tyr 进行了快速氧化并同时产生胶体 MnO₂. 为探讨胶体 MnO₂ 是否对 Tyr 氧化并产生 Mn²⁺,试验进一步测定了预氧化过程中 Mn²⁺ 变化[图 1(a)]. 可以看出,前期随着 Tyr 被迅速氧化,溶液中产生大量的 Mn²⁺,这主要是由于高锰酸钾对 Tyr 的氧化导致的. 但当 1 min 后高锰酸钾浓度



误差线代表 3 个平行样品的标准偏差,下同

图 1 高锰酸钾与铁锰氧化物对模拟污染源水的氧化过程

Fig. 1 Oxidation process of potassium permanganate and iron-manganese oxides in simulated polluted water

趋于平稳时, Mn^{2+} 浓度仍在继续上升, 由此可以证明胶体 MnO_2 对剩余的 Tyr 或 Tyr 中间产物发生了进一步的氧化还原反应从而释放 Mn^{2+} . 预氧化 5 min 后, 由于胶体 MnO_2 对 Mn^{2+} 的持续吸附, Mn^{2+} 浓度开始降低并趋于稳定.

在铁锰氧化物预氧化过程中, 模拟污染源水中组成成分变化如图 1(b). 试验发现铁锰氧化物对 BP-4 也没有氧化吸附效果. 但通过 Tyr 浓度变化可以看出, Tyr 浓度随铁锰氧化物的加入, 其浓度发生显著下降, 并随着铁锰氧化物含量的增加其下降速率加快. 根据已有研究推测, Tyr 的降低是由铁锰氧化物中 $\delta\text{-MnO}_2$ 对 Tyr 的氧化以及铁氧化物中羟基铁对 Tyr 的吸附共同造成的^[26,32]. 为验证铁锰氧化物中锰氧化物对 Tyr 的氧化, 试验测量预氧化过程中 Mn^{2+} 的浓度. 根据结果可以看出[图 1(b)], 铁锰氧化物预氧化初期便生成 Mn^{2+} , 随着氧化的进行, Mn^{2+} 也在不断升高, 这证明了铁锰氧化物中锰氧化物的氧化作用. 此外, 通过羟基铁对 Tyr 的吸附试验发现, 在 20℃, pH = 7 条件下, 1 mg 羟基铁可以吸附 0.23 mg Tyr. 由此可以证明, 铁锰氧化物中铁氧化物对 Tyr 起到吸附作用.

为直接比较高锰酸钾预氧化与铁锰氧化物预氧化的效果, 对预氧化后(12 h)Tyr 去除率及 Mn^{2+} 的产生比例 $[(\text{Mn}^{2+}/\text{预氧化剂浓度}) \times 100\%]$ 进行了计算, 如表 1. 可以看出, 高锰酸钾预氧化对 Tyr 的去除更为有效, 在同等浓度下, 高锰酸钾预氧化对 Tyr 的去除效率是铁锰氧化物预氧化的 1.4 ~ 2.0 倍, Mn^{2+} 产生比例是铁锰氧化物预氧化的 10.3 ~ 31.7 倍. 其中 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0$ 为 2:1 是最优添加比例, 此时能够达到对 Tyr 完全去除的效果.

表 1 高锰酸钾及铁锰氧化物对 Tyr 的去除率及 Mn^{2+} 的生成率			
Table 1 Tyr removal and Mn^{2+} production by the oxidation of potassium permanganate and iron-manganese oxides			
项目	$[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0$	Tyr 去除率 /%	Mn^{2+} 产生 比例/%
高锰酸钾 预氧化	2:1	100	4.0
	1:1	81.8	4.1
	1:5	40.8	11.1
铁锰氧化物 预氧化	2:1	45.7	0.3
	1:1	40	0.4
	1:2.5	37.3	0.37
	1:5	26.9	0.35

2.2 生物锰氧化

由于高锰酸钾及铁锰氧化物在预氧化过程中不能去除 BP-4, 同时还释放污染物 Mn^{2+} . 研究考虑

通过生物作用(可在常规工艺中的生物滤池中完成), 将 Mn^{2+} 转化为锰氧化物, 并利用锰氧化物的氧化吸附作用去除水中的 BP-4 (BP-4 很难被生物利用^[33]), 达到同时去除 Mn^{2+} 及 BP-4 的目的. 为此, 以具有锰氧化能力的 *Pseudomonas* sp. QJX-1 作为模式菌株来构建生物体系, 考察上述设想能否实现.

2.2.1 以天然有机物 Tyr 作为基质的生物锰氧化

将 BP-4 作为唯一碳源对 *Pseudomonas* sp. QJX-1 进行培养, 结果发现 *Pseudomonas* sp. QJX-1 不能利用 BP-4 进行生长. 接着研究考察了微生物是否能利用天然有机物 Tyr 作为碳氮源进行锰氧化.

图 2 表示了 *Pseudomonas* sp. QJX-1 的生长情况以及对 Tyr、BP-4、 Mn^{2+} 的利用/去除/转化情况. 在以天然有机物 Tyr 为培养基质的生物锰氧化过程中, 根据 D_{600} 以及 Tyr 变化可以看出(图 2), 随着初期 *Pseudomonas* sp. QJX-1 的投入, Tyr 浓度在前 24 h 内由 $176 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $0 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 与之相对应的是细菌菌密度在 24 h 内出现明显上升. 这说明




图 2 以 Tyr 为基质的生物锰氧化中细菌菌密度变化及 Tyr、 Mn^{2+} 、BP-4 浓度变化

Fig. 2 Variation of bacterial density, Tyr, Mn^{2+} and BP-4 concentrations in the process of biogenic manganese oxidation in the media containing BP4

Pseudomonas sp. QJX-1 能够在该培养体系中以 Tyr 为碳氮源进行正常的生长繁殖. 为考察 *Pseudomonas* sp. QJX-1 在生长过程中是否利用 Mn^{2+} 进行了生物锰氧化, 试验测量了 Mn^{2+} 浓度变化. 本试验结果表明(图 2), Mn^{2+} 浓度随时间逐渐降低, 在 120 h 内由初始的 $4.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $1.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. 由此可见, 在该体系中发生了生物锰氧化. 根据已有研究推测^[24, 25, 28], *Pseudomonas* sp. QJX-1 利用 Mn^{2+} 形成的生物锰氧化物能够对 BP-4 进行氧化吸附. 为验证该推测, 试验进一步测量了 BP-4 浓度变化. 本试验结果显示(图 2) BP-4 浓度呈现先下降后上升的趋势, 在 48 h 处达到最低 $0.41 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. 由此可以表明, 生物锰氧化物能够对 BP-4 进行氧化吸附, 达到 BP-4 去除地效果. 生物锰氧化物对 BP-4 氧化吸附造成了前期 BP-4 浓度的下降, 后期的 BP-4 浓度的波动是由于锰氧化物对 BP-4 不断地进行吸附解析造成的. 综上所述, 以 *Pseudomonas* sp. QJX-1 作为模式菌种来构建的生物体系能够利用 Tyr 进行生长繁殖, 并且在 Mn^{2+} 存在的情况下发生生物锰氧化, 达到同时去除 Mn^{2+} 及 BP-4 的效果.

2.2.2 以高锰酸钾、铁锰氧化物预氧化余液为基质的生物锰氧化

为考察化学预氧化联合生物滤池工艺的可行性. 试验以高锰酸钾、铁锰氧化物预氧化余液为基质, 探讨 *Pseudomonas* sp. QJX-1 的生长情况, 以及培养体系能否发生锰氧化并同时去除 BP-4.

首先, 在以高锰酸钾预氧化余液为基质的生物锰氧化中. 根据 D_{600} 和 Tyr 浓度变化可以看出[图 3 (a)], 在预氧化条件是 $[\text{KMnO}_4]_0 : [\text{Tyr}]_0 = 1:1$ 、 $1:5$ 的预氧化余液中, 细菌菌密度在 24 h 内有明显上升, 并且预氧化余液中 Tyr 浓度在 24 h 内持续下降至 $0 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. 这表明锰氧化细菌能够在预氧化余液中降解利用 Tyr 并正常生长繁殖. 但在预氧化条件是 $[\text{KMnO}_4]_0 : [\text{Tyr}]_0 = 2:1$ 的预氧化余液中, 细菌菌密度在 120 h 内都无明显增长, 这主要是由于预氧化余液中 Tyr 已被完全转化, 而转化产物并不能被 *Pseudomonas* sp. QJX-1 所利用. 根据 Mn^{2+} 浓度变化可以发现[图 3(a)], 只有在预氧化条件是 $[\text{KMnO}_4]_0 : [\text{Tyr}]_0 = 1:5$ 的预氧化余液中, Mn^{2+} 浓度发生了明显减少, 在 63 h 内浓度由 $3.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $0.04 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. 这表明在该体系下能够发生生




图 3 以预氧化余液为基质的生物锰氧化过程

Fig. 3 Biogenic manganese oxidation in solution after pre-oxidation

物锰氧化. 而在预氧化条件是 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0 = 1:1$ 、 $2:1$ 的预氧化余液中, Mn^{2+} 浓度没明显下降, 没有发生明显的生物锰氧化. 这可能是由于体系中过高的 Mn^{2+} 浓度或过低的 Tyr 含量导致了 *Pseudomonas* sp. QJX-1 锰氧化能力受到了抑制^[34, 35]. BP-4 的浓度变化结果表明[图 3(a)], 只有在生成了生物锰氧化物的余液中(预氧化条件是 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0 = 1:5$), BP-4 浓度产生了明显的下降. 由此可以证明, 形成的生物锰氧化物对 BP-4 具有去除作用.

在以铁锰氧化物预氧化余液为基质的生物锰氧化中. 根据 D_{600} 和 Tyr 浓度变化可以看出[图 3(b)], 不同比例预氧化余液中细菌菌密度出现相似增长趋势, *Pseudomonas* sp. QJX-1 均能在 24 h 内迅速利用 Tyr 进行生长繁殖. 根据 Mn^{2+} 浓度变化可以看出[图 3(b)], 预氧化余液中 $0.36 \sim 0.91 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Mn^{2+} 在 38.5 h 内降至 $0.02 \sim 0.07 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, Mn^{2+} 去除率为 77.8% ~ 92.0%. 这表明不同比例预氧化余液中均发生了生物锰氧化. 由 BP-4 的浓度变化可以看出[图 3(b)], BP-4 浓度在 120h 的生物锰氧化过程中均无显著性的降低. 由此可见, 微量的生物锰氧化物对 BP-4 无法起到有效的去除作用.

综上所述, 以锰氧化细菌 *Pseudomonas* sp. QJX-1 作为模式菌株构建的生物体系能有效利用 Tyr 进行生长进而在 Mn^{2+} 存在条件下能发生生物锰氧化, 而生成的锰氧化物能有效去除 BP-4, 这验证了先前的构想. 另一方面, 可以看到以高锰酸钾预氧化(预氧化条件为 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0 = 1:5$)余液为基质的生物锰氧化是最优组合, 试验中 Tyr 达到了 100% 去除, Mn^{2+} 达到 98.9% 去除, BP-4 最高去除率为 50%.

3 结论

(1)高锰酸钾与铁锰氧化物预氧化能有效去除天然有机物 Tyr 但都不能去除 BP-4, 同时两种预氧化方式都会产生 Mn^{2+} 对水体造成二次污染. 在同等浓度下, 高锰酸钾预氧化对 Tyr 的去除效率是铁锰氧化物预氧化的 1.4 ~ 2.0 倍. 但高锰酸钾预氧化过程中会生成更多的 Mn^{2+} , 在同等浓度下, 高锰酸钾预氧化中 Mn^{2+} 产生比例是铁锰氧化物预氧化的 10.3 ~ 31.7 倍.

(2)以高锰酸钾和铁锰氧化物预氧化余液作为基质的生物锰氧化过程中, Tyr 可作为锰氧化细菌

Pseudomonas sp. QJX-1 碳氮源, 被充分降解利用. 锰氧化细菌 *Pseudomonas* sp. QJX-1 可以有效去除前期预氧化所产生的 Mn^{2+} 并形成对 BP-4 起到去除效果的生物锰氧化物. 其中以高锰酸钾预氧化(预氧化条件为 $[\text{KMnO}_4]_0: [\text{Tyr}]_0 = 1:5$)余液为基质的生物锰氧化是最优组合, 试验中 Tyr 达到了 100% 去除, Mn^{2+} 达到 98.9% 去除, BP-4 最高去除率为 50%.

(3)试验结果表明, 特定强度的高锰酸钾预氧化耦合生物锰氧化能够有效去除 DBPs 前驱体 Tyr 及 BP-4, 并能防止 Mn^{2+} 污染. 因此, 本研究为饮用水新工艺(即化学预氧化-人工强化生物滤池联用工艺)的提出提供了理论基础.

参考文献:

- [1] Schwarzenbach R P, Escher B I, Fenner K, *et al.* The challenge of micropollutants in aquatic systems[J]. *Science*, 2006, **313** (5790): 1072-1077.
- [2] Bulloch D N, Nelson E D, Carr S A, *et al.* Occurrence of halogenated transformation products of selected pharmaceuticals and personal care products in secondary and tertiary treated wastewaters from southern California[J]. *Environmental Science & Technology*, 2015, **49**(4): 2044-2051.
- [3] Lin T, Yu S L, Chen W. Occurrence, removal and risk assessment of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in an advanced drinking water treatment plant (ADWTP) around Taihu Lake in China[J]. *Chemosphere*, 2016, **152**: 1-9.
- [4] Chang H, Chen C, Wang G. Characteristics of C-, N-DBPs formation from nitrogen-enriched dissolved organic matter in raw water and treated wastewater effluent[J]. *Water Research*, 2013, **47**(8): 2729-2741.
- [5] Richardson S D, Plewa M J, Wagner E D, *et al.* Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: A review and roadmap for research[J]. *Mutation Research/Reviews in Mutation Research*, 2007, **636**(1-3): 178-242.
- [6] Stevens A A, Moore L A, Miltner R J. Formation and control of non-trihalomethane disinfection by-products[J]. *Journal (American Water Works Association)*, 1989, **81**(8): 54-60.
- [7] Reckhow D A, Singer P C, Malcolm R L. Chlorination of humic materials: byproduct formation and chemical interpretations[J]. *Environmental Science & Technology*, 1990, **24**(11): 1655-1664.
- [8] Hureiki L, Croué J P, Legube B. Chlorination studies of free and combined amino acids[J]. *Water Research*, 1994, **28**(12): 2521-2531.
- [9] Wang P, He Y L, Huang C H. Reactions of tetracycline antibiotics with chlorine dioxide and free chlorine[J]. *Water Research*, 2011, **45**(4): 1838-1846.
- [10] Dodd M C, Shah A D, Von Gunten U, *et al.* Interactions of fluoroquinolone antibacterial agents with aqueous chlorine: reaction kinetics, mechanisms, and transformation pathways[J]. *Environmental Science & Technology*, 2005, **39**(18): 7065-

- 7076.
- [11] Navalon S, Alvaro M, Garcia H. Reaction of chlorine dioxide with emergent water pollutants: product study of the reaction of three β -lactam antibiotics with ClO_2 [J]. *Water Research*, 2008, **42**(8-9): 1935-1942.
- [12] Pereira R O, Postigo C, De Alda M L, *et al.* Removal of estrogens through water disinfection processes and formation of by-products[J]. *Chemosphere*, 2011, **82**(6): 789-799.
- [13] Nakajima M, Kawakami T, Niino T, *et al.* Aquatic fate of sunscreen agents Octyl- 4-methoxycinnamate and Octyl- 4-dimethylaminobenzoate in model swimming pools and the mutagenic assays of their chlorination byproducts[J]. *Journal of Health Science*, 2009, **55**(3): 363-372.
- [14] Rook J J. Formation of haloforms during chlorination of natural waters[J]. *Journal of Water Treatment Examination*, 1974, **23**(2): 234-243.
- [15] 董秉直, 姚迎迎, 杜嘉丹. 预氧化去除太湖水中有机物和臭味物质的研究[J]. *给水排水*, 2016, **42**(2): 31-36.
Dong B Z, Yao Y Y, Du J D. Study on the pre-oxidation of organics and odor in Taihu Lake [J]. *Water & Wastewater Engineering*, 2016, **42**(2): 31-36.
- [16] 李圭白, 马军. 用高锰酸钾去除和控制受污染水源水中的致突变物质[J]. *给水排水*, 1992, **18**(2): 15-18, 2-3.
Li G B, Ma J. Removal and control of mutagen in contaminated water sources by potassium permanganate [J]. *Water & Wastewater Engineering*, 1992, **18**(2): 15-18, 2-3.
- [17] 马军, 李圭白, 柏蔚华, 等. 高锰酸盐复合药剂预处理控制氯化消毒副产物及致突变活性[J]. *给水排水*, 1994, **20**(3): 5-7, 2.
Ma J, Li G B, Bai W H, *et al.* Control of chlorination byproducts and mutagenic activity by composite permanganate pretreatment[J]. *Water & Wastewater Engineering*, 1994, **20**(3): 5-7, 2.
- [18] Ma M, Liu R P, Liu H J, *et al.* Effect of moderate pre-oxidation on the removal of *Microcystis aeruginosa* by KMnO_4 -Fe(II) process: Significance of the *in-situ* formed Fe(III) [J]. *Water Research*, 2012, **46**(1): 73-81.
- [19] Zhang H C, Huang C H. Oxidative transformation of triclosan and chlorophene by manganese oxides [J]. *Environmental Science & Technology*, 2003, **37**(11): 2421-2430.
- [20] Li H, Lee L S, Schulze D G, *et al.* Role of soil manganese in the oxidation of aromatic amines [J]. *Environmental Science & Technology*, 2003, **37**(12): 2686-2693.
- [21] 童蕾, 曾梦玲, 李民敬, 等. 铁锰氧化物对地下水环境中金霉素的降解[J]. *环境化学*, 2016, **35**(5): 917-924.
Tong L, Zeng M L, Li M J, *et al.* Degradation of chlorotetracycline by iron and manganese oxides under simulated groundwater environment [J]. *Environmental Chemistry*, 2016, **35**(5): 917-924.
- [22] Chang Y Y, Bai Y H, Qu J H. Does KMnO_4 preoxidation reduce the genotoxicity of disinfection by-products? [J]. *Chemosphere*, 2016, **163**: 73-80.
- [23] Bai Y H, Yang T T, Liang J S, *et al.* The role of biogenic Fe-Mn oxides formed *in situ* for arsenic oxidation and adsorption in aquatic ecosystems [J]. *Water Research*, 2016, **98**: 119-127.
- [24] Bai Y H, Chang Y Y, Liang J S, *et al.* Treatment of groundwater containing Mn(II), Fe(II), As(III) and Sb(III) by bioaugmented quartz-sand filters [J]. *Water Research*, 2016, **106**: 126-134.
- [25] 周娜娜, 柏耀辉, 梁金松, 等. *Pseudomonas* sp. QJX-1 的锰氧化特性研究[J]. *环境科学*, 2014, **35**(2): 740-745.
Zhou N N, Bai Y H, Liang J S, *et al.* Characterization of manganese oxidation by *Pseudomonas* sp. QJX-1 [J]. *Environmental Science*, 2014, **35**(2): 740-745.
- [26] Zhang G S, Qu J H, Liu H J, *et al.* Preparation and evaluation of a novel Fe-Mn binary oxide adsorbent for effective arsenite removal [J]. *Water Research*, 2007, **41**(9): 1921-1928.
- [27] Krumbein W E, Altmann H J. A new method for the detection and enumeration of manganese oxidizing and reducing microorganisms [J]. *Helgoländer Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen*, 1973, **25**(2-3): 347-356.
- [28] 常洋洋. 饮用水源水典型混合物的氯化致毒机制与控制 [D]. 北京: 中国科学院生态环境研究中心, 2017. 69-78.
- [29] Rodil R, Quintana J B, López-Mahía P, *et al.* Multiclass determination of sunscreen chemicals in water samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. *Analytical Chemistry*, 2008, **80**(4): 1307-1315.
- [30] Altaf M, Akram M, Kabir-ud-Din. Water-soluble colloidal manganese dioxide as an oxidant for L-tyrosine in the absence and presence of non-ionic surfactant TX-100 [J]. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 2009, **73**(2): 308-314.
- [31] Malik M A, Basahel S N, Obaid A Y, *et al.* Oxidation of tyrosine by permanganate in presence of cetyltrimethylammonium bromide [J]. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 2010, **76**(1): 346-353.
- [32] Stone A T, Ulrich H J. Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and co(III) oxide by hydroquinone [J]. *Journal of Colloid and Interface Science*, 1989, **132**(2): 509-522.
- [33] 张弘, 殷浩文, 周忠良, 等. 新兴污染物 BP-3 和 BP-4 的好氧生物降解性能 [J]. *化工环保*, 2014, **34**(5): 423-428.
Zhang H, Yin H W, Zhou Z L, *et al.* Aerobic biodegradability of emerging contaminants BP-3 and BP-4 [J]. *Environmental Protection of Chemical Industry*, 2014, **34**(5): 423-428.
- [34] 崔馨文. 锰氧化细菌的分离鉴定及其锰氧化能力的研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014. 25-50.
- [35] 王文明. 深海锰氧化细菌 *Brachybacterium* sp. Mn32 对 Mn(II) 的氧化及生物锰氧化物对 Zn(II)、Ni(II) 的吸附研究 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2008. 24-35.

CONTENTS

Characterization and Variation of Organic Carbon (OC) and Elemental Carbon (EC) in PM _{2.5} During the Winter in the Yangtze River Delta Region, China	KANG Hui, ZHU Bin, WANG Hong-lei, <i>et al.</i> (961)
Important Effect of Secondary Inorganic Salt Extinction on Visibility Impairment in the Northern Suburb of Nanjing	YU Chao, YU Xing-na, ZHAO Tian-liang, <i>et al.</i> (972)
Day-Night Differences and Source Apportionment of Inorganic Components of PM _{2.5} During Summer-Winter in Changzhou City	LIU Jia-shu, GU Yuan, MA Shuai-shuai, <i>et al.</i> (980)
Characteristics of Elements in PM _{2.5} and PM ₁₀ in Road Dust Fall During Spring in Tianjin	WANG Shi-bao, JI Ya-qin, LI Shu-li, <i>et al.</i> (990)
Particle Size Distribution and Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Atmospheric Particles from Beijing and Xinxiang During Summer	ZHANG Xin, ZHAO Xiao-man, MENG Xue-jie, <i>et al.</i> (997)
Ecological and Health Risks of Trace Heavy Metals in Atmospheric PM _{2.5} Collected in Wuxiang Town, Shanxi Province	GUO Zhao-xia, GENG Hong, ZHANG Jin-hong, <i>et al.</i> (1004)
Characteristics of Particulate and Inorganic Elements of Motor Vehicles Based on a Tunnel Environment	LI Feng-hua, ZHANG Yan-jie, ZHANG Jing, <i>et al.</i> (1014)
A 2013-based Atmospheric Ammonia Emission Inventory and Its Characteristic of Spatial Distribution in Henan Province	WANG Chen, YIN Sha-sha, YU Shi-jie, <i>et al.</i> (1023)
Emission Characteristics of Wind Erosion Dust from Topsoil of Urban Roadside-Tree Pool	LI Bei-bei, QIN Jian-ping, QI Li-rong, <i>et al.</i> (1031)
Particulate Component Emission Characteristic from a Diesel Bus with DOC and CDPF	LOU Di-ming, GENG Xiao-yu, SONG Bo, <i>et al.</i> (1040)
Water Quality in the Henan Intake Area of the South-to-North Water Diversion Project	HUANG Piao-yi, XU Bin, GUO Dong-liang (1046)
Spatio-Temporal Patterns and Environmental Risk of Endocrine Disrupting Chemicals in the Liuxi River	FAN Jing-jing, WANG Sai, TANG Jin-peng, <i>et al.</i> (1053)
Fate and Origin of Major Ions in River Water in the Lhasa River Basin, Tibet	ZHANG Qing-hua, SUN Ping-an, HE Shi-yi, <i>et al.</i> (1065)
Identification of Nitrate Sources and the Fate of Nitrate in Downstream Areas: A Case Study in the Taizi River Basin	LI Yan-li, YANG Zi-rui, YIN Xi-jie, <i>et al.</i> (1076)
Sources, Distribution of Main Controlling Factors, and Potential Ecological Risk Assessment for Heavy Metals in the Surface Sediment of Hainan Island North Bay, South China	ZENG Wei-te, YANG Yong-peng, ZHANG Dong-qiang, <i>et al.</i> (1085)
Characteristics of Heavy Metals Pollution of Farmland and the Leaching Effect of Rainfall in Tianjin	XU Meng-meng, LIU Ai-feng, SHI Rong-guang, <i>et al.</i> (1095)
Seasonal Difference in Water Quality Between Lake and Inflow/Outflow Rivers of Lake Taihu, China	ZHA Hui-ming, ZHU Meng-yuan, ZHU Guang-wei, <i>et al.</i> (1102)
Characteristics of Nitrogen Release at the Sediment-Water Interface in the Typical Tributaries of the Three Gorges Reservoir During the Sensitive Period in Spring	LI Xin, SONG Lin-xu, JI Dao-bin, <i>et al.</i> (1113)
Spatial Distributions of Transferable Nitrogen Forms and Influencing Factors in Sediments from Inflow Rivers in Different Lake Basins	ZHOU Rui, YUAN Xu-yin, Marip Ja Bawk, <i>et al.</i> (1122)
Effects of Hydrological and Meteorological Conditions on Diatom Proliferation in Reservoirs	SUN Xiang, ZHU Guang-wei, DA Wen-yi, <i>et al.</i> (1129)
Vertical Distribution of Fungal Community Composition and Water Quality During the Deep Reservoir Thermal Stratification	SHANG Pan-lu, CHEN Sheng-nan, HUANG Ting-lin, <i>et al.</i> (1141)
Community Structure and Influencing Factors of Bacterioplankton in Spring in Zhushan Bay, Lake Taihu	XUE Yin-gang, LIU Fei, SUN Meng, <i>et al.</i> (1151)
Characteristics of Sediment Oxygen Demand in a Drinking Water Reservoir	SU Lu, HUANG Ting-lin, LI Nan, <i>et al.</i> (1159)
Effects of Wastewater Nitrogen Concentrations and NH ₄ ⁺ /NO ₃ ⁻ on Nitrogen Removal Ability and the Nitrogen Component of <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verde	MA Yong-fei, YANG Xiao-zhen, ZHAO Xiao-hu, <i>et al.</i> (1167)
Effect of Nutrient Loadings on the Regulation of Water Nitrogen and Phosphorus by <i>Vallisneria natans</i> and Its Photosynthetic Fluorescence Characteristics	ZHOU Yi-wen, XU Xiao-guang, HAN Rui-ming, <i>et al.</i> (1180)
Removal of Organic Matter from Water by Chemical Preoxidation Coupled with Biogenic Manganese Oxidation	JIAN Zhi-yu, CHANG Yang-yang, WANG Li-xin, <i>et al.</i> (1188)
Treating Simulated Dye Wastewater by an <i>In Situ</i> Copper Ferrite Process	HAN Zhi-yong, HAN Kun, HAO Hao-tian, <i>et al.</i> (1195)
Experiment to Enhance Catalytic Activity of α -FeOOH in Heterogeneous UV-Fenton System by Addition of Oxalate	MIAO Xiao-zeng, DAI Hui-wang, CHEN Jian-xin, <i>et al.</i> (1202)
Fabrication of a Biomass-Based Hydrous Zirconium Oxide Nanocomposite for Advanced Phosphate Removal	QIU Hui, QIN Zhi-feng, LIU Feng-ling, <i>et al.</i> (1212)
Characteristic of Nitrate Adsorption in Aqueous Solution by Iron and Manganese Oxide/Biochar Composites	ZHENG Xiao-qing, WEI An-lei, ZHANG Yi-xuan, <i>et al.</i> (1220)
Preparation of PAAm/HACC Semi-Interpenetrate Network Hydrogel and Its Adsorption Properties for Humic Acid from Aqueous Solution	LIU Ze-jun, ZHOU Shao-qi, MA Fu-zhen (1233)
Groundwater Arsenic and Silicate Adsorption on TiO ₂ and the Regeneration of TiO ₂	MA Wen-jing, YAN Li, ZHANG Jian-feng (1241)
Removal Efficiency and Mechanism of Removal by Humic Acid of the Integrated Flocc-ultrafiltration Process	LI Wen-jiang, YU Li-fang, MIAO Rui, <i>et al.</i> (1248)
Emission Inventory of Greenhouse Gas from Urban Wastewater Treatment Plants and Its Temporal and Spatial Distribution in China	YAN Xu, QIU De-zhi, GUO Dong-li, <i>et al.</i> (1256)
Start-up and Operation of Biofilter Coupled Nitrification and CANON for the Removal of Iron, Manganese and Ammonia Nitrogen	LI Dong, CAO Rui-hua, YANG Hang, <i>et al.</i> (1264)
Analysis of CANON Process Start-up with Fiber Carrier	GU Cheng-wei, CHEN Fang-min, LI Xiang, <i>et al.</i> (1272)
Characteristics of Biofilm During the Transition Process of Complete Nitrification and Partial Nitrification	ZHAO Qing, BIAN Wei, LI Jun, <i>et al.</i> (1278)
Effect of Intermediate-Setting Aeration on the CANON Granular Sludge Process in the AUSB Reactor	CHENG Shuo, LI Dong, ZHANG Jie, <i>et al.</i> (1286)
Effect of Organic Carbon Source on Start-up and Operation of the CANON Granular Sludge Process	LI Dong, WANG Yan-ju, LÜ Yu-feng, <i>et al.</i> (1294)
Start-Up and Regional Characteristics of a Pilot-scale Integrated PN-ANAMMOX Reactor	ZHOU Zheng, WANG Fan, LIN Xing, <i>et al.</i> (1301)
Effect of NO _x ⁻ -N Recycling Ratio on Denitrifying Phosphorus Removal Efficiency in the ABR-MBR Combined Process	LÜ Liang, YOU Wen, ZHANG Min, <i>et al.</i> (1309)
Effects of Magnetic Fe ₃ O ₄ Nanoparticles on the Characteristics of Anaerobic Granular Sludge and Its Interior Microbial Community	SU Cheng-yuan, ZHENG Peng, LU Yu-xiang, <i>et al.</i> (1316)
Characterization Composition of Soluble Microbial Products in an Aerobic Granular Sludge System	YANG Dan, LIU Dong-fang, DU Li-qiong, <i>et al.</i> (1325)
Influence of Ciprofloxacin on the Microbial Community and Antibiotics Resistance Genes in a Membrane Bioreactor	DAI Qi, LIU Rui, LIANG Yu-ting, <i>et al.</i> (1333)
Analysis of Low C/N Wastewater Treatment and Structure by the CEM-UF Combined Membrane-Nitrification/Denitrification System	XING Jin-liang, ZHANG Yan, CHEN Chang-ming, <i>et al.</i> (1342)
Effects of Phosphorus on the Activity and Bacterial Community in Mixotrophic Denitrification Sludge	WANG Pei-qi, ZHOU Wei-li, HE Sheng-bing, <i>et al.</i> (1350)
Acclimatization and Community Structure Analysis of the Microbial Consortium in Nitrate-Dependent Anaerobic Methane Oxidation	XUE Song, ZHANG Meng-zhu, LI Lin, <i>et al.</i> (1357)
Diffusion of Microorganism and Main Pathogenic Bacteria During Municipal Treated Wastewater Discharged into Sea	XU Ai-ling, NIU Cheng-jie, SONG Zhi-wen, <i>et al.</i> (1365)
Oxytetracycline Wastewater Treatment in Microbial Fuel Cells and the Analysis of Microbial Communities	YAN Wei-fu, XIAO Yong, WANG Shu-hua, <i>et al.</i> (1379)
Spatial and Temporal Variability of Soil C-to-N Ratio of Yugan County and Its Influencing Factors in the Past 30 Years	JIANG Ye-feng, ZHONG Shan, LI Jie, <i>et al.</i> (1386)
Spatial Heterogeneity of Soil Carbon and its Fractions in the Wolfberry Field of Zhongning County	WANG You-qi, ZHAO Yun-peng, BAI Yi-ru, <i>et al.</i> (1396)
Response of Soil Enzyme Activities and Their Relationships with Physicochemical Properties to Different Aged Coastal Reclamation Areas, Eastern China	XIE Xue-feng, PU Li-jie, WANG Qi-qi, <i>et al.</i> (1404)
Distribution, Sources, and Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Soils of the Central and Eastern Areas of the Qinghai-Tibetan Plateau	ZHOU Wen-wen, LI Jun, HU Jian, <i>et al.</i> (1413)
Source Apportionment of Heavy Metals in Farmland Soils Around Mining Area Based on UNMIX Model	LU Xin, HU Wen-you, HUANG Biao, <i>et al.</i> (1421)
Stabilization Effects of Fe-Mn Binary Oxide on Arsenic and Heavy Metal Co-contaminated Soils Under Different pH Conditions	FEI Yang, YAN Xiu-lan, LI Yong-hua (1430)
Concentration and Distribution of Novel Brominated Flame Retardants in Human Serum from Three Chinese Cities	WANG Qing-hua, YUAN Hao-dong, JIN Jun, <i>et al.</i> (1438)