

环境科学

(HUANJING KEXUE)

ENVIRONMENTAL SCIENCE

第39卷 第6期

Vol.39 No.6

2018

中国科学院生态环境研究中心 主办
科学出版社 出版



目次

北京市二次有机气溶胶生成潜势的日变化规律 刘俊, 楚碧武, 贺泓 (2505)

太原冬季 PM_{2.5} 影响霾污染的关键尺度谱特征 杨素英, 余欣洋, 赵秀勇, 李义宇, 孙洪娉, 田芷洁, 李岩, 吴尚, 王梓航 (2512)

盘锦市冬季 PM_{2.5} 水溶性离子特征及来源分析 张蕾, 姬亚芹, 王士宝, 赵静琦, 张军, 李越洋, 张伟 (2521)

广州市天河区 2016 年雨季挥发性有机物污染特征及来源解析 古颖纲, 虞小芳, 杨闻达, 田智林, 李梅, 程鹏 (2528)

热带树木燃烧颗粒物中脱水糖和醋非烯的排放特征 金诚妙, 崔敏, 韩勇, 陈颖军, 唐娇, 李军, 张干 (2538)

天津地区污染天气分析中垂直扩散指标构建及运用 蔡子颖, 韩素芹, 张敏, 姚青, 刘敬勇 (2548)

亚热带农田和林地大气氨湿沉降与混合沉降比较 朱潇, 王杰飞, 沈健林, 肖润林, 王娟, 吴金水, 李勇 (2557)

京津冀地区黄标车政策的总量减排效益评估 卢亚灵, 周佳, 程曦, 张伟, 蒋洪强 (2566)

北京北运河河流生态系统健康评价 顾晓昀, 徐宗学, 刘麟菲, 殷旭旺, 王汨 (2576)

长江武汉段丰水期水体和沉积物中多环芳烃及邻苯二甲酸酯类有机污染物污染特征及来源分析 董磊, 汤显强, 林莉, 邴超, 黎睿, 吴敏 (2588)

福建省敖江下游抗生素抗性基因分布特征 张丹丹, 郭亚平, 任红云, 周昕原, 黄福义, 张娴 (2600)

三峡库区支流河口沉积物重金属分布特征及风险评价 方志青, 陈秋禹, 尹德良, 王志康, 孙涛, 王永敏, 谢德体, 王定勇 (2607)

三峡水库蓄水至 175 m 后干流沉积物理化性质与磷形态分布特征 潘婵娟, 黎睿, 汤显强, 夏振尧, 李青云, 杨文俊, 许文年 (2615)

基于水化学和稳定同位素的白洋淀流域地表水和地下水硝酸盐来源 孔晓乐, 王仕琴, 丁飞, 梁慧雅 (2624)

天目湖沙河水库热分层变化及其对水质的影响 孙祥, 朱广伟, 笄文怡, 余茂蕾, 杨文斌, 朱梦圆, 许海, 国超旋, 余丽, 李恒鹏, 李慧贇 (2632)

重庆雪玉洞洞穴滴水水文地球化学时空变化特征及其环境意义 曾泽, 蒋勇军, 吕现福, 曾思博, 胡刘焯, 雷佳琪 (2641)

岩溶地表河旱季有色溶解有机质组成及来源: 以金佛山碧潭河为例 刘跃, 贺秋芳, 刘宁坤, 刘九程, 王正雄, 段世辉 (2651)

托来河流域不同海拔降水稳定同位素的环境意义 李永格, 李宗省, 冯起, 肖莲桂, 吕越敏, 桂娟, 袁瑞丰, 张百娟 (2661)

五里峡水库初级生产力对水气界面二氧化碳和甲烷排放速率时空变化的影响 彭文杰, 李强, 宋昂, 靳振江 (2673)

西南山区典型河道型水库藻类功能群时空演替特征及其影响因素: 以紫坪铺水库为例 张耀文, 李洪, 李嘉, 宋洋, 张陵蕾, 李永, 蒲迅赤, 黄文典 (2680)

四明湖水库浮游植物功能类群的季节演替及其影响因子 郑诚, 陆开宏, 徐镇, 郑志明, 朱津永 (2688)

营养盐添加对水华蓝藻——卵孢金胞藻生长和竞争影响的原位实验 王梦梦, 张玮, 张军毅, 尚光霞, 杜彩丽, 王丽卿 (2698)

植物配置与进水碳氮比对沉水植物塘水质净化效果的影响 刘森, 陈开宁 (2706)

江汉平原水稻灌排单元沟渠中氮磷变化特征及其环境风险 华玲玲, 张富林, 翟丽梅, 刘宏斌, 范先鹏, 王洪霞 (2715)

冀西北典型北方小城镇污水处理厂中抗生素的分布和去除 柴玉峰, 张玉秀, 陈梅雪, 王瑞, 柳蒙蒙, 郑嘉熹, 魏源送 (2724)

臭氧-粉末炭联用作为预处理缓解膜污染的效果与机制 董秉直, 高昊旸, 胡孟柳 (2732)

中试 SAD-ASBR 系统处理含盐废水的启动与工艺特性 于德爽, 唐佳佳, 张军, 王晓霞, 赵红, 韩长民, 孙捷 (2740)

海藻酸钙/聚 N-异丙基丙烯酰胺半互穿网络凝胶球的除磷性能 曾学阳, 骆华勇, 张耀坤, 荣宏伟, 曾子君, 钟广汇 (2748)

玉米淀粉废水短程硝化快速启动及其稳定性 龙北生, 刘迅雷, 刘红波, 杨靖新, 袁树森 (2756)

硝化细菌的培养及包埋固定化中试 杨宏, 胡银龙 (2763)

不同运行策略下厌氧氨氧化的脱氮性能 安芳娇, 彭永臻, 董志龙, 邵兆伟, 赵智超, 黄剑明, 陈永志 (2770)

高含固污泥厌氧消化中蛋白质转化规律 詹瑜, 施万胜, 赵明星, 许之扬, 阮文权, 宋联, 朱葛 (2778)

污泥富磷堆肥前后重金属赋存形态及释放能力变化 李玉, 方文, 祁光霞, 魏勇红, 刘建国, 李润东 (2786)

丝状菌污泥膨胀对脱氮除磷功能菌群的影响 高晨晨, 游佳, 陈轶, 郑兴灿, 尚巍, 张文安 (2794)

同步去除并富集磷酸盐生物膜驯化过程中微生物种群分析 孟璇, 潘杨, 章豪, 廖恒弘, 徐林建, 冯鑫, 单捷 (2802)

四环素对人粪便好氧堆肥过程及微生物群落演替的影响 时红蕾, 王晓昌, 李倩, 刘源 (2810)

长期定位有机物料还田对关中平原夏玉米-冬小麦轮作土壤 NO 排放的影响 袁梦轩, 王晋峰, 谭跃慧, 魏静, 杨学云, 顾江新 (2819)

菌渣还田量对紫色水稻土净温室气体排放的影响 祁乐, 高明, 周鹏, 王富华, 高泳钦, 陈仕奇, 吴思琪, 邓静霖, 文婷 (2827)

¹³C 脉冲标记法定量冬小麦光合碳分配及其向地下的输入 孙昭安, 陈清, 韩笑, 吴文良, 孟凡乔 (2837)

西南喀斯特区植被恢复对土壤氮素转化通路的影响 杨怡, 欧阳运东, 陈浩, 肖孔操, 李德军 (2845)

江苏海岸带土壤重金属来源解析及空间分布 吕建树, 何华春 (2853)

黄河下游典型区域土壤重金属来源解析及空间分布 于元赫, 吕建树, 王亚梦 (2865)

典型小城市土壤重金属空间异质性及风险评价: 以临安市为例 郑晴之, 王楚栋, 王诗涵, 林子也, 赵科理, 吴东涛, 傅伟军 (2875)

西南某铅锌矿区农田土壤重金属空间主成分分析及生态风险评价 周艳, 陈楠, 邓绍坡, 王金忠, 张胜田, 龙涛, 李群, 林玉锁, 吴运金 (2884)

典型山核桃产区土壤重金属空间异质性及风险评价 张红桔, 赵科理, 叶正钱, 许斌, 赵伟明, 顾晓波, 张华锋 (2893)

生物炭添加对湿地植物生长及氧化应激响应的影响 黄磊, 陈玉成, 赵亚琦, 肖广全, 杨志敏 (2904)

厌氧条件水稻土铁对砷释放的影响 王欣, 钟松雄, 陈志良, 何宏飞, 董家华, 陈晓丽 (2911)

矿业活动影响区稻田土壤和稻米中重金属含量及健康风险 田美玲, 钟雪梅, 张云霞, 余元元, 庞瑞, 周浪, 宋波 (2919)

硅酸钙和生物腐殖肥复配对葱生长和镉吸收的影响 刘德玲, 尹光彩, 陈志良, 林亲铁, 刘千钧, 钟松雄, 黄玲, 张建强 (2927)

吉林四平设施土壤和蔬菜中重金属的累积特征 李莲芳, 朱昌雄, 曾希柏, 李红娜, 叶婧, 李峰, 吴翠霞 (2936)

喷施锌肥对油菜镉生物可给性的影响 王林, 谷朋磊, 李然, 徐应明, 孙约兵, 梁学峰, 代晶晶 (2944)

贵州草海底栖动物汞分布及其对沉积物汞的响应特征 许议元, 曾玲霞, 何天容, 陈梦瑜, 钱晓莉, 李振吉 (2953)

废旧轮胎翻新过程中多环芳烃排放及健康风险 付建平, 赵波, 黎玉清, 刘沙沙, 尹文华, 黄锦琼, 周长风, 张素坤, 贺德春, 韩静磊 (2963)

县级尺度的重庆市碳排放时空格局动态 孙秀峰, 施开放, 吴健平 (2971)

颗粒尺寸对纳米氧化物环境行为的影响 严玉鹏, 唐亚东, 万彪, 王小明, 刘凡, 冯雄汉 (2982)

防晒剂的海洋环境行为与生物毒性 朱小山, 黄静颖, 吕小慧, 杜永芬, 蔡中华 (2991)

《环境科学》征订启事 (2527) 《环境科学》征稿简则 (2723) 信息 (2826, 2852, 2910)

北京市二次有机气溶胶生成潜势的日变化规律

刘俊^{1,2}, 楚碧武^{2,3,4*}, 贺泓^{2,3,4}

(1. 华北电力大学环境科学与工程学院, 北京 102206; 2. 中国科学院生态环境研究中心, 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室, 北京 100085; 3. 中国科学院城市环境研究所, 中国科学院区域大气环境研究卓越创新中心, 厦门 361021; 4. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049)

摘要: 二次有机气溶胶 (secondary organic aerosol, SOA) 是大气细粒子 (PM_{2.5}) 的重要组成部分. 研究实际大气 SOA 生成潜势的日变化规律对于认知 SOA 生成转化机制及其对大气细粒子污染的影响具有重要意义. 首次使用氧化流动管反应器 (oxidation flow reactor, OFR) 研究了北京夏季城市大气 SOA 生成潜势的日变化规律, 利用高浓度的羟基自由基 ($\cdot\text{OH}$) 氧化进入反应器内的环境空气, 直接测定 SOA 的生成潜势. 结果表明, 一天内, SOA 生成潜势的小时均值在 3.9~9.4 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ 范围内变化, 呈现夜间高白天低的趋势, 在 16:00 左右达到最低. SOA 生成潜势和甲苯等城市典型挥发性有机物 (volatile organic compounds, VOCs) 变化趋势一致, 而和臭氧浓度反相关. 实验结果表明, 除了边界层高度变化影响污染物浓度进而影响 SOA 生成潜势以外, 夏季白天强烈的光化学反应导致环境大气 VOCs 的消耗, 对降低环境气体白天的 SOA 生成潜势值也有重要影响. 同国外同类研究相比, 北京环境大气由于具有更高的 VOCs 浓度, 其 SOA 生成潜势要明显高于其他地区, 可能对北京地区细颗粒物污染具有重要贡献.

关键词: 二次有机气溶胶 (SOA); 挥发性有机物 (VOCs); 生成潜势; 氧化流动管反应器 (OFR); 日变化规律

中图分类号: X513 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2018)06-2505-07 DOI: 10.13227/j.hjxx.201711112

Diurnal Variation of SOA Formation Potential from Ambient Air at an Urban Site in Beijing

LIU Jun^{1,2}, CHU Bi-wu^{2,3,4*}, HE Hong^{2,3,4}

(1. College of Environmental Science and Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China; 2. State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 3. Center for Excellence in Regional Atmospheric Environment, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China; 4. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Secondary organic aerosol (SOA) is an important component of atmospheric fine particles (PM_{2.5}). The study of the diurnal variation of SOA formation potential is important for understanding the evolution of SOA and its contribution to fine particle pollution. The oxidation flow reactor (OFR) was used to study the SOA formation potential of ambient air in summer at an urban site in Beijing. The high concentration of OH radicals in the reactor can oxidize the volatile organic compounds (VOCs) and lead to SOA formation. The hour average SOA formation potential varied between 3.9-9.4 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ in a day and had a higher value at night than in the daytime. The lowest value of SOA formation potential was about 3.9 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ observed at 16:00 in the afternoon. This variation of SOA formation potential is consistent with the typical VOCs, such as toluene, and inversely related to the concentration of ozone. In addition to the impact of change in the height of the boundary layer, experimental data showed that the reduction of VOCs in photo-oxidation in the daytime was an important reason for the decrease of SOA formation potential in daytime. Compared to similar studies in developed countries, the SOA formation potential was higher in Beijing due to the higher concentrations of VOCs and might make an important contribution to the fine particle pollution in Beijing.

Key words: secondary organic aerosol (SOA); volatile organic compounds (VOCs); formation potential; oxidation flow reactor (OFR); diurnal variation

二次有机气溶胶 (secondary organic aerosol, SOA) 是城市地区大气细粒子 (PM_{2.5}) 的重要组成部分^[1,2], 能够严重影响气候变化、人类健康等^[3,4]. 它是由人为源和天然源排放的挥发性有机物 (volatile organic compounds, VOCs) 或半挥发性有机物经过复杂的大气物理化学过程而形成的^[5,6]. 目前, 已检测到的前体物 VOCs 就有 10 000 ~ 100 000

种, 他们中绝大部分可以通过大气氧化途径生成 SOA^[7,8]. 因此, SOA 的化学组成和生成过程成为

收稿日期: 2017-11-13; 修订日期: 2017-12-06

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2016YFC0202700); 国家自然科学基金项目 (21407158, 41673004); 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室专项 (17L01ESPC)

作者简介: 刘俊 (1991~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为非均相大气化学, E-mail: eptval@163.com

* 通信作者, E-mail: bwchu@cees.ac.cn

大气细颗粒物研究最大的难点^[9], 其中估算环境大气的 SOA 生成对于认知 SOA 生成转化机制及其对大气细粒子污染的影响具有重要意义。

SOA 生成潜势(SOA formation potential)是指一定量的 VOCs 经氧化后能生成的最大 SOA 的量^[10], 可以通过各种方法间接估算, 也可以直接测定。目前, 国内外间接估算 SOA 生成潜势的方法主要有: 气溶胶生成系数法^[11,12]、气溶胶产率法^[13,14]、挥发性基组法^[15,16]。Kang 等^[10,17]发展起来的一种颗粒物氧化流动管反应器(oxidation flow reactor, OFR)可以直接测定 SOA 的生成潜势, 这种方法将待测 VOCs 通入含有高浓度羟基自由基($\cdot\text{OH}$)的 OFR 内反应, 然后直接利用气溶胶质谱仪(aerosol mass spectrometer, AMS)测定生成的 SOA 质量浓度, 通过改变 $\cdot\text{OH}$ 浓度使生成的 SOA 量最大, 此时的 SOA 生成量即为此 VOCs 的 SOA 生成潜势。相对于烟雾箱系统来说, OFR 通过短时间的氧化即可模拟提供几天甚至几周的老化过程, 可以研究 VOCs 氧化的二代甚至多代反应, 且可以连续观测外场环境大气 SOA 生成潜势的变化特征。OFR 现已被大量应用于实验室研究^[18~21], 并且逐步应用于外场观测^[22,23]。

城市地区污染情况相对比较复杂。在北京城市地区, 亚微米气溶胶 PM_{10} 的主要成分是有有机物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐, 其中有机气溶胶(organic aerosol, OA)占比 31%~57%^[24]。OA 在 PM_{10} 中的占比随季节变化特征明显, 比如在夏季占~30%, 在冬季占~60%^[24]。但是, SOA 在 OA 中的占比则刚好相反, 夏季为 45%~67%, 冬季为 22%~50%, 这表明了 SOA 在夏季 OA 组成中的重要地位。夏季与冬季相比有更强烈的光照, 更高浓度的大气氧化剂, 这些因素可能促进了前体物 VOCs 向 SOA 的转化, 从而导致夏季 SOA 在 OA 中的占比更高。研究夏季 SOA 的生成潜势, 探索 SOA 生成潜势的时间变化规律对于理解北京市的 SOA 污染状况, 控制 SOA 生成潜势的影响因素, 以及 SOA 生成对北京细颗粒物污染的影响具有重要意义。本实验利用 OFR 首次研究了北京市夏季环境大气的 SOA 生成潜势, 分析了 SOA 生成潜势的日变化规律, 并且讨论了可能的影响因素。

1 材料与方法

1.1 采样点设置

外场实验采样点设置在中国科学院生态环境研究中心综合楼楼顶, 采样点距离双清路 200 m, 在

奥体中心国控点西北约 5 km 处, 附近无大的污染源, 是一个典型的城市采样点。为了减少 VOCs 的气相损失, 采样管路及连接部分均采用聚四氟乙烯材质, 长度约 5 m, 内径 2.5 cm。通过将采样泵采样流量设置为 $200 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$, 减少采样空气在管路中的停留时间, 最大限度地减少 VOCs 组分的损失。在采样泵入口前端引一路采样气进入反应器, 通过反应器出口的尾气泵控制进入反应器的采样气流量为 $6.6 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$, 其余排空。采样周期为 2017 年 5 月 1 日至 9 月 30 日, 包括整个夏季。排除维护仪器、校准反应器老化时间等耗费的时间, 用于外场观测的有效时长为 112 d, 占整个采样周期的 3/4。采样的时间分辨率为 1 h, 总采样时间为 2 688 h。

1.2 OFR

OFR 由 Kang 等^[10,17]首次提出并应用, 通过光解加入反应器的臭氧产生比实际大气高几百倍甚至几千倍的 $\cdot\text{OH}$ 浓度, 其能在非常短的停留时间(几十秒到几分钟)模拟相当于在实际大气环境下几天甚至几周的老化过程, 因此主要用来研究 VOCs 及 SOA 的老化过程。本研究采用由两个体积均为 15 L 的不锈钢圆筒组成的孪生 OFR, 实验系统如图 1 所示。OFR 内的环境空气与经加湿的臭氧一起进入反应器, 臭氧经臭氧发生器产生, 流量控制在 $1.2 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$ 。在反应器出口设置有尾气泵, 其前端通过质量流量计调节经过尾气泵的流量。本实验中通过反应器的气体总流量为 $7.8 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$ (包括臭氧和环境空气)。经计算, 反应器内流体状态为层流(雷诺数 < 100)。每个 OFR 长 50 cm, 内径 20 cm, 且前端安装有一段长 30 cm、内径 6 cm 的混合管以保证采样空气在进入反应器前充分混合, 反应器内壁有一层特氟龙内衬以减少反应器壁的反应性。两个反应器内均安装有 4 根 254 nm 紫外线低压汞灯, 其中一个开启紫外灯作为氧化流化管潜势反应器(称为 OFR), 另一个不开紫外灯作为背景对照(称为 Bypass 反应器)。除此之外, 两个反应器其它条件均保持一致。反应器内外壁之间通入循环冷却水, 通过调节循环水流量以保证两个反应器内温度都在 $24 \sim 26^\circ\text{C}$ 范围内, 并且调节加湿器保证反应器内湿度在 30%~40% 范围内。反应器温湿度通过安装在反应器内出口旁的温湿度探头实时测定。在实验期间, 由电脑控制三通电磁阀切换气体样品间断进入 OFR 和 Bypass 反应器, 每 30 min 切换一次。由于采样空气在反应器内的停留时间很短($\sim 115 \text{ s}$), 同时通过 Bypass 反应器的对照, 可以忽略气相





图 1 OFR 实验系统

Fig. 1 Oxidation flow reactor system

和颗粒相的壁损失对 SOA 生成的影响。

在 254 nm 紫外线的照射下, 臭氧和加入的水分会发生如下反应[式(1)和(2)]产生氧化剂·OH:



反应器内老化时间等于·OH浓度乘以反应器平均停留时间, 相当于在实际大气环境中老化的时间, 通过 SO_2 经过 OFR 前后的衰减量进行估算^[22,25]. 计算方法如式(3)所示. 反应器内的·OH浓度计算方法如式(4)所示. 为排除由于紫外灯老化造成的影响, 本研究中, 每月定期用 SO_2 通入反应器测算实验系统的老化时间(aging time, AT).

$$\text{AT}(\text{s}) = \frac{\ln([\text{SO}_2]_{\text{Bypass}}/[\text{SO}_2]_{\text{OFR}})}{k_{\text{SO}_2+\cdot\text{OH}} \times [\cdot\text{OH}]_{\text{air}}} \quad (3)$$

$$[\cdot\text{OH}]_{\text{OFR}} = \frac{\ln([\text{SO}_2]_{\text{Bypass}}/[\text{SO}_2]_{\text{OFR}})}{k_{\text{SO}_2+\cdot\text{OH}} \times t_r} \quad (4)$$

式中, $[\text{SO}_2]_{\text{Bypass}}$ 表示经过 Bypass 反应器的 SO_2 浓度, $[\text{SO}_2]_{\text{OFR}}$ 表示经过 OFR 的 SO_2 浓度, $k_{\text{SO}_2+\cdot\text{OH}}$ 表示 SO_2 与·OH 的反应速率常数, $[\cdot\text{OH}]_{\text{air}}$ 表示环境大气中·OH 的平均浓度, 本研究中取为 $1.5 \times 10^6 \text{ molecules} \cdot \text{cm}^{-3}$ ^[26], t_r 为环境大气在反应器中的停留时间, 本研究中为 115 s.

1.3 仪器

高分辨飞行时间气溶胶质谱仪(HR-ToF-AMS, AMS, 美国 Aerodyne 公司)可以测定非难熔颗粒相的有机物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐和氯盐. 本实验中利用 AMS 测定 OFR 内生成的 SOA, 时间分辨率为 3 min. AMS 测量的是颗粒物中的非难熔组分. 气溶胶粒子进入 AMS 到达热蒸发器(温度约 873K)后, 沸点在此温度以下的物质能被蒸发后通过 EI 的方式电离为碎片离子, 再通过质谱检测器检测. 对于有机分子来说, 基本都能被电离并检测到. 将 AMS 的收集效率设置为 0.5^[27,28]. 扫描电迁移率颗

颗粒物粒径谱仪(SMPS, 美国 TSI 公司, 型号 3082)由差分电迁移率分析仪(DMA, 美国 TSI 公司, 型号 3081A)和冷凝颗粒物计数器(SMPS, 美国 TSI 公司, 型号 3776)构成, 用来测定总的 PM_{10} 质量浓度, 时间分辨率为 5 min. 在仪器标定和实验数据的处理中, 利用 SMPS 和 AMS 同时测量硝酸铵或者 SOA 的浓度来校准 AMS 数值, 减少 SOA 质量浓度测量的不确定性. 臭氧、一氧化碳、氮氧化物和二氧化硫浓度分别利用美国 Thermo Fisher 的臭氧分析仪(49i-LTE)、一氧化碳分析仪(48i-TLE)、氮氧化物分析仪(42iTL)和二氧化硫分析仪(43i)进行测定, 时间分辨率为 1 min. VOCs 浓度利用质子转移反应飞行时间质谱仪(PTR-ToF-MS, 奥地利 Ionicon 公司)测定, 时间分辨率为 5 min.

2 结果与讨论

2.1 老化时间对 SOA 生成潜势的影响

环境空气在 OFR 内经·OH氧化之后质量增加的部分, 即相对于 Bypass 反应器增加的部分即为二次颗粒物生成量, 其中 OA 增加的部分即为 SOA 生成($\text{SOA 生成量} = \text{OA}_{\text{OFR}} - \text{OA}_{\text{Bypass}}$). 实验结果表明, OFR 中的 90% 以上的二次颗粒物生成成为 SOA, 这可能和 OFR 高浓度的·OH环境以及气相反应对二次无机颗粒物的生成贡献有限有关.

老化时间是影响 SOA 生成量的重要因素. 在外场观测实验中, 为了最大化 OFR 内 SOA 生成量, 测得 SOA 生成潜势, 需要确定和选择外场条件下 SOA 生成的最佳老化时间. 在观测之前, 通过预实验测量了外场条件下北京大气在不同老化时间下的 SOA 生成量, 如图 2 所示. 从中可以看出, SOA 生成量随老化时间的增加先增加后减少. 在 SOA 生成量增加阶段, 主要以加氧反应为主, 含氧官能团逐渐增加; 在生成量减少阶段, 过长的老化时间会使颗粒相有机物碳碳键发生断裂, 从而形成小分子强挥发性物质进入到气相中^[18,29], 使得颗粒相质量损失. 从而存在最佳的老化时间使得 SOA 生成量最大, 最大的 SOA 生成量即为 SOA 的生成潜势. SOA 生成量的变化除了来自前体物 VOCs 的氧化, 还可能受 OA 继续氧化的影响. 然而, 根据 OFR 实验中 AMS 测量的 OA 粒径谱, SOA 生成主要来源于小于 100 nm 的新生成颗粒物的贡献, 已有的 OA 在 OFR 中的继续氧化对其质量的影响可以忽略^[30]. 因此, 在本实验条件下可以忽略 OA 的继续老化对 SOA 生成潜势的影响, 只考虑前体物 VOCs 对 SOA




图2 北京大气 SOA 生成量与老化时间的关系

Fig. 2 Relationship between SOA formation and aging time in urban Beijing

生成潜势的贡献。

根据实验结果,当老化时间达到 12 d 左右时,北京大气的 SOA 生成量达到最大。而在洛杉矶城市大气中利用 OFR 开展外场实验的结果显示,当老化时间在 0.8 ~ 6 d 时 SOA 生成量最大^[23],其他外场环境中进行的 OFR 实验也显示当 SOA 生成量最大时老化时间可能在 2 ~ 3 d^[31]、0.4 ~ 1.5 d^[30]等范围内变化。北京大气 SOA 生成最大时的老化时间明显高于发达国家,这可能是由于不同环境大气中的 VOCs 组成及浓度水平存在差异,将在另一篇文章中进行详细讨论。根据测量结果,为保证 SOA 的生成量达到最大,本实验中将 OFR 内的老化时间控制在 12 d 左右。

2.2 SOA 生成潜势的时间变化规律

北京大气 SOA 生成量随测量时间变化明显。图 3(a) 显示了 7 月 26 ~ 28 日的一段测量结果,从中可以看出 SOA 生成潜势在 7 月 27 日 04:00 和 7 月 28 日 0:00 左右出现两个明显峰值,呈现夜间高白天低的变化趋势,这与 Ortega 等^[23]报道的结果一致。图 3(b) 显示 OA 也呈现夜间高白天低的趋势,其中一个原因可能是由于大气边界层厚度在夜间压缩变薄使污染物聚集,因此导致了夜间污染物的水平高于白天^[32],这将在后面进行更详细地讨论。

通过分析 2017 年 5 月 1 日至 9 月 30 日期间的全部外场数据,统计了整个夏天 SOA 生成潜势的日变化规律,如图 4(a) 所示。结果显示夏季 SOA 生成潜势均值在 $3.9 \sim 9.4 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ 范围内变化,并且呈现夜间高白天低的趋势。Ortega 等^[23]在洛杉矶进行的 OFR 实验结果也显示相同的 SOA 生成潜势昼夜变化规律,由于洛杉矶特殊的气象条件,其认为洛杉矶 SOA 生成潜势的昼夜变化可能主要受传





图3 典型污染物随时间的变化趋势

Fig. 3 Trends of typical pollutants over time

输控制。北京夏季的昼夜风向无明显变化规律,SOA 生成潜势可能主要受大气 VOCs 的氧化程度的影响。为排除边界层高度变化对 SOA 生成潜势的影响,本研究使用一氧化碳(CO)作为背景浓度示踪物^[33],用 SOA 生成潜势与 CO 的比值表征 SOA 生成潜势的变化,如图 4(b) 所示。结果显示排除边界层高度变化的影响后,SOA 生成潜势仍然显示出夜间高白天低的趋势,这表明除了边界层高度变化这个因素外还有其他因素影响 SOA 生成潜势。

在 16:00 左右,SOA 生成潜势达到最低点 ($\sim 3.9 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$),同时伴随 O_3 浓度达到峰值,如图 5(a) 所示,表明 SOA 生成潜势可能受光化学反应的影响。受强烈光化学反应的影响,这个阶段环




箱形图的 5 个特征点从上到下分别表示 95%、75%、中位数、25%、5% 的数值点,中间实心方点表示数据的平均值

图4 SOA 生成潜势日变化规律分析

Fig. 4 Diurnal variation analysis of SOA formation potential

境大气中 VOCs 的消耗达到最大值, 进入 OFR 的 VOCs 量相应地达到最低值, 这些 VOCs 经氧化后生成的 SOA 也因此达到低值. 所以, 图 4(a) 中出现的 SOA 潜势最低点可能是由于前体物 VOCs 浓度降低导致生成的 SOA 减少.



甲苯浓度由 PTR-ToF-MS 测定,
臭氧浓度来自于奥体中心国控点(2017 年夏季)

图 5 环境中甲苯、苯和臭氧的日变化规律

Fig. 5 Diurnal variation analysis of benzene, toluene, and ozone

2.3 VOCs 对 SOA 生成潜势的影响

苯和甲苯是人为源排放的典型代表 VOCs, 甲

苯作为 SOA 的重要前体物, 对 SOA 的生成潜势有重要影响. 观测期间, 苯和甲苯的日变化规律如图 5(b) 所示, 浓度分别在 $1.99 \sim 3.48 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ 和 $1.54 \sim 3.09 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ 之间变化, 属于 Liu 等^[34] 报道的清洁天气与轻度污染天的浓度范围, 与夏季北京多以清洁天气为主的情况一致^[35]. 苯和甲苯浓度都在 07:00 左右达到峰值, 16:00 左右达到最低点. 北京机动车排放对总 VOCs 的贡献达 36% ~ 48%^[34, 36], 交通高峰造成的机动车排放增加, 将使得 VOCs 的浓度日变化会出现双峰分布^[37]. 本实验中苯和甲苯在夜间没有出现峰值, 可能由于夜间也受边界层压缩的影响, 导致交通晚高峰时段苯和甲苯浓度总体呈上升趋势. 如图 5(c) 所示, VOCs 的浓度与 CO 的比值的日变化则显示 19:00 左右出现不明显的峰值, 说明 VOCs 的日变化的确受边界层高度变化的影响. 苯和甲苯午后出现的浓度低值则是由于夏季午后日照变强, 强烈的光化学反应使得 VOCs 消耗增加^[37, 38], 这个结果与 SOA 生成潜势的减少相一致. 另外, SOA 生成潜势与环境大气中甲苯浓度的相关关系如图 6(a) 所示, 相关系数 r^2 为 0.80, SOA 生成潜势与 OFR 中甲苯的消耗量相关关系如图 6(b) 所示, $r^2 = 0.69$, 都呈现较好的相关性. 这些结果充分说明午后 SOA 生成潜势的降低是因为夏季强烈的光化学反应使得 VOCs 消耗量增加, 从而使得 SOA 潜势随 VOCs 浓度的变化密切相关.

2.4 与国外的 SOA 生成潜势对比

Palm 等^[30] 在以单萜烯为主要 VOCs 的针叶林中进行的 OFR 实验结果显示, SOA 生成潜势均值在夜间最高为 $1.3 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$, 白天则最高为 $0.2 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$. Ortega 等^[23] 在洛杉矶城市大气中进行的 OFR 实验显示, SOA 生成潜势均值在夜间最高为




图 6 SOA 生成潜势与环境大气甲苯浓度、甲苯消耗量的相关关系

Fig. 6 Correlation between SOA formation potential and the concentration of ambient toluene or the consumption of ambient toluene

$4.0 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$, 白天则最高为 $2.0 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$. 相比北京城市大气来说, 这些地方的 SOA 生成潜势要小得多. 从影响 SOA 生成的角度分析, VOCs 起重要作用. 比如, 针叶林中 VOCs 主要是以植物排放的高活性低浓度 VOCs 为主^[30], 这些 VOCs 在大气中容易被氧化而生成 SOA, 进而使其 SOA 生成潜势降低. 与人为源排放相比, 这些 VOCs 的浓度也比较低, 能够贡献的 SOA 生成潜势也低. 同样是城市大气, 北京城市大气的 VOCs 组成与洛杉矶接近, 而在浓度上北京城市大气中 VOCs 比洛杉矶要高很多^[39~42], 这可能也是北京地区 SOA 生成潜势高的主要原因. 北京环境大气的高 SOA 生成潜势, 可能对北京地区细颗粒物污染具有重要贡献.

3 结论

(1) 基于 OFR 估算的北京夏季城市大气 SOA 生成潜势具有明显的昼夜变化特征, 除了边界层变化之外, 受白天强烈的光化学反应的影响, SOA 生成潜势显示夜间高白天低的趋势. 在较强大气氧化性导致环境大气 VOCs 消耗的情况下, SOA 生成潜势在 16:00 左右达到最低.

(2) 通过与国外的 SOA 生成潜势对比, 北京环境大气由于 VOCs 浓度高, 其 SOA 生成潜势明显高于发达国家清洁地区, 可能对北京地区细颗粒物污染具有重要贡献.

参考文献:

- [1] Huang R J, Zhang Y L, Bozzetti C, *et al.* High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China[J]. *Nature*, 2014, **514**(7521): 218-222.
- [2] 杜博涵, 黄晓峰, 何凌燕, 等. 宁波市 PM_{2.5} 中碳组分的时空分布特征和二次有机碳估算[J]. *环境科学*, 2015, **36**(9): 3128-3134.
Du B H, Huang X F, He L Y, *et al.* Seasonal and spatial variations of carbon fractions in PM_{2.5} in ningbo and the estimation of secondary organic carbon [J]. *Environmental Science*, 2015, **36**(9): 3128-3134.
- [3] 曹军骥, 李建军. 二次有机气溶胶的形成及其毒理效应[J]. *地球环境学报*, 2016, **7**(5): 431-441.
Cao J J, Li J J. Formation and toxicological effect of secondary organic aerosols [J]. *Journal of Earth Environment*, 2016, **7**(5): 431-441.
- [4] Hallquist M, Wenger J C, Baltensperger U, *et al.* The formation, properties and impact of secondary organic aerosol: current and emerging issues [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2009, **9**(14): 5155-5236.
- [5] Jimenez J L, Canagaratna M R, Donahue N M, *et al.* Evolution of organic aerosols in the atmosphere [J]. *Science*, 2009, **326**(5959): 1525-1529.
- [6] Tkacik D S, Presto A A, Donahue N M, *et al.* Secondary organic aerosol formation from intermediate-volatility organic compounds: Cyclic, linear, and branched alkanes [J]. *Environmental Science & Technology*, 2012, **46**(16): 8773-8781.
- [7] Goldstein A H, Galbally I E. Known and unexplored organic constituents in the Earth's atmosphere [J]. *Environmental Science & Technology*, 2007, **41**(5): 1514-1521.
- [8] 谢绍东, 田晓雪. 挥发性和半挥发性有机物向二次有机气溶胶转化的机制 [J]. *化学进展*, 2010, **22**(4): 727-733.
Xie S D, Tian X X. Formation mechanism of secondary organic aerosols from the reaction of volatile and semi-volatile compounds [J]. *Progress in Chemistry*, 2010, **22**(4): 727-733.
- [9] 郭松, 胡敏, 尚冬杰, 等. 基于外场观测的大气二次有机气溶胶研究 [J]. *化学学报*, 2014, **72**(2): 145-157.
Guo S, Hu M, Shang D J, *et al.* Research on secondary organic aerosols basing on field measurement [J]. *Acta Chimica Sinica*, 2014, **72**(2): 145-157.
- [10] Kang E, Root M J, Toohey D W, *et al.* Introducing the concept of potential aerosol mass (PAM) [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2007, **7**(22): 5727-5744.
- [11] 王倩, 陈长虹, 王红丽, 等. 上海市秋季大气 VOCs 对二次有机气溶胶的生成贡献及来源研究 [J]. *环境科学*, 2013, **34**(2): 424-433.
Wang Q, Chen C H, Wang H L, *et al.* Forming potential of secondary organic aerosols and sources apportionment of VOCs in autumn of Shanghai, China [J]. *Environmental Science*, 2013, **34**(2): 424-433.
- [12] 吕子峰, 郝吉明, 段菁春, 等. 北京市夏季二次有机气溶胶生成潜势的估算 [J]. *环境科学*, 2009, **30**(4): 969-975.
Lü Z F, Hao J M, Duan J C, *et al.* Estimate of the formation potential of secondary organic aerosol in Beijing summertime [J]. *Environmental Science*, 2009, **30**(4): 969-975.
- [13] Odum J R, Hoffmann T, Bowman F, *et al.* Gas/particle partitioning and secondary organic aerosol yields [J]. *Environmental Science & Technology*, 1996, **30**(8): 2580-2585.
- [14] 陈文泰, 邵敏, 袁斌, 等. 大气中挥发性有机物 (VOCs) 对二次有机气溶胶 (SOA) 生成贡献的参数化估算 [J]. *环境科学学报*, 2013, **33**(1): 163-172.
Chen W T, Shao M, Yuan B, *et al.* Parameterization of contribution to secondary organic aerosol (SOA) formation from ambient volatile organic compounds (VOCs) [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2013, **33**(1): 163-172.
- [15] Donahue N M, Robinson A L, Stanier C O, *et al.* Coupled partitioning, dilution, and chemical aging of semivolatile organics [J]. *Environmental Science & Technology*, 2006, **40**(8): 2635-2643.
- [16] Donahue N M, Epstein S A, Pandis S N, *et al.* A two-dimensional volatility basis set: 1. Organic-aerosol mixing thermodynamics [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2011, **11**(7): 3303-3318.
- [17] Kang E, Toohey D W, Brune W H. Dependence of SOA oxidation on organic aerosol mass concentration and OH exposure; experimental PAM chamber studies [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2011, **11**(4): 1837-1852.
- [18] Lambe A T, Onasch T B, Croasdale D R, *et al.* Transitions from functionalization to fragmentation reactions of laboratory secondary

- organic aerosol (SOA) generated from the OH oxidation of alkane precursors[J]. *Environmental Science & Technology*, 2012, **46** (10): 5430-5437.
- [19] Hall W A, Pennington M R, Johnston M V. Molecular transformations accompanying the aging of laboratory secondary organic aerosol [J]. *Environmental Science & Technology*, 2013, **47**(5): 2230-2237.
- [20] Lambe A T, Cappa C D, Massoli P, *et al.* Relationship between oxidation level and optical properties of secondary organic aerosol [J]. *Environmental Science & Technology*, 2013, **47** (12): 6349-6357.
- [21] Ahlberg E, Falk J, Eriksson A, *et al.* Secondary organic aerosol from VOC mixtures in an oxidation flow reactor[J]. *Atmospheric Environment*, 2017, **161**: 210-220.
- [22] Chu B W, Liu Y C, Ma Q X, *et al.* Distinct potential aerosol masses under different scenarios of transport at a suburban site of beijing[J]. *Journal of Environmental Sciences*, 2016, **39**: 52-61.
- [23] Ortega A M, Hayes P L, Peng Z, *et al.* Real-time measurements of secondary organic aerosol formation and aging from ambient air in an oxidation flow reactor in the Los Angeles area [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2016, **16** (11): 7411-7433.
- [24] Hu W W, Hu M, Hu W, *et al.* Chemical composition, sources, and aging process of submicron aerosols in Beijing: contrast between summer and winter [J]. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2016, **121**(4): 1955-1977.
- [25] Li R, Palm B B, Ortega A M, *et al.* Modeling the radical chemistry in an oxidation flow reactor: radical formation and recycling, sensitivities, and the OH exposure estimation equation [J]. *The Journal of Physical Chemistry A*, 2015, **119** (19): 4418-4432.
- [26] Mao J, Ren X, Brune W H, *et al.* Airborne measurement of OH reactivity during INTEX-B [J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2009, **9**(1): 163-173.
- [27] Drewnick F, Hings S S, DeCarlo P, *et al.* A new time-of-flight aerosol mass spectrometer (TOF-AMS)—instrument description and first field deployment[J]. *Aerosol Science and Technology*, 2005, **39**(7): 637-658.
- [28] Middlebrook A M, Bahreini R, Jimenez J L, *et al.* Evaluation of composition-dependent collection efficiencies for the aerodyne aerosol mass spectrometer using field data[J]. *Aerosol Science and Technology*, 2012, **46**(3): 258-271.
- [29] Lambe A T, Chhabra P S, Onasch T B, *et al.* Effect of oxidant concentration, exposure time, and seed particles on secondary organic aerosol chemical composition and yield[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2015, **15** (6): 3063-3075.
- [30] Palm B B, Campuzano-Jost P, Ortega A M, *et al.* In situ secondary organic aerosol formation from ambient pine forest air using an oxidation flow reactor[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2016, **16**(5): 2943-2970.
- [31] Tkacik D S, Lambe A T, Jathar S, *et al.* Secondary organic aerosol formation from in-use motor vehicle emissions using a potential aerosol mass reactor [J]. *Environmental Science & Technology*, 2014, **48**(19): 11235-11242.
- [32] Han S Q, Bian H, Tie X X, *et al.* Impact of nocturnal planetary boundary layer on urban air pollutants: Measurements from a 250-m tower over Tianjin, China [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2009, **162**(1): 264-269.
- [33] De Gouw J, Jimenez J L. Organic aerosols in the earth's atmosphere[J]. *Environmental Science & Technology*, 2009, **43** (20): 7614-7618.
- [34] Liu C T, Ma Z B, Mu Y J, *et al.* The levels, variation characteristics, and sources of atmospheric non-methane hydrocarbon compounds during wintertime in Beijing, China[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions*, 2017, **17** (17): 10633-10649.
- [35] 谢志英, 刘浩, 唐新明, 等. 北京市近 12 年空气污染变化特征及其与气象要素的相关性分析[J]. *环境工程学报*, 2015, **9**(9): 4471-4478.
- Xie Z Y, Liu H, Tang X M, *et al.* Air pollution variation characteristics and its correlation with meteorological data in Beijing in recent 12 years[J]. *Chinese Journal of Environmental Engineering*, 2015, **9**(9): 4471-4478.
- [36] Wu R R, Li J, Hao Y F, *et al.* Evolution process and sources of ambient volatile organic compounds during a severe haze event in Beijing, China [J]. *Science of the Total Environment*, 2016, **560-561**: 62-72.
- [37] 张靖, 邵敏, 苏芳. 北京市大气中挥发性有机物的组成特征 [J]. *环境科学研究*, 2004, **17**(5): 1-5.
- Zhang J, Shao M, Su F. Study on composition of ambient volatile organic compounds (VOCs) in Beijing city [J]. *Research of Environmental Sciences*, 2004, **17**(5): 1-5.
- [38] 张俊刚, 王跃思, 吴方堃, 等. 北京市大气中 BTEX 工作日与非工作日的浓度变化[J]. *环境化学*, 2009, **28**(1): 112-116.
- Zhang J G, Wang Y S, Wu F K, *et al.* Difference between workday and non-workday of BTEX concentration in Beijing urban area[J]. *Environmental Chemistry*, 2009, **28**(1): 112-116.
- [39] Li J, Wu R, Li Y, *et al.* Effects of rigorous emission controls on reducing ambient volatile organic compounds in Beijing, China [J]. *Science of the Total Environment*, 2016, **557-558**: 531-541.
- [40] Duan J C, Tan J H, Yang L, *et al.* Concentration, sources and ozone formation potential of volatile organic compounds (VOCs) during ozone episode in Beijing [J]. *Atmospheric Research*, 2008, **88**(1): 25-35.
- [41] Pang Y B, Fuentes M, Rieger P. Trends in selected ambient volatile organic compound (VOC) concentrations and a comparison to mobile source emission trends in California's South Coast Air Basin [J]. *Atmospheric Environment*, 2015, **122**: 686-695.
- [42] Baker A K, Beyersdorf A J, Doezema L A, *et al.* Measurements of nonmethane hydrocarbons in 28 United States cities [J]. *Atmospheric Environment*, 2008, **42**(1): 170-182.

CONTENTS

Diurnal Variation of SOA Formation Potential from Ambient Air at an Urban Site in Beijing	LIU Jun, CHU Bi-wu, HE Hong (2505)
Characteristics of Key Size Spectrum of PM _{2.5} Affecting Winter Haze Pollution in Taiyuan	YANG Su-ying, YU Xin-yang, ZHAO Xiu-yong, <i>et al.</i> (2512)
Characteristics and Source Apportionment of Water-soluble Ions in PM _{2.5} During Winter in Panjin	ZHANG Lei, JI Ya-qin, WANG Shi-bao, <i>et al.</i> (2521)
Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds in the Rainy Season of Guangzhou City	GU Ying-gang, YU Xiao-fang, YANG Wen-da, <i>et al.</i> (2528)
Emission Characteristics of Dehydrated Sugar and Acephenanthrylene in Particles from Tropical Forest Burning	JIN Cheng-miao, CUI Min, HAN Yong, <i>et al.</i> (2538)
Construction and Application of Vertical Diffusion Index for Analyzing Weather During Pollution Events in Tianjin	CAI Zi-ying, HAN Su-jin, ZHANG Min, <i>et al.</i> (2548)
Comparison Between Atmospheric Wet-only and Bulk Nitrogen Depositions at Two Sites in Subtropical China	ZHU Xiao, WANG Jie-fei, SHEN Jian-lin, <i>et al.</i> (2557)
Emission Reduction Benefits When Eliminating Yellow-label Vehicles in the Jing-jin-ji Region	LU Ya-ling, ZHOU Jia, CHENG Xi, <i>et al.</i> (2566)
Health Assessment of the Stream Ecosystem in the North Canal River Basin, Beijing, China	GU Xiao-yun, XU Zong-xue, LIU Lin-fei, <i>et al.</i> (2576)
Pollution Characteristics and Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Phthalic Acid Esters During High Water Level Periods in the Wuhan Section of the Yangtze River, China	DONG Lei, TANG Xian-qiang, LIN Li, <i>et al.</i> (2588)
Characteristics of Antibiotic Resistance Genes in Downstream Areas of the Aojiang River, Fujian Province	ZHANG Dan-dan, GUO Ya-ping, REN Hong-yun, <i>et al.</i> (2600)
Distribution Characteristics and Risk Assessment of Heavy Metals in the Sediments of the Estuary of the Tributaries in the Three Gorges Reservoir, SW China	FANG Zhi-qing, CHEN Qiu-yu, YIN De-liang, <i>et al.</i> (2607)
Assessment of Physico-chemical Properties and Phosphorus Fraction Distribution Characteristics in Sediments after Impounding of the Three Gorges Reservoir to 175 m	PAN Chan-juan, LI Rui, TANG Xian-qiang, <i>et al.</i> (2615)
Source of Nitrate in Surface Water and Shallow Groundwater Around Baiyangdian Lake Area Based on Hydrochemical and Stable Isotopes	KONG Xiao-le, WANG Shi-qin, DING fei, <i>et al.</i> (2624)
Thermal Stratification and Its Impacts on Water Quality in Shahe Reservoir, Liyang, China	SUN Xiang, ZHU Guang-wei, DA Wen-yi, <i>et al.</i> (2632)
Spatial and Temporal Variation Characteristics of Drip Water Hydrogeochemistry in the Xueyu Cave of Chongqing and Its Implications for Environmental Research	ZENG Ze, JIANG Yong-jun, LÜ Xian-fu, <i>et al.</i> (2641)
Distinguishing the Compositions and Sources of the Chromophoric Dissolved Organic Matter in a Typical Karst River During the Dry Season; A Case Study in Bitan River, Jinfo Mountain	LIU Yue, HE Qiu-fang, LIU Ning-kun, <i>et al.</i> (2651)
Environmental Significance of the Stable Isotopes in Precipitation at Different Altitudes in the Tuolai River Basin	LI Yong-ge, LI Zong-xing, FENG Qi, <i>et al.</i> (2661)
Spatial-Temporal Variations of CO ₂ and CH ₄ Flux Through a Water-air Interface Under the Effect of Primary Productivity in Wulixia Reservoir	PENG Wen-jie, LI Qiang, SONG Ang, <i>et al.</i> (2673)
Spatiotemporal Succession Characteristics of Algal Functional Groups and Its Impact Factors for a Typical Channel-Type Reservoir in a Southwest Mountainous Area	ZHANG Yao-wen, LI Hong, LI Jia, <i>et al.</i> (2680)
Seasonal Succession of Phytoplankton Functional Groups and Their Driving Factors in the Siminghu Reservoir	ZHENG Cheng, LU Kai-hong, XU Zhen, <i>et al.</i> (2688)
Effects of Nutrient Addition on the Growth and Competition of Bloom Forming Cyanobacterium <i>Chrysochloris ovalisporum</i> ; An In-situ Experiment	WANG Meng-meng, ZHANG Wei, ZHANG Jun-yi, <i>et al.</i> (2698)
Purification Effect of Submerged Macrophyte System with Different Plants Combinations and C/N Ratios	LIU Miao, CHEN Kai-ning (2706)
Characteristics of Nitrogen and Phosphorus Concentration Dynamics in Natural Ditches Under an Irrigation-Drainage Unit in the Jiangnan Plain	HUA Ling-ling, ZHANG Fu-lin, ZHAI Li-mei, <i>et al.</i> (2715)
Distribution and Treatment of Antibiotics in Typical WWTPs in Small Towns in China	CHAI Yu-feng, ZHANG Yu-xiu, CHEN Mei-xue, <i>et al.</i> (2724)
Effects and Mechanism of the Combination of Ozone-PAC as a Pretreatment for the Reduction of Membrane Fouling	DONG Bing-zhi, GAO Hao-yang, HU Meng-liu (2732)
Start-up and Process Characteristics of Simultaneous ANAMMOX and Denitrification (SAD) in a Pilot-scale Anaerobic Sequencing Batch Reactor (ASBR)	YU De-shuang, TANG Jia-jia, ZHANG Jun, <i>et al.</i> (2740)
Phosphate Removal on Zirconium Alginate/Poly(<i>N</i> -isopropyl acrylamide) Hydrogel Beads with a Semi-interpenetrating Network	ZENG Xue-yang, LUO Hua-yong, ZHANG Yao-kun, <i>et al.</i> (2748)
Shortcut Nitrification Rapid Start and Stability of Corn Starch Wastewater	LONG Bei-sheng, LIU Xun-lei, LIU Hong-bo, <i>et al.</i> (2756)
Nitrifying Bacteria Culture in Entrapment Immobilization	YANG Hong, HU Yin-long (2763)
Performance of the Removal of Nitrogen During Anaerobic Ammonia Oxidation Using Different Operational Strategies	AN Fang-jiao, PENG Yong-zhen, DONG Zhi-long, <i>et al.</i> (2770)
Transformation of Protein in Sludge During High Solids Anaerobic Digestion	ZHAN Yu, SHI Wan-sheng, ZHAO Ming-xing, <i>et al.</i> (2778)
Changes in Heavy Metal Speciation and Release Behavior Before and After Sludge Composting Under a Phosphate-rich Atmosphere	LI Yu, FANG Wen, QI Guang-xia, <i>et al.</i> (2786)
Effect of Denitrification and Phosphorus Removal Microorganisms in Activated Sludge Bulking Caused by Filamentous Bacteria	GAO Chen-chen, YOU Jia, CHEN Yi, <i>et al.</i> (2794)
Microbial Population Dynamics During Domestication and Cultivation of Biofilm to Remove and Enrich Phosphate	MENG Xuan, PAN Yang, ZHANG Hao, <i>et al.</i> (2802)
Effects of Elevated Tetracycline Concentrations on Aerobic Composting of Human Feces: Composting Behavior and Microbial Community Succession	SHI Hong-lei, WANG Xiao-chang, LI Qian, <i>et al.</i> (2810)
Effect of Long-term Organic Amendments on Nitric Oxide Emissions from the Summer Maize-Winter Wheat Cropping System in Guanzhong Plain	YUAN Meng-xuan, WANG Jin-feng, TAN Yue-hui, <i>et al.</i> (2819)
Effects of Mushroom Residue Application Rates on Net Greenhouse Gas Emissions in the Purple Paddy Soil	QI Le, GAO Ming, ZHOU Peng, <i>et al.</i> (2827)
Estimation of Winter Wheat Photosynthesized Carbon Distribution and Allocation Belowground via ¹³ C Pulse-labeling	SUN Zhao-an, CHEN Qing, HAN Xiao, <i>et al.</i> (2837)
Effects of Vegetation Restoration on Soil Nitrogen Pathways in a Karst Region of Southwest China	YANG Yi, OUYANG Yun-dong, CHEN Hao, <i>et al.</i> (2845)
Identifying the Origins and Spatial Distributions of Heavy Metals in the Soils of the Jiangsu Coast	LÜ Jian-shu, HE Hua-chun (2853)
Source Identification and Spatial Distribution of Heavy Metals in Soils in Typical Areas Around the Lower Yellow River	YU Yuan-he, LÜ Jian-shu, WANG Ya-meng (2865)
Spatial Variation of Soil Heavy Metals in Lin'an City and Its Potential Risk Evaluation	ZHENG Jing-zhi, WANG Chu-dong, WANG Shi-han, <i>et al.</i> (2875)
Principal Component Analysis and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Farmland Soils around a Pb-Zn Mine in Southwestern China	ZHOU Yan, CHEN Qiang, DENG Shao-po, <i>et al.</i> (2884)
Spatial Variation of Heavy Metals in Soils and Its Ecological Risk Evaluation in a Typical <i>Carya cathayensis</i> Production Area	ZHANG Hong-ju, ZHAO Ke-li, YE Zheng-qian, <i>et al.</i> (2893)
Influence of Biochar Application on Growth and Antioxidative Responses of Macrophytes in Subsurface Flow Constructed Wetlands	HUANG Lei, CHEN Yu-cheng, ZHAO Ya-qi, <i>et al.</i> (2904)
Effect of Iron on the Release of Arsenic in Flooded Paddy Soils	WANG Xin, ZHONG Song-xiong, CHEN Zhi-liang, <i>et al.</i> (2911)
Concentrations and Health Risk Assessments of Heavy Metal Contents in Soil and Rice of Mine Contaminated Areas	TIAN Mei-ling, ZHONG Xue-mei, ZHANG Yun-xia, <i>et al.</i> (2919)
Effect of Calcium Silicate-biological Humus Fertilizer Composite on Uptake of Cd by Shallots from Contaminated Agricultural Soil	LIU De-ling, YIN Guang-cai, CHEN Zhi-liang, <i>et al.</i> (2927)
Accumulation Characteristics of Heavy Metals in Greenhouse Soil and Vegetables in Siping City, Jilin Province	LI Lian-fang, ZHU Chang-xiong, ZENG Xi-hai, <i>et al.</i> (2936)
Effect of Foliar Zinc Application on Bioaccessibility of Cadmium and Zinc in Pakchoi	WANG Lin, GU Peng-lei, LI Ran, <i>et al.</i> (2944)
Mercury Distribution of Benthonic Animals and Response to Mercury in Sediments in Caohai Wetland, Guizhou Province	XU Yi-yuan, ZENG Ling-xia, HE Tian-rong, <i>et al.</i> (2953)
Discussion of Emissions and Health Risk of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from the Retreading Process of Waste Tires	FU Jian-ping, ZHAO Bo, LI Yu-qing, <i>et al.</i> (2963)
Spatiotemporal Dynamics of CO ₂ Emissions in Chongqing: An Empirical Analysis at the County Level	SUN Xiu-feng, SHI Kai-fang, WU Jian-ping (2971)
Impact of Size on Environmental Behavior of Metal Oxide Nanoparticles	YAN Yu-peng, TANG Ya-dong, WAN Biao, <i>et al.</i> (2982)
Fate and Toxicity of UV Filters in Marine Environments	ZHU Xiao-shan, HUANG Jing-ying, LÜ Xiao-hui, <i>et al.</i> (2991)