

方知库
Eco-Environmental
Knowledge Web

环境科学

ENVIRONMENTAL SCIENCE

ISSN 0250-3301 CODEN HCKHDV
HUANJING KEXUE

■ 主办 中国科学院生态环境研究中心
■ 出版 科学出版社



2020

Vol.41 No.4
第41卷 第4期

目次

基于深度学习的华东地区 PM _{2.5} 浓度遥感反演	刘林钰, 张永军, 李彦胜, 刘欣怡, 万一 (1513)
秋冬季区域性大气污染过程对长三角北部典型城市的影响	李瑞, 李清, 徐健, 李亮, 葛朝军, 黄凌, 孙登红, 刘子义, 张坤, 周国柱, 王杨君, 胡子梅, 宋燕西, 陈勇航, 李莉 (1520)
基于 GAM 模型的西安市 O ₃ 浓度影响因素解析	黄小刚, 邵天杰, 赵景波, 曹军骥, 吕晓虎 (1535)
北京及周边 6 个城市大气 PM _{2.5} 中左旋葡聚糖及其异构体的时空分布特征	朱红霞, 陶雪梅, 王超, 张霖琳, 郑晓燕 (1544)
典型沿海城市采暖期细颗粒物组分特征及来源解析	李明燕, 杨文, 魏敏, 朱红晓, 刘厚凤 (1550)
成都地区黑碳气溶胶变化特征及其来源解析	王璐, 袁亮, 张小玲, 贾月涛 (1561)
天津夏季郊区 VOCs 对臭氧生成的影响	姚青, 韩素芹, 张裕芬, 毕晓辉, 王晓佳, 蔡子颖 (1573)
涂料制造行业挥发性有机物排放成分谱及影响	吴健, 高松, 陈曦, 杨勇, 伏晴艳, 车祥, 焦正 (1582)
典型超低排放燃煤电厂可凝结颗粒物特征和成因	邓建国, 王刚, 张莹, 李妍菁, 段雷, 蒋靖坤 (1589)
中国地表水硝酸盐分布及其来源分析	张鑫, 张妍, 毕直磊, 山泽萱, 任丽江, 李琦 (1594)
中、韩滨海城市化区域水体全氟化合物的空间特征及生态风险	杨洪法, 史斌, 周云桥, 杨璐, 孟晶, 陈礼强, 王铁宇 (1607)
小清河入海口近十年水质变化及驱动因素分析	范新风, 韩美, 王磊, 李秀萍, 周璟 (1619)
浙江省 H 市水处理及供水系统 4 种人工甜味剂的分布特征	马晓雁, 胡慧, 陆思嘉, 李青松, 薛乐飞, 李雪纯, 邓靖 (1629)
三峡库区支流梅溪河附石藻类群落变化及其与环境因子的关系	米文梅, 施军琼, 杨燕君, 杨宋琪, 何书哈, 吴忠兴 (1636)
骆马湖浮游植物演替规律及驱动因子	张庆吉, 王业宇, 王金东, 王日昕, 邓建明, 蔡永久, 彭凯, 陈业, 龚志军 (1648)
拉鲁湿地水生植物群落多样性与水环境因子的关系	王佳俊, 田瀚鑫, 周磊, 徐德福, 张建伟, 彭措次仁 (1657)
基于网络分析解析水源水库春季水体反硝化群落演变特征及驱动因素	周石磊, 孙悦, 张艺冉, 黄廷林, 张春华, 方凯开, 曾明正, 李再兴, 崔建升 (1666)
岱海水体氮、磷时空分布特征及其差异性分析	赵丽, 陈俊伊, 姜霞, 郑朔方, 王书航 (1676)
巢湖滨岸水塘洼地沉积物反硝化速率及对外源碳氮的响应	李如忠, 王莉, 刘超 (1684)
镁改性芦苇生物炭控磷效果及其对水体修复	丁玉琴, 李大鹏, 张帅, 陈丽媛, 徐楚天, 陈姝彤, 朱企, 黄勇 (1692)
氢氧化镁对水体内源磷释放的控制作用	杨春懿, 詹艳慧, 林建伟, 邱波, 徐文隆, 俞阳, 黄良君 (1700)
北京市道路雨水径流溶解性有机物化学组分特性	陈梦瑶, 杜晓丽, 于振亚, 朱英杰, 梁卉, 吴凡 (1709)
新型三维多孔光热材料制备及其高盐废水处理应用	黄乐, 徐颖峰, 谢茜青, 赵炯, 冯华军 (1716)
Ni 掺杂 Sb-SnO ₂ 瓷环粒子电极电催化氧化磺胺嘧啶	石秋俊, 刘安迪, 唐柏彬, 魏世强, 张进忠 (1725)
磁性 Fe ₃ O ₄ -CuO 非均相活化过碳酸钠降解 AO7	徐劫, 王琳, 陈家斌, 许芬, 王柯晴, 侯梓峰, 黄天寅 (1734)
赤泥活化过一硫酸盐降解环丙沙星: 性能和机制	史京转, 魏红, 周孝德, 李克斌, 史颖娟 (1743)
工业废水水质对微气泡臭氧氧化深度处理影响	张静, 张守敬, 刘春, 施佳泽, 陈晓轩, 张磊, 张瑞娜 (1752)
污泥水热炭对亚甲基蓝的吸附特性	陈丽媛, 李大鹏, 朱文娟, 徐楚天, 丁玉琴, 黄勇 (1761)
改性西瓜皮生物炭的制备及其对 Pb(II) 的吸附特性	毕景望, 单锐, 韩静, 袁浩然, 史月月, 张兴庆 (1770)
A ² /O 短程硝化耦合厌氧氨氧化系统构建与脱氮特性	刘小钗, 荣懿, 汶丽杰, 李党勇, 金鹏康 (1779)
基于甲烷氧化菌的城镇污水厂尾水极限脱氮系统构建及机制	杨娅男, 李彦澄, 李江, 吴攀, 杨钊, 向福亮 (1787)
HRT 对 CSTR 亚硝化颗粒污泥性能影响	王建芳, 齐泽坤, 钱飞跃, 刘文如, 张俊, 王伟, 沈聪 (1794)
低基质颗粒污泥反应器中亚硝化的实现过程及其污泥变化特征	朱琳, 程诚, 宋家俊, 郭凯成, 汪倩, 刘文如, 沈耀良 (1801)
不同 HRT 下污水中有机物在 ABR 中的转化过程及污泥形态特征	程诚, 朱琳, 郭凯成, 汪倩, 宋家俊, 刘文如, 沈耀良 (1808)
投加颗粒活性炭和二氧化锰对剩余污泥厌氧消化的影响	杨波, 贾丽娟, 徐辉, 李方, 刘艳彪 (1816)
中国 193 个城市规划区土壤微量元素污染与健康风险	李括, 彭敏, 杨峥, 杨柯, 刘飞, 赵传冬, 成晓梦, 马宏宏, 郭飞, 唐世琪, 刘应汉, 成杭新 (1825)
基于随机森林评价的兰州市主城区校园地表灰尘重金属污染	胡梦瑶, 王佳, 张亚云, 李春艳, 李娜娜 (1838)
扬州市不同功能区表层土壤中多环芳烃的含量、来源及其生态风险	姚成, 倪进治, 刘瑞, 杨柳明, 陈卫锋, 魏然 (1847)
桂西南土壤镉地质异常区水稻种植安全性评估	陈同斌, 庞瑞, 王佛鹏, 周浪, 宋波 (1855)
重庆市主要农耕地土壤 Cd 生物有效性及影响因素	王锐, 胡小兰, 张永文, 余飞, 朱海山, 李瑜 (1864)
棉秆炭对碱性水稻土壤-水稻中镉迁移转化的阻控作用	刘师豆, 朱新萍, 韩耀光, 赵一, 金航, 贾宏涛 (1871)
连续 4 a 施有机肥降低紫泥田镉活性与稻米镉含量	薛毅, 尹泽润, 盛浩, 马颖榴, 周清, 宋达清, 张杨珠 (1880)
纳米氢氧化镁对不同类型土壤镉形态的影响	邓继宝, 张春来, 徐卫红 (1888)
矿业废弃地复垦土壤-作物硒吸收特征及其对重金属拮抗效应	尹炳, 汪建飞, 师胜, 卜中原, 霍天满, 张世文 (1904)
不同生物炭对酸性农田土壤性质和作物产量的动态影响	杨彩迪, 宗玉统, 卢升高 (1914)
化肥减量有机替代对紫色土旱坡地土壤氮磷养分及作物产量的影响	朱浩宇, 高明, 龙翼, 徐国鑫, 王富华, 王子芳 (1921)
紫色土旱坡地氮流失通量对减肥施肥秸秆的响应	熊子怡, 王子芳, 龙翼, 严冬春, 徐国鑫, 高明 (1930)
浒苔生物炭对滨海盐碱土壤改良的效果及途径	吴丹, 孙萍, 路鹏展, 陈友媛, 郭嘉梦, 刘明, 王磊, 张彩杰 (1941)
极端干旱区咸水灌溉人工防护林土壤可溶性碳的垂直分布及其影响因素	孟天歌, 吴路遥, 张少磊, 徐燕莹, 李雄, 张建国 (1950)
红松人工林土壤酶活性与化学性质对氮添加的响应	吕来新, 宋蕾, 刘志理, 张金波, 金光泽 (1960)
稻田土壤 N ₂ O 消纳能力及 nosZ-I 型功能种群应答机制	郭俊丽, 田美洁, 葛体达, 魏文学, 王光军, 孙志龙, 刘毅 (1968)
京津冀电子废弃物回收利用潜力预测及环境效益评估	陈盼, 施晓清 (1976)
中国城市工业化发展与 PM _{2.5} 的关系: 兼论 EKC 曲线形成的内在机制	李雅男, 丁振民, 邓元杰, 侯孟阳, 姚顺波 (1987)
《环境科学》征订启事 (1618) 《环境科学》征稿简则 (1635) 信息 (1724, 1769, 1800)	

基于深度学习的华东地区 $PM_{2.5}$ 浓度遥感反演

刘林钰, 张永军*, 李彦胜, 刘欣怡, 万一

(武汉大学遥感信息工程学院, 武汉 430079)

摘要: $PM_{2.5}$ 作为大气污染的主要来源, 对人类身体健康有着极大的影响. 本文提出基于深度学习模型的多要素联合 $PM_{2.5}$ 反演方法, 以 $PM_{2.5}$ 浓度作为真值数据, 引入 Himawari 气溶胶光学厚度 (AOD) 日数据产品与温度、相对湿度和气压等 10 个要素作为反演要素. 为验证方法的有效性, 采用华东地区 2016~2018 年的数据分季节开展实验, 并与传统反演方法进行对比. 结果表明, $PM_{2.5}$ 浓度与 AOD、降水、风速、高植被覆盖指数呈正相关关系, 与矮植被覆盖指数呈负相关关系, 与温度、湿度、气压以及 DEM 的相关性随季节的变化而改变; 基于深层神经网络 (DNN) 反演的 $PM_{2.5}$ 精度高于传统的线性和非线性模型, 各个季节 R^2 均在 0.5 以上并且误差较小, 其中秋季的反演效果最好 R^2 为 0.86, 夏季为 0.75, 冬季为 0.613, 春季为 0.566; 模型的可视化结果显示, DNN 模型的反演结果更接近地面监测站点插值的 $PM_{2.5}$ 浓度分布, 分辨率更高且更精确.

关键词: $PM_{2.5}$; Himawari 数据; 华东地区; 深度学习; 反演

中图分类号: X513; X87 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2020)04-1513-07 DOI: 10.13227/j.hjxx.201909209

$PM_{2.5}$ Inversion Using Remote Sensing Data in Eastern China Based on Deep Learning

LIU Lin-yu, ZHANG Yong-jun*, LI Yan-sheng, LIU Xin-yi, WAN Yi

(School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079, China)

Abstract: $PM_{2.5}$, which is a major source of air pollution, has a considerable impact on human health. In this study, a multi-element joint $PM_{2.5}$ inversion method based on a deep learning model is proposed. With $PM_{2.5}$ concentration as the ground truth, 10 elements including the Himawari-AOD daily data products, temperature, relative humidity, and pressure, were introduced as inversion elements. To verify the effectiveness of the method, the experiment was carried out by season using remote sensing data in Eastern China during 2016-2018. The results demonstrate that $PM_{2.5}$ concentrations were positively correlated with AOD, precipitation, wind speed, and high vegetation cover index and negatively correlated with dwarf vegetation cover index. The correlation with temperature, humidity, pressure, and DEM changed with seasons. Comparative experiments indicated that the accuracy of $PM_{2.5}$ inversion based on the deep neural network is higher than that of traditional linear and nonlinear models. R^2 was above 0.5, and the error was small in each season. The R^2 value for autumn, which showed the best inversion, was 0.86, that for summer was 0.75, that for winter was 0.613, and that for spring was 0.566. The visualization of the model illustrates that the inversion result of the DNN model is closer to the $PM_{2.5}$ concentration distribution interpolated by the ground monitoring station, and the resolution is higher and more accurate.

Key words: $PM_{2.5}$; Himawari data; Eastern China; deep learning; inversion

近年来,随着我国经济的快速发展,工业化进程的不断加快,环境问题日益严重,霾便是其中之一,尤其中国华东地区的空气污染日趋严重,灰霾天气出现频率增多^[1, 2]. 而 $PM_{2.5}$ 通常指直径小于 2.5 μm 的颗粒,是霾的主要成分,对人体健康和能见度均具有重要影响^[3, 4]. 目前对 $PM_{2.5}$ 的监测主要以站点的形式开展,但各个城市国控点的数量有限且分布不均,难以获取大区域内较为准确的 $PM_{2.5}$ 浓度信息,因此使用遥感手段监控大范围内 $PM_{2.5}$ 浓度具有重要意义^[5~7].

AOD 为气溶胶光学厚度,是表征大气浑浊度的重要物理量,此前有学者研究表明, AOD 与 $PM_{2.5}$ 有较强的相关性^[8, 9], Koelemeijer 等^[10] 在研究欧洲气溶胶时加入了边界层高度和相对湿度因子,提升了 $PM_{2.5}$ 与 AOD 的相关性;张智等^[11] 采用 6S 模型构建查找表,以西安为研究区域,使用 MODIS 数据中的

1 km AOD 建立回归模型进行反演;李瑶等^[12] 利用 HJ-1 影像,建立起 AOD 与 $PM_{2.5}$ 的线性统计模型. 上述反演方法都使用了传统的线性或非线性回归模型,这一类模型仅适用于短时间且小范围的反演,精度较低,无法应对多要素共同反演时的复杂关系. 目前国内学者使用深度学习反演 $PM_{2.5}$ 的较少,大多开展 $PM_{2.5}$ 的预测研究^[13, 14], 申原等^[15] 提出了基于随机森林的 $PM_{2.5}$ 反演方法,直接建立起 MODIS 影像与 $PM_{2.5}$ 的关系,可以取得更好的反演效果.

在此前的反演研究中,大多都使用 MODIS 传感器的 AOD 数据或产品^[11, 13, 15], 但该产品每天仅过境 2 次,若观测区域在卫星过境时间被云覆盖,则不

收稿日期: 2019-09-23; 修订日期: 2019-11-14

基金项目: 国家重点研发计划项目(2018YFB0505003)

作者简介: 刘林钰(1995~), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为大气遥感, E-mail: linyu_liu@whu.edu.cn

* 通信作者, E-mail: zhangyj@whu.edu.cn

能得到有效数据. Himawari-8 卫星是日本于 2014 年 10 月发射的地球同步卫星,其搭载的 AHI (advanced Himawari imager) 传感器有 16 个波段,具有更高的时间分辨率,每 10 min 就能得到一幅全景影像,给亚洲及大洋洲区域更详细的气溶胶监测带来了可能^[16]. 目前学者对于 Himawari 数据的研究,主要在气溶胶反演、暴雨对流云团监测和冰云识别等方面^[17-19],对 $PM_{2.5}$ 的反演研究比较匮乏.

综上所述,传统反演所使用的数据存在如下问题:①时间分辨率低;②覆盖范围小;③数值精度低,且使用传统模型进行多要素反演效果较差. 针对以上问题,本文使用 2016 ~ 2018 年这 3 a 的华东地区 Himawari AOD 数据、ERA5 再分析资料和地面高程数

据提出一种基于深度学习的 $PM_{2.5}$ 浓度反演方法并开展实验,同时与传统的回归模型进行精度对比分析.

1 材料与方法

本文提出了基于深度学习的多要素联合 $PM_{2.5}$ 反演方法,以华东地区 459 个国控点的 $PM_{2.5}$ 观测浓度作为真值数据,以气溶胶光学厚度 (Himawari-8 AOD)、温度 (T)、相对湿度 (RH)、气压 (p)、累计降水 (RAIN)、水平向风速 (WSH)、垂直向风速 (WSV)、高植被覆盖指数 (CVH)、低植被覆盖指数 (CVL) 以及地面数字高程 (SRTM) 在内的 10 个要素作为反演要素,进行华东地区 $PM_{2.5}$ 反演研究,具体流程如图 1 所示.




图 1 技术流程示意

Fig. 1 Flow chart of the proposed technology

1.1 基于深层神经网络(DNN)的反演模型构建

在要素变多的情况下,各要素之间的关系变得更加复杂,对模型的非线性拟合能力有了更高要求,传统线性或非线性回归模型在进行多要素拟合的时候精度都较低,因此本文使用 DNN 进行多要素的模型构建. 本文构建的深层神经网络结构如图 2 所示,该模型的输入为气溶胶光学厚度、温度和相对湿度等在内的 10 个反演要素组成的向量,经过 4 个隐含层后得到反演结果. 每个隐含层均以上一层所有节点的输出作为输入向量,经激活函数变换后,逐层向前传递信号. 在训练模型时,采用反向传播损失函数 (loss function) 的倒数来优化每一层的权重值与偏置值. 本文模型所采用的损失函数为 MSE,其形式为:

$$MSE = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1)$$

式中, y_i 是 $PM_{2.5}$ 浓度的模型反演值, $\hat{y}_i$ 为 $PM_{2.5}$ 浓度的地面真实值, N 为样本总个数.

在深度神经网络中,隐含层里的每一个节点都通过激活函数将输入映射到输出,常用的激活函数有 S 型函数 (sigmoid)、双曲正切函数 (tanh) 和线性整流函数 (ReLU) 等. 与深度神经网络在分类中的应用不同,本模型最终的输出值为一个具体的数值,而 Sigmoid 和 Tanh 等激活函数均将输入信号映射到 $[0, 1]$ 之间,与本实验的输出需求不契合;ReLU 函数则是一种分段线性函数,当输入信号大于零的时候其输入等于输出,当输入信号小于 0 的时候则输




图2 深层神经网络结构
Fig. 2 Deep neural network structure

出0,没有限定输出信号的上限,同时 ReLU 函数由于求导简单,在训练中具备更快的训练速度,效率更高.故本模型使用 ReLU 函数作为隐含层神经元的激活函数.

为防止出现过拟合现象,本文选择在模型中加入随机失活算法(dropout)^[20],即在网络训练过程中按照一定的概率随机将神经元从当前网络中丢弃,

让其不参与到当前训练,待当前批次训练结束后再将丢弃的神经元恢复并重复上述过程,如图3所示. dropout 能有效减少神经元之间的共适应关系,是深度学习中最常用的正则化技术.在本模型中 dropout 概率设置为 0.3.




图3 随机失活算法示意
Fig. 3 Schematic diagram of the dropout

在模型训练过程中,优化函数和学习率的设置对模型的训练速度和训练结果有着重要影响.本文选择自适应学习率的优化方式 adamx,它是 adam 优化函数的一种变体,不仅具备 adam 每一次迭代中学习率都有确定范围、参数平稳的优势,同时令学习率上限范围的界定方法更加简单,提高了迭代效率^[21].在本模型训练过程之中,初始学习率设为 0.001.模型参数设置如表1所示.

表1 模型参数设置

Table 1 Model parameter setting							
项目	输入节点数	隐含层层数	激活函数	优化函数	迭代次数	初始学习速率	批处理量
参数值	10	4	ReLU	adamx	4 000	0.001	150

1.2 精度评估

本文采用决定系数(R^2)、平均绝对误差(MAD)以及均方根误差(RMSE)作为精度评定标准^[22].

决定系数(R^2)一般用于回归模型中评估预测值和真实值的符合程度,一般地, R^2 越接近1,表示回归分析中自变量对因变量的解释越好.

平均绝对误差(MAD)是所有单个观测值与算术平均值的偏差的绝对值的平均,可以避免误差相互抵消的问题,因而可以准确反映实际预测误差的大小^[23].

均方根误差(RMSE)是预测值与真实值偏差的平方与观测次数比值的平方根,用来衡量预测值与真实值之间的偏差.其值越小,预测值越接近真实值,即精度越高.

2 结果与讨论

2.1 研究区概况

本文选择的研究区域为中国华东地区,地理范围为 23.56°~38.41°N, 113.57°~122.96°E,覆盖上海市、浙江省、江苏省、山东省、安徽省、江西省和

福建省在内的六省一市,由于台湾省无国控点,无法开展实验,所以本实验未加入对台湾省的分析.本研究区域如图4所示.

2.2 实验数据

本实验所用数据见表2.

表2 实验数据

Table 2 Experimental dataset		
数据类型	具体类型	数据来源
AOD	Himawari-8	www.eorc.jaxa.jp/ptree/
PM _{2.5}	国控点	http://106.37.208.233:20035/
气象要素	ERA5 再分析资料	http://apps.ecmwf.int/datasets/
植被覆盖	ERA5 再分析资料	http://apps.ecmwf.int/datasets/
地面高程	SRTM(30 m)	http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

2.3 PM_{2.5}与各反演要素相关性分析

对10个反演要素和地面 PM_{2.5}真值进行时空匹配,共获得66 611条有效数据.对季节进行分割后,获得春季数据(3~5月)20 290条、夏季数据(6~8月)12 734条、秋季数据(9~11月)16 064条、冬季数据(12月~次年1、2月)17 523条,然后使用 SPSS 软件分析各反演要素与 PM_{2.5}的相关性如表3所示.

表 3 PM_{2.5}与各反演要素间 Pearson 相关系数

Table 3 Pearson correlation coefficient between PM_{2.5} and each inversion factor

季节	AOD	T	RH	p	RAIN	WSH	WSV	CVH	CVL	DEM
春季	0.471	-0.067	0.056	0.09	-0.02	-0.078	-0.047	-0.171	0.213	-0.027
夏季	0.542	0.077	-0.182	0.017	-0.015	-0.137	-0.085	-0.119	0.185	0.002
秋季	0.49	-0.252	0.234	0.078	-0.011	-0.112	-0.062	-0.119	0.19	0.009
冬季	0.484	0.128	0.284	-0.014	-0.015	-0.182	-0.083	-0.152	0.193	-0.053




图 4 研究区域示意

Fig. 4 Location of the study area

由表 3 得出,PM_{2.5}与气溶胶光学厚度(AOD)的相关性最高,相关系数均高于 0.4,其中夏季达到了 0.542,因为 AOD 为表征大气浑浊程度的物理量,其

值越高表明大气污染越强,相应的 PM_{2.5}浓度可能越高;PM_{2.5}与降水(RAIN)、风速(WSH/WSV)呈负相关关系,降水可以冲刷悬浮于空气中的 PM_{2.5}颗粒,从而降低 PM_{2.5}的质量浓度,风速可以降低 PM_{2.5}的积聚,所以也与 PM_{2.5}呈负相关;PM_{2.5}与高植被覆盖指数(CVH)负相关,矮植被覆盖指数(CVL)正相关,这与高植被可以更好地吸收、吸附和转移颗粒物有关.而 PM_{2.5}与温度(T)、湿度(RH)、气压(p)以及地面数字高程(DEM)的相关性则随季节的变化而改变因而本实验针对 4 个不同季节分别构建模型.

将 4 个季节反演数据集的 80% 用于模型训练,20% 用于验证.为消除数据因时间上连续性带来的偏差,对数据打乱后随机抽样选取训练数据和验证数据.

2.4 反演模型结果对比分析

2.4.1 各模型精度评定

按照 1.1 节所述策略完成基于深度神经网络的反演模型构建(X3 模型),并且与传统的单要素非线性回归^[24](X1 模型)和多元线性回归模型^[25](X2 模型)进行对比.3 类反演模型在验证数据集上的反演与效果如图 5 所示,其精度评定结果如表 4 所示.

表 4 各反演模型精度对比¹⁾

Table 4 Comparison of the accuracies of each inversion model


数据时相	反演模型	R ²	MAD	RMSE
春季	X1 $y = 3.502AOD^3 - 18.931AOD^2 + 54.678AOD + 31.643$	0.229	16.38	22.56
	X2 $y = 166.967 + 34.479AOD + 18.199CVL - 2.43WSH - 0.517T - 13.081p - 6.84CVH - 0.292WSV - 2298.98RAIN$	0.266	15.71	21.74
	X3 深度神经网络	0.566	11.63	16.83
夏季	X1 $y = 1.565AOD^3 - 7.882AOD^2 + 31.197AOD + 22.736$	0.281	10.1	13.15
	X2 $y = 75.317 + 22.057AOD + 5.271CVL - 26.661RH - 1.864WSH + 0.299T - 0.847WSV - 7.432CVH - 4.056p$	0.349	9.347	12.51
	X3 深度神经网络	0.75	4.91	7.64
秋季	X1 $y = -4.982AOD^3 + 22.308AOD^2 + 31.006AOD + 33.147$	0.224	19.57	25.83
	X2 $y = 533.218 + 47.301AOD + 18.76CVL + 60.408RH - 1.14WSH - 1.769T - 7797.305RAIN - 4.616CVH - 51.868p$	0.393	24.09	32.73
	X3 深度神经网络	0.86	7.09	10.81
冬季	X1 $y = 9.618AOD^3 - 36.939AOD^2 + 97.684AOD + 41.839$	0.236	25.60	34.49
	X2 $y = 539.775 + 57.068AOD + 24.534CVL - 5.501WSH + 47.906RH - 50.959p - 2.608WSV - 20.884CVH - 0.025DEM - 0.485T - 16822.963RAIN$	0.312	24.09	32.73
	X3 深度神经网络	0.613	16.67	24.66

1) 黑体字为最优结果标注

由图 5 可见,与单元素非线性回归(X1)、多元线性回归(X2)结果相比,在任何季节 DNN 模型(X3)反演结果的离散程度均更低,预测值和真实值更接近。

由表 4 也可以看出,无论在任何季节,X1 模型精度最低,X2 模型加入多种要素反演后的结果更具科学性,且精度有少量的提升,X3 模型在精度上远优

于其他两种模型, R^2 在各个季节均很高(0.5 以上),并且误差相对较小,可见,本文提出的基于 DNN 的反演模型的反演精度优于另外两种模型。同时,该模型的反演精度与季节有关,夏季和秋季的反演效果最好, R^2 分别达到了 0.75 和 0.86,并且均方根误差为 7.64 和 10.81;春季和冬季的反演效果虽然略逊于夏季和秋季,但依然整体优于 X1 和 X2 方法。



(a) 春季; (b) 夏季; (c) 秋季; (d) 冬季

图 5 分季节各反演模型回归效果

Fig. 5 Regression results of the inversion model with seasonal data


2.4.2 结果可视化分析

对 AOD 数据进行云量计算,选择云量覆盖最少的产品进行 3 种模型的反演并可视化,结果如图 6 所示。

从 2016 年 7 月 25 日可视化结果可知,国控点插值出多个 $\text{PM}_{2.5}$ 高值区,但结果不平滑且分辨率较低。同时,单要素非线性回归模型与 AOD 的可视化结果保持较好的一致性,但并没有反演出安徽中部和江西省的 $\text{PM}_{2.5}$ 高值区;多元线性回归模型的反演效果有所提升,但粒度偏大;基于 DNN 的模型不仅与国控点插值结果保持较好的一致性,并且颗粒度

更小、分辨率更高。

从 2017 年 12 月 24 日国测点插值结果可知,华东地区中部 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度最高,呈中部向南北递减的趋势,西南部也存在较高的 $\text{PM}_{2.5}$ 。AOD 可视化结果在安徽北部并没有较高浓度,同时单要素非线性回归与多元线性回归模型在安徽北部也呈现低值,与国控点插值结果相反,反观基于 DNN 的反演模型,其结果与地面监测站点的 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度分布更加一致,并且在地面监测站未有明显 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度变化的区域,DNN 反演可以得到更小颗粒更精确的结果。



(a1) ~ (e1) 2016-07-25; (a2) ~ (e2) 2017-12-24; (a) 国控点 $PM_{2.5}$ 插值; (b) AOD 数据插值;

(c) 单要素非线性; (d) 多元线性; (e) DNN 模型

图 6 反演结果对比

Fig. 6 Comparison of inversion results

3 结论

(1) $PM_{2.5}$ 与反演要素的相关性特征结果表明, 本文选取的 10 个要素中, $PM_{2.5}$ 与 AOD、降水、风速、高植被覆盖指数呈正相关关系, 其中对 AOD 有着较强的正相关性; 和矮植被覆盖指数呈负相关关系. 而与温度、湿度、气压以及 DEM 的相关性则随季节的变化而改变. 因此, 在不同季节各个要素对 $PM_{2.5}$ 浓度的变化产生不同的影响, 分季节建模与分析是合理且必要的.

(2) DNN 模型为本实验中华东地区 $PM_{2.5}$ 的最优反演模型; 仅使用单要素 AOD 的反演模型在任何季节的 R^2 都较低, 当加入了其他要素以后 R^2 会有一定程度的提高, 但是多元线性回归模型提升的精度有限, 任何季节的 R^2 都在 0.4 以下, 而基于 DNN 的模型反演 R^2 都在 0.5 以上. 并且通过对不同模型可视化的结果分析也可得出, DNN 模型的反演效果最好, 分辨率最高. 因而本文提出的基于 DNN 的反演模型可以作为华东地区反演 $PM_{2.5}$ 的最优模型.

(3) 不同季节的 DNN 模型效果分析: 相比于另外两种反演模型, 基于 DNN 的反演模型在任何季节都有着较好的反演效果, 但是各个季节之间的效果会存在一定的差异. 秋季的反演效果最好 R^2 达到

0.86, 夏季次之, 然后是冬季和春季, 虽然不同季节存在差异, 但总体的反演效果都较好.

(4) 华东地区为我国工业水平最高的经济区, 对其快速发展所带来的空气质量问题展开探究, 可以为政府决策提供依据, 也可以为经济的可持续发展提供指导.

参考文献:

- [1] 郁珍艳, 高大伟, 李正泉, 等. 华东区域 $PM_{2.5}$ 变化背景下浙江省人口经济暴露水平评估[J]. 环境科学, 2017, **38**(12): 4924-4931.
Yu Z Y, Gao D W, Li Z Q, *et al.* Exposure level of population and economy in Zhejiang Province considering the background of $PM_{2.5}$ in East China [J]. Environmental Science, 2017, **38**(12): 4924-4931.
- [2] 郭建平, 吴业荣, 张小曳, 等. BP 网络框架下 MODIS 气溶胶光学厚度产品估算中国东部 $PM_{2.5}$ [J]. 环境科学, 2013, **34**(3): 817-825.
Guo J P, Wu Y R, Zhang X Y, *et al.* Estimation of $PM_{2.5}$ over eastern China from MODIS aerosol optical depth using the back propagation neural network [J]. Environmental Science, 2013, **34**(3): 817-825.
- [3] 贺晋瑜, 燕丽, 王彦超, 等. 我国 $PM_{2.5}$ 浓度分阶段改善目标情景分析[J]. 环境科学, 2019, **40**(5): 2036-2042.
He J Y, Yan L, Wang Y C, *et al.* Scenario analysis of $PM_{2.5}$ concentration targets and milestones in China [J]. Environmental Science, 2019, **40**(5): 2036-2042.
- [4] 吴健生, 王茜. 基于 AOD 数据反演地面 $PM_{2.5}$ 浓度研究进展[J]. 环境科学与技术, 2017, **40**(8): 68-76.

- Wu J S, Wang X. Research progress of retrieval ground-level PM_{2.5} concentration based on AOD data [J]. *Environmental Science & Technology*, 2017, **40**(8): 68-76.
- [5] 陈辉, 厉青, 李莹, 等. 京津冀及周边地区 PM_{2.5} 时空变化特征遥感监测分析[J]. *环境科学*, 2019, **40**(1): 33-43.
- Chen H, Li Q, Li Y, *et al.* Monitoring and analysis of the spatio-temporal change characteristics of the PM_{2.5} concentration over Beijing-Tianjin-Hebei and its surrounding regions based on remote sensing[J]. *Environmental Science*, 2019, **40**(1): 33-43.
- [6] 徐建辉, 江洪. 长江三角洲 PM_{2.5} 质量浓度遥感估算与时空分布特征[J]. *环境科学*, 2015, **36**(9): 3119-3127.
- Xu J H, Jiang H. Estimation of PM_{2.5} concentration over the Yangtze Delta using remote sensing: analysis of spatial and temporal variations[J]. *Environmental Science*, 2015, **36**(9): 3119-3127.
- [7] Li S W, Joseph E, Min Q L. Remote sensing of ground-level PM_{2.5} combining AOD and backscattering profile [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2016, **183**: 120-128.
- [8] Hoff R M, Christopher S A. Remote sensing of particulate pollution from space: have we reached the promised land? [J]. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 2009, **59**(6): 645-675.
- [9] 周云云, 张德英, 施润和. 多种气象要素及其变化对 AOD 与 PM_{2.5} 关联模型的影响研究[J]. *环境科学学报*, 2019, **39**(1): 204-211.
- Zhou Y Y, Zhang D Y, Shi R H. Influence of multiple meteorological parameters and their variations on the association model of AOD and PM_{2.5} [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2019, **39**(1): 204-211.
- [10] Koelmeyer R B A, Homan C D, Matthijsen J. Comparison of spatial and temporal variations of aerosol optical thickness and particulate matter over Europe [J]. *Atmospheric Environment*, 2006, **40**(27): 5304-5315.
- [11] 张智, 白穆, 游洁妍. 基于 MODIS 数据的 PM_{2.5} 反演在大气污染监测中的应用[J]. *测绘科学*, 2016, **41**(9): 42-46.
- Zhang Z, Bai M, You H Y. Application of PM_{2.5} retrieval in air pollution monitoring with MODIS data[J]. *Science of Surveying and Mapping*, 2016, **41**(9): 42-46.
- [12] 李瑶, 刘琳, 胡潭高, 等. 石河子市 PM_{2.5} 浓度的遥感反演研究[J]. *环境科学与管理*, 2018, **43**(1): 138-142.
- Li Y, Liu L, Hu T G, *et al.* Remote sensing estimation model of PM_{2.5} mass concentration in Shihezi City [J]. *Environmental Science and Management*, 2018, **43**(1): 138-142.
- [13] 黄婕, 张丰, 杜震洪, 等. 基于 RNN-CNN 集成深度学习模型的 PM_{2.5} 小时浓度预测[J]. *浙江大学学报(理学版)*, 2019, **46**(3): 370-379.
- Huang J, Zhang F, Du Z H, *et al.* Hourly concentration prediction of PM_{2.5} based on RNN-CNN ensemble deep learning model[J]. *Journal of Zhejiang University (Science Edition)*, 2019, **46**(3): 370-379.
- [14] 符海月, 张伟婷. 时间尺度重构 EEMD-GRNN 改进模型预测 PM_{2.5} 的研究[J]. *地球信息科学学报*, 2019, **21**(7): 1132-1142.
- Fu H Y, Zhang Y T. Improving the EEMD-GRNN model for PM_{2.5} prediction based on time scale reconstruction [J]. *Journal of Geo-information Science*, 2019, **21**(7): 1132-1142.
- [15] 申原, 陈朝亮, 钱静, 等. 基于随机森林的高分辨率 PM_{2.5} 遥感反演——以广东省为例[J]. *集成技术*, 2018, **7**(3): 31-41.
- Shen Y, Chen C L, Qian J, *et al.* High resolution PM_{2.5} estimation using remote sensing data based on random forest—a case study of Guangdong, China [J]. *Journal of Integration Technology*, 2018, **7**(3): 31-41.
- [16] Bessho K, Date K, Hayashi M, *et al.* An introduction to Himawari-8/9—Japan's new-generation geostationary meteorological satellites [J]. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, 2016, **94**(2): 151-183.
- [17] 葛邦宇, 杨磊库, 陈兴峰, 等. 暗目标法的 Himawari-8 静止卫星数据气溶胶反演[J]. *遥感学报*, 2018, **22**(1): 38-50.
- Ge B Y, Yang L K, Chen X F, *et al.* Study on aerosol optical depth retrieval over land from Himawari-8 data based on dark target method [J]. *Journal of Remote Sensing*, 2018, **22**(1): 38-50.
- [18] 张夕迪, 孙军. 葵花 8 号卫星在暴雨对流云团监测中的应用分析[J]. *气象*, 2018, **44**(10): 1245-1254.
- Zhang X D, Sun J. Application analysis of Himawari-8 in monitoring heavy rain convective clouds [J]. *Meteorological Monthly*, 2018, **44**(10): 1245-1254.
- [19] 朝鲁门, 宁小莉, 包玉海, 等. 基于葵花-8 卫星的白天冰云识别初探[J]. *内蒙古农业大学学报(自然科学版)*, 2019, **40**(2): 45-49.
- Chao L M, Ning X L, Bao Y H, *et al.* Preliminary study of identification day ice cloud based on Himawari-8 data [J]. *Journal of Inner Mongolia Agricultural University (Natural Science Edition)*, 2019, **40**(2): 45-49.
- [20] Srivastava N, Hinton G, Krizhevsky A, *et al.* Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting [J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2014, **15**: 1929-1958.
- [21] Kingma D P, Ba J. Adam: a method for stochastic optimization [C]. *ICLR 2015*, 2015. 1-15.
- [22] 武紫超. 石家庄地区 PM_{2.5} 浓度的反演模型构建研究[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2019.
- Wu Z C. Study on the construction of inversion model of PM_{2.5} concentration in Shijiazhuang Area [D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2019.
- [23] 贾俊平, 何晓群, 金勇. 统计学[M]. (第四版). 北京: 中国人民大学出版社, 2009. 374.
- [24] Bates D M, Watts D G. 非线性回归分析及其应用[M]. 韦博成, 万方焕, 朱宏图, 译. 北京: 中国统计出版社, 1997.
- [25] 刘严. 多元线性回归的数学模型[J]. *沈阳工程学院学报(自然科学版)*, 2005, **1**(2-3): 128-129.
- Liu Y. Mathematical model of multiple linear regression [J]. *Journal of Shenyang Institute of Engineering (Natural Science)*, 2005, **1**(2-3): 128-129.

CONTENTS

PM _{2.5} Inversion Using Remote Sensing Data in Eastern China Based on Deep Learning	LIU Lin-yu, ZHANG Yong-jun, LI Yan-sheng, <i>et al.</i> (1513)
Regional Air Pollution Process in Winter over the Yangtze River Delta and Its Influence on Typical Northern Cities	LI Rui, LI Qing, XU Jian, <i>et al.</i> (1520)
Influencing Factors of Ozone Concentration in Xi'an Based on Generalized Additive Models	HUANG Xiao-gang, SHAO Tian-jie, ZHAO Jing-bo, <i>et al.</i> (1535)
Spatial and Temporal Distribution Characteristics of Levoglucosan and Its Isomers in PM _{2.5} in Beijing and Six Surrounding Cities	ZHU Hong-xia, TAO Xue-mei, WANG Chao, <i>et al.</i> (1544)
Characteristics and Sources Apportionment of Fine Particulate Matter in a Typical Coastal City During the Heating Period	LI Ming-yan, YANG Wen, WEI Min, <i>et al.</i> (1550)
Characteristics and Source Apportionment of Black Carbon in Chengdu	WANG Lu, YUAN Liang, ZHANG Xiao-ling, <i>et al.</i> (1561)
Effects of VOCs on Ozone Formation in the Tianjin Suburbs in Summer	YAO Qing, HAN Su-qin, ZHANG Yu-fen, <i>et al.</i> (1573)
Source Profiles and Impact of Volatile Organic Compounds in the Coating Manufacturing Industry	WU Jian, GAO Song, CHEN Xi, <i>et al.</i> (1582)
Characteristics of Condensable Particulate Matter in Ultra-low Emission Coal-Fired Power Plants	DENG Jian-guo, WANG Gang, ZHANG Ying, <i>et al.</i> (1589)
Distribution and Source Analysis of Nitrate in Surface Waters of China	ZHANG Xin, ZHANG Yan, BI Zhi-lei, <i>et al.</i> (1594)
Spatial Characteristics and Ecological Risks of Perfluoroalkyl Substances in Coastal Urbanized Areas of China and South Korea	YANG Hong-fa, SHI Bin, ZHOU Yun-qiao, <i>et al.</i> (1607)
Analysis of Water Quality Change and Its Driving Factors of the Xiaoqing River Estuary in Recent Ten Years	FAN Xin-feng, HAN Mei, WANG Lei, <i>et al.</i> (1619)
Distribution of Four Artificial Sweeteners in Water Treatment and Water Supply System in City H of Zhejiang Province	MA Xiao-yan, HU Hui, LU Si-jia, <i>et al.</i> (1629)
Changes in Epilithic Algae Community and Its Relationship with Environmental Factors in the Meixi River, a Tributary of the Three Gorges Reservoir	MI Wen-mei, SHI Jun-qiong, YANG Yan-jun, <i>et al.</i> (1636)
Succession Pattern of Phytoplankton and Its Drivers in Lake Luoma, Jiangsu Province	ZHANG Qing-ji, WANG Ye-yu, WANG Jin-dong, <i>et al.</i> (1648)
Relationship Between Diversity of Aquatic Plant Communities and Water Environmental Factors in Lhalu Wetland	WANG Jia-jun, TIAN Han-xin, ZHOU Lei, <i>et al.</i> (1657)
Evolution Characteristics and Driving Factors of Denitrification Community Based on Network Analysis in the Process of Spring Thermal Layer Formation in Zhoucun Reservoir	ZHOU Shi-lei, SUN Yue, ZHANG Yi-ran, <i>et al.</i> (1666)
Temporal and Spatial Distribution Characteristics and Difference Analysis of Nitrogen and Phosphorus in Daihai Lake	ZHAO Li, CHEN Jun-yi, JIANG Xia, <i>et al.</i> (1676)
Sediment Denitrification Rate and Its Response to Exogenous Carbon and Nitrogen in the Ponds and Bottomland of the Chaohu Lakeshore Zone	LI Ru-zhong, WANG Li, LIU Chao (1684)
Phosphate Control Effect and Water Body Remediation of Magnesium Modified Reed Biochar	DING Yu-qin, LI Da-peng, ZHANG Shuai, <i>et al.</i> (1692)
Efficiency of Magnesium Hydroxide Capping and Amendment to Control Phosphorus Release from Sediments	YANG Chun-yi, ZHAN Yan-hui, LIN Jian-wei, <i>et al.</i> (1700)
Characteristics of Chemical Fractions of Dissolved Organic Matter in Road Runoff in Beijing	CHEN Meng-yao, DU Xiao-li, YU Zhen-ya, <i>et al.</i> (1709)
3D Porous Photothermal Materials for High Salt Wastewater Treatment	HUANG Le, XU Ying-feng, XIE Qian-qing, <i>et al.</i> (1716)
Electrocatalytic Oxidation of Sulfadiazine with Ni-Doped Sb-SnO ₂ Ceramic Ring Particle Electrode	SHI Qiu-jun, LIU An-di, TANG Bo-bin, <i>et al.</i> (1725)
Degradation of A07 with Magnetic Fe ₃ O ₄ -CuO Heterogeneous Catalyzed Sodium Percarbonate System	XU Jie, WANG Lin, CHEN Jia-bin, <i>et al.</i> (1734)
Red Mud-activated Peroxymonosulfate for Ciprofloxacin Degradation: Efficiency and Mechanism	SHI Jing-zhuan, WEI Hong, ZHOU Xiao-de, <i>et al.</i> (1743)
Influence of Industrial Wastewater Quality on Advanced Treatment of Microbubble Ozonation	ZHANG Jing, ZHANG Shou-jing, LIU Chun, <i>et al.</i> (1752)
Adsorption Properties of Sludge-hydrochar for Methylene Blue	CHEN Li-yuan, LI Da-peng, ZHU Wen-juan, <i>et al.</i> (1761)
Preparation of Modified Watermelon Biochar and Its Adsorption Properties for Pb(II)	BI Jing-wang, SHAN Rui, HAN Jing, <i>et al.</i> (1770)
Construction and Denitrification Performance of A ² /O Based on Partial Nitrification Coupled with an ANAMMOX System	LIU Xiao-chai, RONG Yi, WEN Li-jie, <i>et al.</i> (1779)
Construction and Mechanism of Methanotroph-based Ultimate Denitrification System for Tailwater of Urban Sewage Plants	YANG Ya-nan, LI Yan-cheng, LI Jiang, <i>et al.</i> (1787)
Impact of Hydraulic Retention Time on Performance of Partial Nitrification Granular Sludge in Continuous Stirred-Tank Reactor	WANG Jian-fang, QI Ze-kun, QIAN Fei-yue, <i>et al.</i> (1794)
Realization Process of Nitrification and Changes in Sludge Characteristics in Granular Sludge Reactor for Low Strength Sewage Treatment	ZHU Lin, CHENG Cheng, SONG Jia-jun, <i>et al.</i> (1801)
Characteristics of Organics Transformation and Sludge Morphology in an ABR for Sewage Treatment with Different HRTs	CHENG Cheng, ZHU Lin, GUO Kai-cheng, <i>et al.</i> (1808)
Effect of Adding Granular Activated Carbon (GAC)/Manganese Dioxide (MnO ₂) for the Anaerobic Digestion of Waste Activated Sludge	YANG Bo, JIA Li-juan, XU Hui, <i>et al.</i> (1816)
Trace Metals Pollution and Health Risks for Planning Area Soils of 193 Chinese Cities	LI Kuo, PENG Min, YANG Zheng, <i>et al.</i> (1825)
Assessment of Heavy Metal Pollution in Surface Dust of Lanzhou Schools Based on Random Forests	HU Meng-jun, WANG Jia, ZHANG Ya-yun, <i>et al.</i> (1838)
Contents, Sources, and Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Surface Soils of Various Functional Zones in Yangzhou City, China	YAO Cheng, NI Jin-zhi, LIU Rui, <i>et al.</i> (1847)
Safety Assessment of Rice Planting in Soil Cadmium Geological Anomaly Areas in Southwest Guangxi	CHEN Tong-bin, PANG Rui, WANG Fo-peng, <i>et al.</i> (1855)
Bioavailability and Influencing Factors of Soil Cd in the Major Farming Areas of Chongqing	WANG Rui, HU Xiao-lan, ZHANG Yong-wen, <i>et al.</i> (1864)
Control of Cadmium Migration and Transformation in Alkaline Paddy Soil-Rice Using Cotton Stalk Biochar	LIU Shi-dou, ZHU Xin-ping, HAN Yao-guang, <i>et al.</i> (1871)
Reduction of Soil Cadmium Activity and Rice Cadmium Content by 4-year-consecutive Application of Organic Fertilizer	XUE Yi, YIN Ze-run, SHENG Hao, <i>et al.</i> (1880)
Effects of Nano-magnesium Hydroxide on the Forms of Cadmium in Different Types of Soil	DENG Ji-bao, ZHANG Chun-lai, XU Wei-hong (1888)
Selenium Uptake Characteristics of Reclaimed Soil-Crop from Mining Wasteland and Its Antagonistic Effects on Heavy Metals	YIN Bing, WANG Jian-fei, SHI Sheng, <i>et al.</i> (1904)
Dynamic Effects of Different Biochars on Soil Properties and Crop Yield of Acid Farmland	YANG Cai-di, ZONG Yu-tong, LU Sheng-gao (1914)
Effects of Fertilizer Reduction and Application of Organic Fertilizer on Soil Nitrogen and Phosphorus Nutrients and Crop Yield in a Purple Soil Sloping Field	ZHU Hao-yu, GAO Ming, LONG Yi, <i>et al.</i> (1921)
Response of Nitrogen Loss Flux in Purple Soil Sloping Field to Reduced Fertilizer and Combining Straw	XIONG Zi-yi, WANG Zi-fang, LONG Yi, <i>et al.</i> (1930)
Effect and Approach of <i>Enteromorpha prolifera</i> Biochar to Improve Coastal Saline Soil	WU Dan, SUN Ping, LU Peng-zhan, <i>et al.</i> (1941)
Vertical Distribution of Soil Dissolved Carbon and Its Influencing Factors in the Artificial Shelterbelt Irrigated with Saline Water in an Extreme Drought Desert	MENG Tian-ge, WU Lu-yao, ZHANG Shao-lei, <i>et al.</i> (1950)
Response of Soil Enzyme Activity and Chemical Properties to Nitrogen Addition in a Korean Pine Plantation	LÜ Lai-xin, SONG Lei, LIU Zhi-li, <i>et al.</i> (1960)
Consumption Capacity of N ₂ O in Paddy Soil and the Response Mechanism of <i>nosZ-I</i> -containing Communities	GUO Jun-li, TIAN Mei-jie, GE Ti-da, <i>et al.</i> (1968)
Predicting the Recycling Potential and Evaluating the Environmental Benefits of Waste Electrical and Electronic Equipment in Beijing-Tianjin-Hebei	CHEN Pan, SHI Xiao-qing (1976)
Relationship Between Urban Industrialization and PM _{2.5} Concentration in China and the Internal Mechanism of EKC	LI Ya-nan, DING Zhen-min, DENG Yuan-jie, <i>et al.</i> (1987)