

方知库  
Eco-Environmental  
Knowledge Web

# 环境科学

ENVIRONMENTAL SCIENCE

ISSN 0250-3301 CODEN HCKHDV  
HUANJING KEXUE

■ 主办 中国科学院生态环境研究中心

■ 出版 科学出版社



2020

Vol.41 No.5  
第41卷 第5期



目次

|                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上海大气 PM <sub>2.5</sub> 来源解析对比: 基于在线数据运用 3 种受体模型 .....                        | 周敏 (1997)                                                        |
| 不同浓度臭氧对单颗粒气溶胶化学组成的影响 .....                                                   | 吴梦曦, 成春雷, 黄渤, 李梅, 陈多宏 (2006)                                     |
| 二次有机气溶胶壳对氯化钠核吸湿性的影响: 基于单颗粒微观尺度 .....                                         | 张淑佳, 徐亮, 郭新梅, 黄道, 李卫军 (2017)                                     |
| 城区与县区不同空气质量下碳组分污染特征对比分析 .....                                                | 李欣悦, 张凯山, 邓林俐, 向铎鹏, 武文琪, 殷子渊 (2026)                              |
| 临沂市 PM <sub>2.5</sub> 和 PM <sub>10</sub> 中元素分布特征及来源解析 .....                  | 陆平, 赵雪艳, 殷宝辉, 张楠, 王歆华, 余浩, 杨文, 王晓丽 (2036)                        |
| 西安市秋冬季市区与山区微生物气溶胶组成特征及来源 .....                                               | 谢雯文, 路瑞, 慕飞飞, 戚玉珍, 白文艳, 李彦鹏 (2044)                               |
| 北京市典型餐饮企业大气污染物排放特征 .....                                                     | 何万清, 王天意, 邵霞, 聂磊, 石爱军 (2050)                                     |
| 基于随机森林模型的中国 PM <sub>2.5</sub> 浓度影响因素分析 .....                                 | 夏晓圣, 陈菁菁, 王佳佳, 程先富 (2057)                                        |
| 大气污染联合治理分区视角下的中国 PM <sub>2.5</sub> 关联关系时空变异特征分析 .....                        | 杨文涛, 黄慧坤, 魏东升, 赵斌, 彭焕华 (2066)                                    |
| 基于地-空观测数据的粤港澳大湾区大气污染调查及时空演变特征 .....                                          | 王耀庭, 梁加成, 郑祚芳, 李青春, 李威, 窦俊 (2075)                                |
| 龙子祠泉域岩溶地下水水化学特征及成因 .....                                                     | 唐春雷, 郑秀清, 梁永平 (2087)                                             |
| 三峡水库总磷时空变化特征及滞留效应分析 .....                                                    | 唐小娅, 童思陈, 黄国鲜, 许光祥, 李丹 (2096)                                    |
| 三峡水库汛后蓄水期典型支流溶解氧与叶绿素 a 垂向分布特征 .....                                          | 杨凡, 纪道斌, 王丽婧, 李虹, 李莹杰 (2107)                                     |
| 汉丰湖正式运行年水体营养盐分布特征 .....                                                      | 付适, 倪九派, 何丙辉, 李天阳, 唐毅, 钱田, 向可翠 (2116)                            |
| 白洋淀水体富营养化和沉积物污染时空变化特征 .....                                                  | 刘鑫, 史斌, 孟晶, 周云桥, 可欣, 王铁宇 (2127)                                  |
| 新安江水库悬浮颗粒物时空分布、沉降通量及其营养盐效应 .....                                             | 史鹏程, 朱广伟, 杨文斌, 许海, 朱梦圆, 刘明亮, 虞左明, 吴志旭, 郑文婷, 王裕成, 笪文怡, 胡林娜 (2137) |
| 不同水文情景下高邮湖、南四湖和东平湖有色可溶性有机物的生物可利用性特征 .....                                    | 张柳青, 石玉, 李元鹏, 郭燕妮, 周蕾, 周永强, 张运林, 杨艳 (2149)                       |
| 水源水库藻类功能群落演替特征及水质评价 .....                                                    | 李衍庆, 黄廷林, 张海涵, 温成成, 杨尚业, 林子深, 高欣 (2158)                          |
| 人工强制混合对金盆水库水体藻类群落结构时空演替的影响 .....                                             | 王晨旭, 黄廷林, 李楠, 齐允之, 徐金兰, 司凡, 张晗, 路林超 (2166)                       |
| 雄安新区-白洋淀冬季冰封期水体好氧反硝化菌群落空间分布特征及驱动因素 .....                                     | 周石磊, 孙悦, 岳智丞, 张航, 王周强, 刘世崇, 彭瑞哲, 苑世超, 李再兴, 崔建升 (2177)            |
| 分层型水库水体好氧不产氧光合细菌时空演替特征 .....                                                 | 张海涵, 王燕, 黄廷林, 王晨旭, 路林超, 司凡, 李楠, 刘凯文, 闫苗苗, 苗雨甜 (2188)             |
| 大型通江湖泊有色可溶性有机物对不同水文情景的响应 .....                                               | 郭燕妮, 李元鹏, 石玉, 张柳青, 周蕾, 周永强, 张运林, 韩龙飞 (2198)                      |
| 秦岭北麓河流夏季有色溶解有机物分布特征及影响因素 .....                                               | 林子深, 黄廷林, 杨尚业, 温成成, 李衍庆, 周石磊, 宋选社 (2210)                         |
| 长江下游流水体中多环芳烃的分布及生态风险评估 .....                                                 | 贾天琪, 雷荣荣, 武小琳, 倪涛涛, 孙树睿, 郭伟, 刘文彬 (2221)                          |
| 太湖水体中 NSAIDs 的时空分布规律和生态风险评价 .....                                            | 廉杰, 李祎飞, 王晓喧, 叶彬, 邹华, 史红星 (2229)                                 |
| 8 种典型 PhACs 在水中的赋存、生态风险及其对大型溞的影响 .....                                       | 徐鑫磊, 刘建超, 陆光华 (2239)                                             |
| 我国南方桉树人工林区水库沉积物污染物的分布特征及迁移规律 .....                                           | 朱雅, 李一平, 罗凡, 李荣辉, 黄列, 程一鑫, 蒋裕丰 (2247)                            |
| 基于连续监测的城市内河返黑返臭机制初探: 以南宁市二坑溪为例 .....                                         | 李永新, 王威, 何妹, 申泰铭 (2257)                                          |
| 城郊流域源汇景观格局与水体抗生性的关系 .....                                                    | 李敏, 唐剑峰, 陈利顶, 赵方凯, 冯青郁, 杨磊 (2264)                                |
| 城市雨水径流中溶解性有机物的分子化学多样性 .....                                                  | 聂云汉, 陈浩, 李磊, 朱奔, 赵昕, 贾其隆, 徐慧婷, 叶建锋 (2272)                        |
| 方解石/氯磷灰石混合物添加对水体内源磷迁移转化的调控效应和机制 .....                                        | 柏晓云, 林建伟, 詹艳慧, 常明玥, 吴俊麟, 辛慧敏, 黄良君 (2281)                         |
| 不同环境条件下水铁矿和针铁矿纳米颗粒稳定性 .....                                                  | 王智巧, 马杰, 陈雅丽, 翁莉萍, 顾亚陶, 李永涛 (2292)                               |
| 向日葵秸秆生物炭强化 Fe(III)/S <sub>2</sub> O <sub>8</sub> <sup>2-</sup> 体系降解苯甲酸 ..... | 孙鹏, 张凯凯, 张玉, 张延荣 (2301)                                          |
| 非活化单过硫酸盐降解柳氮磺胺吡啶: 动力学及机制 .....                                               | 丁曦, 张学维, 周润生, 宋哲, 严佳颖, 周磊, 修光利 (2310)                            |
| 贵州某规模化养猪场废水中抗生素的污染特征及去除效果 .....                                              | 杨钊, 李江, 向福亮, 李彦澄, 马凯, 谢锋 (2320)                                  |
| 新型填料 A/O 生物滤池处理低碳氮比农村污水脱氮 .....                                              | 赵远哲, 杨永哲, 王海燕, 储昭升, 常洋, 董伟羊, 闫国凯, 王欢, 李丛宇 (2329)                 |
| 贫营养好氧反硝化菌株的脱氮特性及氮/碳平衡分析 .....                                                | 文刚, 王彤, 黄廷林, 万琪琪, 曹瑞华, 寇莉青, 杨尚业 (2339)                           |
| 连续流 SNAD 工艺处理猪场沼液启动过程中微生物种群演变及脱氮性能 .....                                     | 秦嘉伟, 信欣, 鲁航, 张萍萍, 王露蓉, 邹长武, 郭俊元 (2349)                           |
| 不同培养条件厌氧氨氧化颗粒污泥性质及微生物群落结构差异 .....                                            | 姜澄, 郭萌蕾, 谢军祥, 常尧枫, 谢嘉玮, 陈重军, 沈耀良 (2358)                          |
| 反硝化除磷耦合部分亚硝化-厌氧氨氧化一体式工艺的启动 .....                                             | 陈亚, 印雯, 张星星, 张钰, 宋吟玲, 吴鹏, 徐乐中 (2367)                             |
| 土壤环境承载力评价体系构建与应用 .....                                                       | 李笑诺, 丁寿康, 陈卫平, 王夏晖, 吕斯丹, 刘睿 (2373)                               |
| 磁性生物炭的合成及对土壤重金属污染的钝化效果 .....                                                 | 王俊楠, 程珊珊, 展文豪, 任强, 马晓宇, 王洋洋 (2381)                               |
| 还原增溶强化 EGTA 淋洗修复重金属污染土壤 .....                                                | 张金永, 朱玉婷, 王明新, 韩堂, 葛嘉琦 (2390)                                    |
| 不同价态铬和土壤理化性质对大麦根系毒性阈值的影响 .....                                               | 付平南, 贡晓飞, 罗丽韵, 王琪, 李花粉 (2398)                                    |
| 生物炭施用对紫色土旱坡地土壤氮流失形态及通量的影响 .....                                              | 王舒, 王子芳, 龙翼, 严冬春, 慈恩, 徐国鑫, 李妍, 高明 (2406)                         |
| 长期撂荒恢复土壤团聚体组成与有机碳分布关系 .....                                                  | 王兴, 钟泽坤, 张欣怡, 吴少君, 卢绪巧, 杨改河, 任成杰, 韩新辉 (2416)                     |
| 施用生物炭对壤土土壤微生物代谢养分限制和碳利用效率的影响 .....                                           | 王强, 耿增超, 许晨阳, 郭靖宇, 李倩倩, 刘莉丽, 赵汉红, 杜旭光 (2425)                     |
| 间种高粱及施用大颗粒尿素对茶园 N <sub>2</sub> O 排放的影响 .....                                 | 张珂彬, 刘新亮, 康曼, 王毅, 沈健林, 李勇 (2434)                                 |
| 缙云山森林植被类型对土壤 N <sub>2</sub> O 相关功能微生物的影响 .....                               | 王盛燕, 王富华, 罗东海, 吕盛, 王子芳, 高明 (2445)                                |
| 咸水滴灌对棉田土壤 N <sub>2</sub> O 排放和反硝化细菌群落结构的影响 .....                             | 郭慧楠, 马丽娟, 黄志杰, 李美琪, 侯振安, 阎伟 (2455)                               |
| 有机质提升对酸性红壤氮循环功能基因及功能微生物的影响 .....                                             | 储成, 吴赵越, 黄欠如, 韩成, 钟文辉 (2468)                                     |
| 模拟酸雨对毛竹阔叶林过渡带土壤真菌结构及其多样性的影响 .....                                            | 王楠, 潘小承, 王传宽, 白尚斌 (2476)                                         |
| 海洋沉积物中细菌 DNA 和 RNA 水平群落差异 .....                                              | 李明月, 杨雨虹, 米铁柱, 贺惠, 甄毓 (2485)                                     |
| 2003 ~ 2013 年中国湿地变化的空间格局与关联性 .....                                           | 周婷, 马蛟蛟, 徐颂军 (2496)                                              |

# 8 种典型 PhACs 在水中的赋存、生态风险及其对大型溞的影响

徐鑫磊, 刘建超\*, 陆光华

(河海大学环境学院, 浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室, 南京 210098)

**摘要:** 检测了 8 种典型的药物活性化合物 (PhACs) 在污水处理厂尾水受纳河流中的赋存情况. 结果显示 8 种 PhACs 夏、冬两季总浓度范围分别为  $27.6 \sim 226.4 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$  和  $56.6 \sim 368.8 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ , 其中咖啡因的浓度最高 ( $16.2 \sim 125.8 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ), 其次是罗红霉素 ( $3.3 \sim 89.2 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ) 和布洛芬 ( $3.6 \sim 59.2 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ). 8 种 PhACs 对绿藻、溞类和鱼类的总体生态风险 (MRQ) 在夏、冬两季分别为 1.51、0.08、5.68 和 8.34、0.22、6.45, 其中酮康唑、红霉素和布洛芬对藻类、溞类和鱼类 MRQ 的贡献率分别达到了 49%、85% 和 92% 以上. 从敏感物种来看, 冬季绿藻对 PhACs 最为敏感, 夏季鱼类对 PhACs 最为敏感. 环境浓度下 PhACs 对大型溞 21 d 混合暴露实验结果显示: 混合 PhACs 能够显著干扰大型溞的生长、生殖情况, 显著提升了大型溞生殖能力和游泳活性, 降低了心脏和胸肢跳动频率.

**关键词:** 药物活性化合物 (PhACs); 大型溞; 生殖; 生长; 生态毒理

中图分类号: X522 文献标识码: A 文章编号: 0250-3301(2020)05-2239-08 DOI: 10.13227/j.hjxx.201910089

## Occurrence and Ecological Risk of Eight Typical PhACs in Surface Water and Its Impact on *Daphnia magna*

XU Xin-lei, LIU Jian-chao\*, LU Guang-hua

(Key Laboratory for Integrated Regulation and Resources Development on Shallow Lakes, Ministry of Education, College of Environment, Hohai University, Nanjing 210098, China)

**Abstract:** The occurrence and risk assessment of eight typical pharmaceutical active compounds (PhACs) in a receiving water body of wastewater treatment plant effluent were investigated. The results showed that the total concentrations of eight PhACs in summer and winter ranged from  $27.6$  to  $226.4 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$  and  $56.6$  to  $368.8 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ , respectively. The concentration of caffeine ( $16.2$ – $125.8 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ) was highest, followed by roxithromycin ( $3.3$ – $89.2 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ) and ibuprofen ( $3.6$ – $59.2 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ). The total ecological risks (mixture risk quotients, MRQ) of eight PhACs to green algae, daphnia, and fish were 1.51, 0.08, and 5.68 in summer and 8.34, 0.22, and 6.45 in winter, respectively. The contribution rates of ketoconazole, erythromycin, and ibuprofen exceeded 49%, 85%, and 92% for MRQ in green algae, daphnia, and fish, respectively. In terms of sensitive species, green algae and fish are the most sensitive to PhACs in winter and summer, respectively. The results of 21 d chronic toxicity showed that mixed PhACs effect normal development and reproduction of *Daphnia magna*, resulting in an increase in reproductive capacity and swimming activity, and a reduction in heart rate and thoracic limb activity.

**Key words:** pharmaceutical active compounds (PhACs); *Daphnia magna*; reproduction; growth; ecological toxicology

作为一类新兴污染物, 药物活性化合物 (pharmaceutical active compounds, PhACs) 主要用来预防、诊断和治疗人类和动物的许多疾病<sup>[1]</sup>. 据估计, 全球每年人均药物消费量约为 15 g, 工业化国家则在 50 ~ 150 g 之间<sup>[2]</sup>. 大多数 PhACs 分子结构复杂, 不易挥发, 生物活性高, 大量使用导致 PhACs 在自然环境中大量赋存<sup>[3]</sup>, 其生态健康风险引起人们的广泛关注<sup>[4~6]</sup>. PhACs 能通过固体垃圾、工业废水、生活污水、水产养殖、牲畜粪便和农业生产等多途径进入自然水体<sup>[7]</sup>, 污水处理厂尾水排放被认为是 PhACs 进入自然水体的主要途径之一<sup>[8]</sup>. 前期研究发现, 在污水厂尾水排放口下游水体中 PhACs 的检出浓度明显要高于上游水体<sup>[9]</sup>. Liu 等<sup>[8]</sup>在对污水处理厂尾水受纳水体中 PhACs 检测发现: ETM 等 10 种单体 PhACs 的赋存浓度为  $67.0 \sim 107.6$

$\text{ng} \cdot \text{L}^{-1}$ , 总检出浓度在  $15.4 \sim 384.5 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$  之间<sup>[10]</sup>. 西班牙当地污水厂尾水受纳水体中 78 种 PhACs 的最高检出浓度达到  $23 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ <sup>[11]</sup>. 虽然 PhACs 检出浓度多在  $\text{ng} \cdot \text{L}^{-1} \sim \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$  范围, 但其长期暴露对生态系统安全甚至人类健康造成的不利影响不容忽视<sup>[12]</sup>. Liu 等<sup>[10]</sup>在对 8 种亲脂性 PhACs 的生物累积研究中发现, PhACs 能在鱼的肝脏、肌肉、脑等组织中累积, 布洛芬 (IPF) 对鱼类产生高的慢性生态风险, 而 ETM 对绿藻产生高的急性和慢性生态风险. 大型溞的慢性暴露实验结果表明: IPF 和

收稿日期: 2019-10-14; 修订日期: 2019-12-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (516090668); 中国博士后科学基金项目 (2018M630507, 2019T120389); 江苏高校优势学科建设工程项目

作者简介: 徐鑫磊 (1994 ~), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为污染生态化学, E-mail: xuxinlei941107@163.com

\* 通信作者, E-mail: jianchao-liu@hhu.edu.cn

CFI 等 PhACs 能影响大型蚤正常生殖、生长状况,随着 PhACs 暴露浓度的增加大型蚤的死亡率逐渐上升(CFI 暴露浓度为  $44.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  时大型蚤死亡率达到 100%),体长逐渐减小,首胎产卵时间逐渐延长<sup>[13]</sup>。天然水体中 PhACs 数量众多,其联合毒理效应研究尚少,在认知 PhACs 环境赋存的基础上,应进一步加强其复合污染生态风险研究。

大型蚤作为一种标准的模式生物,具有生活周期短、繁殖快、经济、方便易得、培养简单、对毒物敏感和测试指标丰富等优点。大型蚤属于浮游动物,其健康与否,将进一步影响水体中初级生产者和高级消费者的种群动态。本文以南京污水厂尾水受纳水体为研究区域,分析水体中 8 种典型 PhACs 赋存现状,即红霉素(ETM)、罗红霉素(ROX)、布洛芬(IPF)、酮康唑(KTC)、舍曲林(SER)、阿替洛尔(ATL)、氯贝酸(CA)和咖啡因(CFI);结合 PhACs 环境赋存状况,评价水体中典型 PhACs 的生态风险及其对大型蚤的慢性毒理效应。

## 1 材料与方法

### 1.1 试剂与仪器

CFI、ROX、IPF、ATL、CA 和 ETM 购自于 TCI Development Co., Ltd (Shanghai, China),其纯度大于 98%;KTC、SER 购自于 Dr. Ehrenstorfer (Augsburg, Germany),其纯度大于 98%;甲醇(色谱纯)购自于德国 Merck 公司。甲醇作溶剂配制  $1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$  的储备液置于  $-20^{\circ}\text{C}$  冰箱备用。超纯水由 MF-A10 超纯水机(美国 Millipore 公司)制备。

### 1.2 实验方法

#### 1.2.1 样品采集

本文选取了南京江宁污水厂尾水受纳水体为研究对象,在污水厂尾水排放口下游 1、2 和 3 km 处各设置一个采样断面,在 2018 年 7 月(夏季)和 12 月(冬季)进行了两次采样。利用水质采样器在水面下 0.5 m 处采集 1 L 水样放入棕色玻璃瓶中,加入适量甲醇(5%)以抑制细菌的生长,所有点位的样品一式 3 份。样品瓶用泡沫塑料包裹,放入含有干冰的样品储存箱中保存并迅速运回实验室。

#### 1.2.2 水样的预处理

水样用  $0.45 \mu\text{m}$  的玻璃纤维滤膜进行过滤。用 5 mL 甲醇、5 mL 超纯水和 5 mL 二氯甲烷活化 Waters HLB 固相萃取柱。以  $3 \sim 5 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$  的流速对过滤后的水样进行富集。过完水样的柱子用 10 mL 超纯水进行淋洗,并用氮气干燥。然后依次分别用 3 mL 甲醇、3 mL 甲醇:二氯甲烷混合液(体积比 = 1:1)和 3 mL 氨水:乙腈混合液(体积比 = 4.5%:

95.5%)溶液洗脱,洗脱液氮吹至干,用甲醇定容至 1 mL,收集在 1.5 mL 棕色进样瓶中待测。

### 1.3 仪器检测与质量控制

#### 1.3.1 仪器检测

利用 Waters Xevo TQ 三重四级杆质谱仪(电喷雾离子源)对 8 种 PhACs 进行了定性定量分析,配备 ACQUITY BEH C18 色谱柱, ( $2.1 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ ,  $1.7 \mu\text{m}$ , 美国 Waters 公司);柱温  $40^{\circ}\text{C}$ 。运用梯度洗脱的方法对目标药物进行洗脱,正离子模式(ESI+)流动相包括 A[水:甲醇(体积分数 98%:2%)+0.05%甲酸]和 B(甲醇+0.05%甲酸),负离子模式(ESI-)流动相为 A[水:甲醇混合液(体积分数 98%:2%)+5  $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$  乙酸铵]和 B(100%乙腈),进样体积为 5  $\mu\text{L}$ ,流速为  $0.4 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 。正离子模式流动相 A 梯度为 0~0.25 min 维持在 90%, 0.3~1.0 min 降到 40%, 1.0~5.0 min 降到 0%, 5.0~6.0 min 恢复到 90%。负离子模式流动相 A 梯度为 0~0.25 min 维持在 90%, 0.3~4.0 min 降到 10%, 4.0~5.0 min 维持在 10%, 5.0~6.0 min 恢复到 90%。

质谱条件:毛细管电压 3.0 kV,碰撞气体流速  $0.15 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$ ,离子源温度:  $150^{\circ}\text{C}$ ;锥孔反吹气流量:  $50 \text{ L} \cdot \text{h}^{-1}$ ;脱溶剂气温度:  $500^{\circ}\text{C}$ ;脱溶剂气流量:  $900 \text{ L} \cdot \text{h}^{-1}$ ;采用多重反应监测模式(MRM)对目标化合物进行定性和定量。ATL、ETM、CFI、KTC、ROX 和 SER 以正离子模式检测,而 CA 和 IPF 用负离子模式检测。

#### 1.3.2 质量控制与保证

整个实验过程均进行严格的质量控制,每批样品设置一个溶剂空白、一个野外空白和一个基质加标,保证样品前处理技术的稳定。样品中污染物均使用外标法计算,标准曲线由 7 个不同浓度梯度的混合标准溶液进行确定。8 种 PhACs 的检测限为  $0.04 \sim 0.16 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ,定量限为  $0.13 \sim 1.00 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ,回收率为 71.2%~92.6%,相对标准偏差低于 20%。溶剂空白和野外空白中未检出目标化合物。

### 1.4 大型蚤毒性实验

#### 1.4.1 受试生物

大型蚤(*Daphnia magna*)由中国科学院武汉水生生物研究所提供。实验开始前,大型蚤在实验室驯化 14 d,驯化介质为曝气 24 h 的纯净水;温度:  $(21 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ ;光暗周期:16 h:8 h;光照强度:1 000 lx。每天定时喂食纯种斜生栅藻(*Scenedesmus obliquus*)。

#### 1.4.2 实验方法

大型蚤 21 d 慢性生殖毒性实验参照 OECD 方法进行<sup>[14]</sup>。本实验设置清水对照组、溶剂对照组



(0.1% 甲醇)、环境浓度组和 100 倍环境浓度组, PhACs 实验暴露组见表 1, 真实浓度与理论浓度相比, 偏差低于 15%。随机选择一只 6~24 h 大型蚤幼体放入含有 50 mL 暴露溶液的 100 mL 烧杯中, 每个实验组设置 20 个平行。所有的实验烧杯用透明薄膜封好以尽可能减少水分的蒸发, 同时在薄膜上开数个小孔以满足大型蚤的生长需求, 然后将烧杯置于

智能光照培养箱中, 光暗比为 16 h: 8 h, 温度为  $(21 \pm 1)^\circ\text{C}$ 。大型蚤暴露周期为 21 d, 实验期间每隔 2 d 换一次暴露溶液并清洗烧杯, 同时每天用新鲜的斜生栅藻 ( $90\,000\text{ cells}\cdot\text{L}^{-1}$ ) 喂养大型蚤。每隔 24 h 观察记录大型蚤的存活以及产卵情况。21 d 暴露结束后, 进行大型蚤体长(包括尾刺)、心率、胸肢跳动数和游速等指标测定。

表 1 混合暴露组中 8 种 PhACs 浓度设置/ $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$

Table 1 Concentrations of eight PhACs in mixture exposure groups/ $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$

| 化合物                      | CFI  | SER   | ETM  | ROX  | IPF  | CA   | KTZ  | ATL  |
|--------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 环境浓度组 (EC-PhACs)         | 0.18 | 0.005 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 100 倍环境浓度组 (100EC-PhACs) | 18   | 0.5   | 12   | 22   | 6    | 1    | 3    | 1    |

1.4.3 测定项目

心率和胸肢跳动: 将暴露 21 d 后存活的 (以 15 s 内大型蚤包括触角能够活动为准) 大型蚤放置于显微镜下观察, 用秒表计数统计心率和胸肢跳动 ( $\text{次}\cdot\text{min}^{-1}$ )<sup>[15]</sup>。

体长: 在显微镜下用目微尺测量母蚤体长, 母蚤身体与刻度尺平行, 记录其对应的刻度 (包括尾刺)<sup>[15]</sup>。

游速: 将大型蚤放入培养皿, 加入刚好没过大型蚤身体的水量, 使其只能水平游动, 录制其游动的视频, 再将视频导入 tracker 软件测量游泳轨迹、速度和加速度<sup>[15]</sup>。

1.5 数据统计方法

1.5.1 风险评估方法

风险熵值法 (RQ 法) 是基于实验室毒理数据从化学响应角度对污染物的生态毒性及风险水平进行评估。RQ 是污染物实际检出浓度 (MEC) 和预测无影响浓度 (PNEC) 的比值, RQ 的计算公式见式 (1) 和 (2)。自然环境中污染物并不是单独存在的, 他们共同存在形成复合污染风险熵 (MRQ), 计算公式见式 (3)<sup>[16]</sup>:

$$RQ = MEC/PNEC \tag{1}$$

$$PNEC = LC_{50} \text{ 或 } EC_{50}/AF \tag{2}$$

$$MRQ_{MEC/PNEC} = \sum MEC/PNEC \tag{3}$$

式中,  $EC_{50}$ : 半数效应浓度,  $LC_{50}$ : 半致死浓度, AF: 评估因子; RQ 的分类标准:  $0.01 \leq RQ < 0.1$  为低风险;  $0.1 \leq RQ < 1$  中等风险;  $RQ \geq 1$  高风险。

1.5.2 数据分析

所有数据都进行同方差性检验, 并以平均值  $\pm$  标准偏差的形式表示。采用 One-Way ANOVA 方差分析方法进行组间统计学分析, 并用 Dunnett's *t* 检验法进行显著性水平分析。评估结果线性分析采用 Origin 软件进行处理, 其他数据分析在 SPSS 上完

成,  $P < 0.05$  表示具有显著性差异。

2 结果与讨论

2.1 PhACs 在水体中的赋存特征

目标物在本研究区域和世界其他区域的赋存状况见表 2, 8 种 PhACs 均被检出, 单体平均浓度范围在  $1.0 \sim 75.9\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$  之间, 总浓度范围在  $27.6 \sim 368.8\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$  之间。抗生素类 (ETM 和 ROX)、消炎类 (IPF)、降血脂类 (CA)、 $\beta$  阻滞类 (ATL)、抗抑郁类 (SER)、抗真菌类 (KTC) 和兴奋剂类 (CFI) 药物浓度范围分别为  $0.9 \sim 40.8$ 、 $3.3 \sim 89.2$ 、 $3.6 \sim 59.2$ 、 $0.2 \sim 8.0$ 、ND  $\sim 8.6$ 、ND  $\sim 5.8$ 、 $0.3 \sim 31.4$  和  $16.2 \sim 125.8\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ 。8 种 PhACs 中, ETM、ROX、CFI 和 IPF 检出浓度相对较高, 分别达到了  $40.8$ 、 $89.2$ 、 $125.8$  和  $59.2\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ 。ETM 和 ROX 都属于大环内酯类抗生素, 这是一类具有复杂大分子结构的化合物, 具有抗菌活性强、不易产生耐药性等优点, 广泛应用于人类及畜禽类的疾病治疗。Liu 等<sup>[10]</sup>对南京 5 个污水厂尾水受纳水体中 PhACs 检测发现: ETM 和 ROX 的浓度范围为  $0.7 \sim 85.3\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$  和  $0.3 \sim 66.5\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ , 与本文研究结果较为接近。CFI 作为一种重要的兴奋剂和止痛剂被大量使用, 由于在自然水体中被广泛检出, 被视为污水厂尾水排放的重要标记物质<sup>[17]</sup>。本研究中 CFI 的平均浓度范围为  $16.2 \sim 125.8\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ , 低于中国厦门市 7 个污水厂中 CFI 的赋存水平 ( $2.42 \sim 686\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ )<sup>[18]</sup>。IPF 是一种非甾体抗炎药, 既可以用于风湿类关节炎的治疗, 也可以用于减轻中轻度的发热、头痛等<sup>[19]</sup>。我国是 IPF 的生产和使用大国, 在我国自然水体中一直广泛检出。IPF 在本研究中的检出浓度范围是  $3.6 \sim 59.2\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ , 高于韩国污水处理厂中的赋存水平 (ND  $\sim 0.31\text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$ )<sup>[20]</sup>, 前期研究中发现现有污水处理工艺对 IPF 的去除率在 77%~99% 之间<sup>[21,22]</sup>。

表 2 8 种 PhACs 在研究区域水体以及其他流域中的赋存<sup>1)</sup>/ng·L<sup>-1</sup>

Table 2 Occurrence of eight PhACs in the receiving water of the study area and other watershed/ng·L<sup>-1</sup>

| 化合物 | 本研究区域           |                  | 其他水域  | 文献                   |
|-----|-----------------|------------------|-------|----------------------|
|     | 夏季              | 冬季               |       |                      |
| ETM | 6.3(0.9~15.2)   | 28.7(18.2~40.8)  | 南京地表水 | 13.0(0.7~85.3) [10]  |
| ROX | 27.3(3.3~48.6)  | 52.6(8.4~89.2)   | 南京地表水 | 19.5(0.3~66.5) [10]  |
| IPF | 26.0(3.6~56.1)  | 37.7(5.6~59.2)   | 韩国地表水 | 0.07(ND~0.31) [20]   |
| KTC | 2.1(0.3~3.7)    | 7.2(8.0~31.4)    | 南京地表水 | ND [10]              |
| CA  | 2.7(0.8~7.3)    | 3.0(0.2~8.0)     | 韩国地表水 | 0.31(ND~0.74) [20]   |
| ATL | 1.4(0.4~3.5)    | 1.5(ND~8.6)      | 印度地表水 | 0.05(ND~1.3) [23]    |
| CFI | 64.7(18.1~89.7) | 75.9(16.2~125.8) | 厦门地表水 | 143.0(2.42~686) [18] |
| SER | 1.0(0.2~2.3)    | 1.8(ND~5.8)      | 印度地表水 | 14.1(ND~59.8) [24]   |

1) 数值表述为平均值(最小~最大);ND 表示未检出

从时间分布来看,PhACs 夏季的检出浓度普遍低于冬季,其中 KTC、ETM、ROX、IPF 季节变化较为明显,4 种 PhACs 冬季的平均检出浓度比夏季分别高出 243%、356%、92.7% 和 45%,该趋势与 Jing 等<sup>[25]</sup>的研究结果吻合.相较于冬季,夏季河流水量充沛,微生物生物群落丰富度高,水流的稀释作用和生物降解可能导致了药物含量偏低,而冬季气温较低,微生物活性受到抑制,药物降解速率降低且水量偏低,再加上冬季用药量偏高,这可能是冬季药物浓度偏高的主要原因.

2.2 PhACs 的生态风险评价

生态风险是人类活动或自然变化而引起的生态系统的结构组织的改变而导致整个生态系统功能损失的可能性大小.生态风险评价是通过定量分析来预测自然界中各种风险源对生态系统造成的风险及预测生态系统可接受该风险的程度,是生态风险决策与管理的重要依据<sup>[26]</sup>.定量风险表征方法是近年来使用比较普遍的评价方法,包括风险因子法、生态系统风险表征、熵值法等.其中,风险熵值法(RQ)应用比较广泛.

根据 PhACs 在水体中的最高检出浓度和目标物对水生生物的急慢性毒理数据(表 3),本文利用

熵值法风险评估模型对目标化合物生态风险进行了评估,结果如图 1 所示.从化合物风险特征来看,在冬季 ETM 和 KTC 对绿藻产生了高生态风险,在夏季对绿藻产生中等生态风险.前人研究发现,ETM 等抗生素对多种水生生物具有慢性生态风险,其中藻类对 ETM 最为敏感,生长抑制半数效应浓度为 20 μg·L<sup>-1</sup><sup>[28]</sup>.浮萍的生长抑制实验中发现 KTC 能够显著缩短浮萍的根长并减少其叶片数和干重,其 EC<sub>50</sub>为 80~160 μg·L<sup>-1</sup><sup>[40]</sup>,藻类对抗生素等药物的敏感度远高于浮萍<sup>[41]</sup>.IPF 和 ATL 在夏、冬两季均对鱼类产生高风险,IPF 风险值在夏、冬两季分别达到 5.61 和 5.92.研究发现 IPF 能诱导鱼体内抗氧化酶活性,造成鱼体内雌性激素失调,生殖能力降低,死亡率提高<sup>[31,42]</sup>.Winter 等<sup>[43]</sup>在对黑头鲷鱼(*Pimephales promelas*)的慢性暴露中发现,ATL 长期暴露会影响黑头鲷鱼的生殖能力和胚胎发育.除此之外,ETM 和 KTC 还分别对溞类和鱼类产生中等生态风险.大型溞暴露于浓度 179 μg·L<sup>-1</sup>的 ETM 21 d,其存活率、产卵次数、每胎产卵数都受到显著抑制<sup>[44]</sup>.黑头鲷鱼 21 d 慢性暴露中发现 KTC 能够影响黑头鲷鱼类固醇的合成并降低其繁殖成功率<sup>[45]</sup>.

表 3 8 种 PhACs 对藻类、蚤类和鱼类的慢性毒性数据

Table 3 Chronic toxicity data of eight PhACs for algae, daphnia, and fish

| 化合物 | EC <sub>50</sub> 或 LC <sub>50</sub> /mg·L <sup>-1</sup> |        |       | PNEC/ng·L <sup>-1</sup> |         |           | 文献      |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|---------|-----------|---------|
|     | 绿藻                                                      | 大型蚤    | 鱼类    | 绿藻                      | 大型蚤     | 鱼类        |         |
| ETM | 0.02                                                    | 0.22   | 100   | 20                      | 220     | 1 000 000 | [27,28] |
| ROX | 4.12                                                    | 138.12 | 50.29 | 4 120                   | 138 120 | 50 290    | [29]    |
| IPF | 35                                                      | 20     | 0.001 | 350 000                 | 200 000 | 10        | [30~32] |
| KTC | 0.0005                                                  | 0.25   | 0.006 | 5                       | 2 500   | 60        | [33]    |
| CA  | 89                                                      | 40     | 86    | 89 000                  | 400 000 | 86 000    | [20,34] |
| ATL | 10                                                      | 1.48   | >10   | 100 000                 | 14 800  | >100 000  | [33]    |
| CFI | 150                                                     | 40     | 50    | 1 500 000               | 400 000 | 500 000   | [35,36] |
| SER | 13.086                                                  | 0.032  | 0.1   | 13 086                  | 320     | 1 000     | [37~39] |

从混合风险来看,冬季藻类对目标 PhACs 较为敏感,混合风险达到 8.34,其次是鱼类(6.45)和溞

类(MRQ = 0.22);夏季鱼类对目标 PhACs 最为敏感,混合风险达到 5.68,其次是藻类(1.51)和溞类






图1 8 种 PhACs 对绿藻、溞类和鱼类的风险熵及其贡献率

Fig. 1 Risk quotient and contribution rate of eight PhACs to algae, daphnia, and fish

(0.08). 整体来看, 冬季 PhACs 生态风险明显高于夏季. 从单一药物风险贡献率来看, ETM 和 KTC 是藻类 MRQ 的主要贡献者, 二者贡献率之和达到 99%; 同时 ETM 还是溞类 MRQ 的主要贡献者, 贡献率达到 85% 以上; 而鱼类 MRQ 的主要贡献者为 IPF, 贡献率达到 92% 以上. 在江汉平原、珠江三角洲和黄河三角洲也发现相似的现象, ETM 的混合风险贡献率达到 60% 以上<sup>[46]</sup>, 这说明混合风险 MRQ 值的大小与污染物的总浓度没有必然联系, 总体风险熵值可能由一小部分高风险污染物来主导.

### 2.3 混合 PhACs 对大型溞的生长、生殖影响

8 种 PhACs 混合暴露对大型溞生殖、生长和发育影响见表 4. 整个暴露期间所有暴露组大型溞死

亡率低于 10%, 清水对照组与溶剂对照组无明显差异, 下文讨论中以溶剂对照组作为参照.

生殖能力作为测试污染物对生物损伤程度的一个指标, 已经逐渐在各项研究中得到应用<sup>[47]</sup>. 本文通过对大型溞性成熟时间和生殖能力等生殖特征的研究, 分析混合 PhACs 对大型溞生殖健康的影响. 表 4 显示, EC-PhACs 和 100 EC-PhACs 两个实验组 21 d 暴露并未对大型溞的首胎产卵时间产生显著性影响 ( $P > 0.05$ ), 有研究表明 IPF 在 14 d 慢性暴露下会延缓大型溞的首胎产卵时间,  $EC_{50}$  为  $13.4 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ <sup>[30]</sup>. 从生殖能力来看, EC-PhACs 和 100 EC-PhACs 两个实验组都显著提高了每胎平均产卵数和 21 d 产卵总数 ( $P < 0.05$ ). 但相对于环境浓度组

EC-PhACs, 100 倍环境浓度 PhACs 对大型溞生殖能力的诱导作用显著降低, 呈现低浓度刺激效应。前人研究结果表明, 由于大型溞低浓度药物暴露压力下的过度补偿机制,  $36 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$  氟西汀能显著诱导大型溞的繁殖能力, 而与 CA、ETM 等药物的联合作用更加复杂, 无法用单一污染物作用机制预测<sup>[48]</sup>。IPF 对大型溞 14 d 的慢性暴露实验中, 当暴露浓度达到

$20 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$  时, 大型溞的产卵总数显著下降, 达到  $80 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$  时不再产卵<sup>[30]</sup>。本文的暴露浓度在  $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1} \sim \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$  的范围内, 接近环境浓度, 在这种低剂量暴露下可能引起大型溞对环境压力的过度补偿, 造成繁殖力增强。Fuertes 等<sup>[49]</sup> 的研究发现卡马西平、安定和普萘洛尔等药物在环境浓度下能显著提升大型溞生殖能力, 且三者混合暴露呈现浓度相加效应。

表 4 混合 PhACs 对大型溞生殖和生长指标的影响<sup>1)</sup>

Table 4 Influence of mixed PhACs on reproductive and development index of *Daphnia magna*

| 测试指标                                   | 实验暴露组               |                       |                       |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | 对照组                 | EC-PhACs              | 100 EC-PhACs          |
| 首胎产卵时间/d                               | $6.31 \pm 0.46$     | $6.31 \pm 0.46$       | $6.35 \pm 0.59$       |
| 每胎平均产卵数/个                              | $11.6 \pm 2.3$      | $15.1 \pm 3.3^*$      | $14.9 \pm 2.5^*$      |
| 21 d 产卵总数/个                            | $113.8 \pm 31.7$    | $178.4 \pm 34.9^*$    | $152.6 \pm 36.7$      |
| 游泳速度/ $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$     | $0.0066 \pm 0.0013$ | $0.0089 \pm 0.0055^*$ | $0.0082 \pm 0.0046^*$ |
| 游泳加速度/ $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$    | $0.09 \pm 0.01$     | $0.14 \pm 0.07^*$     | $0.10 \pm 0.04$       |
| 胸枝跳动频率/ $\text{次}\cdot\text{min}^{-1}$ | $463.8 \pm 6.1$     | $438.0 \pm 16.4$      | $355.8 \pm 11.6^*$    |
| 心脏跳动频率/ $\text{次}\cdot\text{min}^{-1}$ | $553.8 \pm 5.0$     | $546.0 \pm 7.1$       | $450.8 \pm 2.9^*$     |

1) \* 表示与对照组差异性显著,  $P < 0.05$

大型溞的游泳行为的变化受到其生理、感知、神经和肌肉系统等多方面的影响<sup>[47, 50]</sup>, 监测大型溞的游泳速度、加速度等生态行为是评价污染物生态毒理效应的有效手段。表 4 显示, EC-PhACs 和 100 EC-PhACs 两个暴露组都显著提高了大型溞的游泳速度 ( $P < 0.05$ ), EC-PhACs 显著提高了大型溞的游泳加速度 ( $P < 0.05$ )。现有研究表明, 污染物能够改变大型溞游泳活性, 污染物单独暴露多抑制大型溞活动能力, 而混合暴露造成的抑制率往往偏低。部分污染物也能诱导大型溞游泳速度加快, 如氨基甲酸酯、三氯蔗糖和兴奋剂等<sup>[50]</sup>。CFI 是一种神经系统兴奋剂, 它通过增加神经递质多巴胺的产生和释放提高大型溞的心率<sup>[51]</sup>, 而心率的增加可能会刺激大型溞的神经、肌肉, 导致游泳活性的变化。

大型溞的心率、胸枝活动等生理指标被证实与生物的摄食、呼吸和代谢速率密切相关<sup>[50]</sup>, 在各项研究中经常使用这两项指标来评价各类污染物对大型溞的不利影响<sup>[52]</sup>。从表 4 可以看出 100 EC-PhACs 暴露组显著抑制了大型溞的胸枝跳动和心脏跳动频次。急性毒理学研究表明  $\beta$ -阻滞剂 (阿替洛尔、美托洛尔和普萘洛尔) 对大型溞的心率和胸枝跳动都有明显的抑制作用, 且药物浓度越高, 抑制越明显<sup>[52]</sup>。心率和胸枝跳动降低会造成血液流动减缓、摄食不足, 从而进一步影响大型溞营养物质和气体交换<sup>[15]</sup>。

### 3 结论

(1) 8 种 PhACs 均有检出, 其中 ETM、ROX、IPF 和 CFI 这 4 种药物检出浓度相对较高, 分别在 0.9

$\sim 40.8$ 、 $3.3 \sim 89.2$ 、 $3.6 \sim 59.2$  和  $16.2 \sim 125.8 \text{ ng}\cdot\text{L}^{-1}$  范围内。

(2) 从混合风险来看, 冬季 PhACs 生态风险明显高于夏季。冬季水生生物对 PhACs 的敏感度从高到低依次是藻类 > 鱼类 > 溞类, 而夏季为鱼类 > 藻类 > 溞类; 混合风险贡献率较高的 3 种 PhACs 为 ETM、KTC 和 IPF, KTC、ETM 和 IPF 对藻类、溞类和鱼类的混合风险贡献率分别达到 49%、85% 和 92% 以上。

(3) 8 种 PhACs 混合暴露能够改变大型溞的生殖、生理指标, 显著提高了大型溞生殖能力和游泳活性, 降低心率和胸枝跳动。

#### 参考文献:

- [1] Gurung K, Neibi M C, Thangaraj S K, et al. Removal of pharmaceutically active compounds (PhACs) from real membrane bioreactor (MBR) effluents by photocatalytic degradation using composite  $\text{Ag}_2\text{O}/\text{P-25}$  photocatalyst [J]. Separation and Purification Technology, 2019, **215**: 317-328.
- [2] Zhang Y J, Geißen S U, Gal C. Carbamazepine and diclofenac: removal in wastewater treatment plants and occurrence in water bodies [J]. Chemosphere, 2008, **73**(8): 1151-1161.
- [3] Gimeno O, García-araya J F, Beltrán F J, et al. Removal of emerging contaminants from a primary effluent of municipal wastewater by means of sequential biological degradation-solar photocatalytic oxidation processes [J]. Chemical Engineering Journal, 2016, **290**: 12-20.
- [4] Omar T F T, Aris A Z, Yusoff F M, et al. Risk assessment of pharmaceutically active compounds (PhACs) in the Klang River estuary, Malaysia [J]. Environmental Geochemistry and Health, 2019, **41**(1): 211-223.
- [5] 封梦娟, 张芹, 宋宁慧, 等. 长江南京段水源水中抗生素的赋存特征与风险评估 [J]. 环境科学, 2019, **40**(12): 5286-5293.

Feng M J, Zhang Q, Song N H, et al. Occurrence characteristics



- and risk assessment of antibiotics in source water of the Nanjing reach of the Yangtze River[J]. *Environmental Science*, 2019, **40**(12): 5286-5293.
- [6] 武旭跃, 邹华, 朱荣, 等. 太湖贡湖湾水域抗生素污染特征分析与生态风险评价[J]. *环境科学*, 2016, **37**(12): 4596-4604.
- Wu X Y, Zou H, Zhu R, *et al.* Occurrence, distribution and ecological risk of antibiotics in surface water of the Gonghu Bay, Taihu Lake[J]. *Environmental Science*, 2016, **37**(12): 4596-4604.
- [7] Kleywegt S, Payne M, Ng F, *et al.* Environmental loadings of active pharmaceutical ingredients from manufacturing facilities in Canada[J]. *Science of the Total Environment*, 2019, **646**: 257-264.
- [8] Liu J C, Dan X X, Lu G H, *et al.* Investigation of pharmaceutically active compounds in an urban receiving water: Occurrence, fate and environmental risk assessment [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2018, **154**: 214-220.
- [9] Liu J C, Lu G H, Zhang Z H, *et al.* Biological effects and bioaccumulation of pharmaceutically active compounds in crucian carp caged near the outfall of a sewage treatment plant [J]. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 2015, **17**(1): 54-61.
- [10] Liu J C, Lu G H, Xie Z X, *et al.* Occurrence, bioaccumulation and risk assessment of lipophilic pharmaceutically active compounds in the downstream rivers of sewage treatment plants [J]. *Science of the Total Environment*, 2015, **511**: 54-62.
- [11] Biel-Maeso M, Baena-Nogueras R M, Corada-Fernández C, *et al.* Occurrence, distribution and environmental risk of pharmaceutically active compounds (PhACs) in coastal and ocean waters from the Gulf of Cadiz (SW Spain) [J]. *Science of the Total Environment*, 2018, **612**: 649-659.
- [12] Costa F, Lago A, Rocha V, *et al.* A review on biological processes for pharmaceuticals wastes abatement—a growing threat to modern society [J]. *Environmental Science & Technology*, 2019, **53**(13): 7185-7202.
- [13] Bang S H, Ahn J Y, Hong N H, *et al.* Acute and chronic toxicity assessment and the gene expression of *Dhb*, *Vig*, *Arnt*, *CYP<sub>4</sub>*, and *CYP<sub>314</sub>* in *Daphnia magna* exposed to pharmaceuticals[J]. *Molecular & Cellular Toxicology*, 2015, **11**(2): 153-160.
- [14] OECD. Test No. 211. *Daphnia magna* reproduction test [A]. In: OECD (Ed.). *Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2* [M]. Population, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2012. 202.
- [15] Liu J C, Shen J, Lu G H, *et al.* Multilevel ecotoxicity assessment of environmentally relevant bisphenol F concentrations in *Daphnia magna* [J]. *Chemosphere*, 2020, **240**: 124917.
- [16] Riva F, Zuccato E, Davoli E, *et al.* Risk assessment of a mixture of emerging contaminants in surface water in a highly urbanized area in Italy [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2019, **361**: 103-110.
- [17] Caldas S S, Arias J L O, Rombaldi C, *et al.* Occurrence of pesticides and PPCPs in surface and drinking water in Southern Brazil: data on 4-Year Monitoring [J]. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 2019, **30**(1): 71-80.
- [18] Wang Y W, Li Y, Hu A Y, *et al.* Monitoring, mass balance and fate of pharmaceuticals and personal care products in seven wastewater treatment plants in Xiamen City, China [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2018, **354**: 81-90.
- [19] Davarnejad R, Soofi B, Farghadani F, *et al.* Ibuprofen removal from a medicinal effluent: A review on the various techniques for medicinal effluents treatment [J]. *Environmental Technology & Innovation*, 2018, **11**: 308-320.
- [20] Han G H, Hur H G, Kim S D. Ecotoxicological risk of pharmaceuticals from wastewater treatment plants in Korea: occurrence and toxicity to *Daphnia magna* [J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2006, **25**(1): 265-271.
- [21] Clara M, Strenn B, Gans O, *et al.* Removal of selected pharmaceuticals, fragrances and endocrine disrupting compounds in a membrane bioreactor and conventional wastewater treatment plants [J]. *Water Research*, 2005, **39**(19): 4797-4807.
- [22] Castiglioni S, Bagnati R, Fanelli R, *et al.* Removal of pharmaceuticals in sewage treatment plants in Italy [J]. *Environmental Science & Technology*, 2006, **40**(1): 357-363.
- [23] Sharma B M, Bečanová J, Scheringer M, *et al.* Health and ecological risk assessment of emerging contaminants (pharmaceuticals, personal care products, and artificial sweeteners) in surface and groundwater (drinking water) in the Ganges River Basin, India [J]. *Science of the Total Environment*, 2019, **646**: 1459-1467.
- [24] Subedi B, Balakrishna K, Sinha R K, *et al.* Mass loading and removal of pharmaceuticals and personal care products, including psychoactive and illicit drugs and artificial sweeteners, in five sewage treatment plants in India [J]. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 2015, **3**(4): 2882-2891.
- [25] Jiang L, Hu X L, Yin D Q, *et al.* Occurrence, distribution and seasonal variation of antibiotics in the Huangpu River, Shanghai, China [J]. *Chemosphere*, 2011, **82**(6): 822-828.
- [26] Zhao X M, Yao L A, Ma Q L, *et al.* Distribution and ecological risk assessment of cadmium in water and sediment in Longjiang River, China: Implication on water quality management after pollution accident [J]. *Chemosphere*, 2018, **194**: 107-116.
- [27] Ji K, Kim S, Han S, *et al.* Risk assessment of chlortetracycline, oxytetracycline, sulfamethazine, sulfathiazole, and erythromycin in aquatic environment: are the current environmental concentrations safe? [J]. *Ecotoxicology*, 2012, **21**(7): 2031-2050.
- [28] Isidori M, Lavorgna M, Nardelli A, *et al.* Toxic and genotoxic evaluation of six antibiotics on non-target organisms [J]. *Science of the Total Environment*, 2005, **346**(1-3): 87-98.
- [29] Lee Y J, Lee S E, Lee D S, *et al.* Risk assessment of human antibiotics in Korean aquatic environment [J]. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 2008, **26**(2): 216-221.
- [30] Heckmann L H, Callaghan A, Hooper H L, *et al.* Chronic toxicity of ibuprofen to *Daphnia magna*: effects on life history traits and population dynamics [J]. *Toxicology Letters*, 2007, **172**(3): 137-145.
- [31] Han S, Choi K, Kim J, *et al.* Endocrine disruption and consequences of chronic exposure to ibuprofen in Japanese medaka (*Oryzias latipes*) and freshwater cladocerans *Daphnia magna* and *Moina macrocopa* [J]. *Aquatic Toxicology*, 2010, **98**(3): 256-264.
- [32] Geiger E, Hornek-Gausterer R, Sacan M T. Single and mixture toxicity of pharmaceuticals and chlorophenols to freshwater algae *Chlorella vulgaris* [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2016, **129**: 189-198.
- [33] Vestel J, Caldwell D J, Constantine L, *et al.* Use of acute and chronic ecotoxicity data in environmental risk assessment of pharmaceuticals [J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2016, **35**(5): 1201-1212.
- [34] Henschel K P, Wenzel A, Diedrich M, *et al.* Environmental

- hazard assessment of pharmaceuticals[J]. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 1997, **25**(3): 220-225.
- [35] Moore M T, Greenway S L, Farris J L, *et al.* Assessing caffeine as an emerging environmental concern using conventional approaches[J]. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 2008, **54**(1): 31-35.
- [36] Zarrelli A, DellaGreca M, Iesce M R, *et al.* Ecotoxicological evaluation of caffeine and its derivatives from a simulated chlorination step[J]. *Science of the Total Environment*, 2014, **470-471**: 453-458.
- [37] Johnson D J, Sanderson H, Brain R A, *et al.* Toxicity and hazard of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants fluoxetine, fluvoxamine, and sertraline to algae [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2007, **67**(1): 128-139.
- [38] Santos L H M L M, Araújo A N, Fachini A, *et al.* Ecotoxicological aspects related to the presence of pharmaceuticals in the aquatic environment [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2010, **175**(1-3): 45-95.
- [39] Furberg A. Environmental risk assessment of pharmaceutical exposure to fish in the swedish göta Älv River[D]. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2014. 9.
- [40] Haebe M, Bláha L. Comparison of different endpoints responses in aquatic plant *Lemna minor* exposed to ketoconazole [J]. *Egyptian Journal of Natural Toxins*, 2011, **8**(1-2): 49-57.
- [41] Tripathi R D, Chandra P. Chromium uptake by *Spirodela polyrrhiza* (L.) schleiden in relation to metal chelators and pH [J]. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 1991, **47**(5): 764-769.
- [42] Bartoskova M, Dobsikova R, Stancova V, *et al.* Evaluation of ibuprofen toxicity for zebrafish (*Danio rerio*) targeting on selected biomarkers of oxidative stress[J]. *Neuro Endocrinology Letters*, 2013, **34**(S2): 102-108.
- [43] Winter M J, Lillicrap A D, Caunter J E, *et al.* Defining the chronic impacts of atenolol on embryo-larval development and reproduction in the fathead minnow (*Pimephales promelas*) [J]. *Aquatic Toxicology*, 2008, **86**(3): 361-369.
- [44] Meinertz J R, Schreier T M, Bernardy J A. Chronic toxicity of erythromycin thiocyanate to *Daphnia magna* in a flow-through, continuous exposure test system [J]. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 2011, **87**(6): 621-625.
- [45] Ankley G T, Jensen K M, Kahl M D, *et al.* Ketoconazole in the fathead minnow (*Pimephales promelas*): reproductive toxicity and biological compensation [J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2007, **26**(6): 1214-1223.
- [46] 刘昔, 王智, 王学雷, 等. 我国典型区域地表水环境中抗生素污染现状及其生态风险评价[J]. *环境科学*, 2019, **40**(5): 2094-2100.
- Liu X, Wang Z, Wang X L, *et al.* Status of antibiotic contamination and ecological risks assessment of several typical Chinese surface-water environments[J]. *Environmental Science*, 2019, **40**(5): 2094-2100.
- [47] Liu Y H, Yan Z Y, Zhang L, *et al.* Food up-take and reproduction performance of *Daphnia magna* under the exposure of Bisphenols [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019, **170**: 47-54.
- [48] Flaherty C M, Dodson S I. Effects of pharmaceuticals on *Daphnia* survival, growth, and reproduction[J]. *Chemosphere*, 2005, **61**(2): 200-207.
- [49] Fuertes I, Campos B, Rivetti C, *et al.* Effects of single and combined low concentrations of neuroactive drugs on *Daphnia magna* reproduction and transcriptomic responses [J]. *Environmental Science & Technology*, 2019, **53**(20): 11979-11987.
- [50] Bownik A. *Daphnia* swimming behaviour as a biomarker in toxicity assessment: a review [J]. *Science of the Total Environment*, 2017, **601-602**: 194-205.
- [51] Jeong T Y, Yoon D, Kim S, *et al.* Mode of action characterization for adverse effect of propranolol in *Daphnia magna* based on behavior and physiology monitoring and metabolite profiling [J]. *Environmental Pollution*, 2018, **233**: 99-108.
- [52] Dzialowski E M, Turner P K, Brooks B W. Physiological and reproductive effects of beta adrenergic receptor antagonists in *Daphnia magna* [J]. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 2006, **50**(4): 503-510.



## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Comparison of Three Receptor Models for Source Apportionment of PM <sub>2.5</sub> in Shanghai: Using Hourly Resolved PM <sub>2.5</sub> Chemical Composition Data                               | ZHOU Min (1997)                                                      |
| Impact of Differents in the Concentrations of Ozone on the Chemical Composition of Single Particles                                                                                            | WU Meng-xi, CHENG Chun-lei, HUANG Bo, <i>et al.</i> (2006)           |
| Influence of Secondary Organic Coating on Hygroscopicity of a Sodium Chloride Core: Based on Micro-scale Single Particle Analysis                                                              | ZHANG Shu-jia, XU Liang, GUO Xin-mei, <i>et al.</i> (2017)           |
| Comparative Analysis of Pollution Characteristics of Carbonaceous Aerosol Components in the Atmosphere Between Urban and Suburban Areas                                                        | LI Xin-yue, ZHANG Kai-shan, DENG Lin-li, <i>et al.</i> (2026)        |
| Distribution Characteristics and Source Apportionment of Elements Bonded with PM <sub>2.5</sub> and PM <sub>10</sub> in Linyi                                                                  | LU Ping, ZHAO Xue-yan, YIN Bao-hui, <i>et al.</i> (2036)             |
| Characteristics and Sources of Microbial Aerosols in Urban and Mountainous Areas in Autumn and Winter in Xi'an, China                                                                          | XIE Wen-wen, LU Rui, MU Fei-fei, <i>et al.</i> (2044)                |
| Pollution Characteristics of Cooking Fumes, Particulates, and Non-methane Hydrocarbons in the Exhaust of Typical Beijing Restaurants                                                           | HE Wan-qing, WANG Tian-yi, SHAO Xia, <i>et al.</i> (2050)            |
| PM <sub>2.5</sub> Concentration Influencing Factors in China Based on the Random Forest Model                                                                                                  | XIA Xiao-sheng, CHEN Jing-jing, WANG Jia-jia, <i>et al.</i> (2057)   |
| Spatio-temporal Variation of PM <sub>2.5</sub> Related Relationships in China from the Perspective of Air Pollution Regional Linkage Control and Prevention                                    | YANG Wen-tao, HUANG Hui-kun, WEI Dong-sheng, <i>et al.</i> (2066)    |
| Characteristics of Spatial and Temporal Evolution and Investigation of Air Pollution in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Based on Ground-Space Observation Data                      | WANG Yao-ting, LIANG Jia-cheng, ZHENG Zuo-fang, <i>et al.</i> (2075) |
| Hydrochemical Characteristics and Formation Causes of Ground Karst Water Systems in the Longzici Spring Catchment                                                                              | TANG Chun-lei, ZHENG Xiu-qing, LIANG Yong-ping (2087)                |
| Tempo-spatial and Retention Analysis of Total Phosphorus in the Three Gorges Reservoir                                                                                                         | TANG Xiao-ya, TONG Si-chen, HUANG Guo-xian, <i>et al.</i> (2096)     |
| Vertical Distribution Characteristics of Dissolved Oxygen and Chlorophyll a in Typical Tributaries During the Impoundment Period of the Three Gorges Reservoir                                 | YANG Fan, JI Dao-bin, WANG Li-jing, <i>et al.</i> (2107)             |
| Spatial-temporal Distribution of Nutrients in Hanfeng Lake After Official Operation                                                                                                            | FU Shi, NI Jiu-pai, HE Bing-hui, <i>et al.</i> (2116)                |
| Spatio-temporal Variations in the Characteristics of Water Eutrophication and Sediment Pollution in Baiyangdian Lake                                                                           | LIU Xin, SHI Bin, MENG Jing, <i>et al.</i> (2127)                    |
| Spatial-temporal Distribution of Suspended Solids and Its Sedimentation Flux and Nutrients Effects in Xin'anjiang Reservoir, China                                                             | SHI Peng-cheng, ZHU Guang-wei, YANG Wen-bin, <i>et al.</i> (2137)    |
| Bioavailability Characteristics of Chromophoric Dissolved Organic Matter in Lake Gaoyou, Lake Nansi, and Lake Dongping Under Different Hydrological Scenarios                                  | ZHANG Liu-qing, SHI Yu, LI Yuan-peng, <i>et al.</i> (2149)           |
| Succession Characteristics of Algae Functional Groups and Water Quality Assessment in a Drinking Water Reservoir                                                                               | LI Yan-qing, HUANG Ting-lin, ZHANG Hai-han, <i>et al.</i> (2158)     |
| Effect of Artificial Mixing on Temporal and Spatial Succession of Algae Community Structure in Jinpen Reservoir                                                                                | WANG Chen-xu, HUANG Ting-lin, LI Nan, <i>et al.</i> (2166)           |
| Spatial Distribution Characteristics and Driving Factors of Aerobic Denitrification Bacterial Community Structure from Baiyangdian Lake in Xiong'an New Area During the Winter Freezing Period | ZHOU Shi-lei, SUN Yue, YUE Ge-cheng, <i>et al.</i> (2177)            |
| Spatial and Temporal Succession Characteristics of Aerobic Anoxygenic Photosynthesis Bacteria in a Stratified Reservoir                                                                        | ZHANG Hai-han, WANG Yan, HUANG Ting-lin, <i>et al.</i> (2188)        |
| Response of Chromophoric Dissolved Organic Matter Dynamics to Different Hydrological Scenarios in the Two Largest Freshwater Lakes Connected to the Yangtze River                              | GUO Yan-mi, LI Yuan-peng, SHI Yu, <i>et al.</i> (2198)               |
| Distribution Characteristics and Influencing Factors of Chromophoric Dissolved Organic Matter in a Northern-Side River of the Qinling Mountains in Summer                                      | LIN Zi-shen, HUANG Ting-lin, YANG Shang-ye, <i>et al.</i> (2210)     |
| Distribution, Sources, and Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Tributary Waters of the Lower Reaches of the Yangtze River, China                                     | JIA Tian-qi, LEI Rong-rong, WU Xiao-lin, <i>et al.</i> (2221)        |
| Temporal and Spatial Occurrence of NSAIDs in Taihu Lake and Relevant Risk Assessment                                                                                                           | LIAN Jie, LI Yi-fei, WANG Xiao-xuan, <i>et al.</i> (2229)            |
| Occurrence and Ecological Risk of Eight Typical PhACs in Surface Water and Its Impact on <i>Daphnia magna</i>                                                                                  | XU Xin-lei, LIU Jian-chao, LU Guang-hua (2239)                       |
| Distribution Characteristics and Migration Rules of Pollutants in Sediments of Reservoirs with <i>Eucalyptus</i> Plantation, Southern China                                                    | ZHU Ya, LI Yi-ping, LUO Fan, <i>et al.</i> (2247)                    |
| Mechanism of Urban Black Odorous Water Based on Continuous Monitoring: A Case Study of the Erkeng Stream in Nanning                                                                            | LI Yong-xin, WANG Wei, HE Mei, <i>et al.</i> (2257)                  |
| Relationship Between Source-Sink Landscape Pattern and Antibiotics in Surface Water in Peri-urban Watershed                                                                                    | LI Min, TANG Jian-feng, CHEN Li-ding, <i>et al.</i> (2264)           |
| Molecular Chemo-diversity of the Dissolved Organic Matter Occurring in Urban Stormwater Runoff                                                                                                 | NIE Yun-han, CHEN Hao, LI Lei, <i>et al.</i> (2272)                  |
| Regulating Effect and Mechanism of Calcite/Chlorapatite Mixture Addition on Transformation and Transport of Phosphorus in Sediments                                                            | BAI Xiao-yun, LIN Jian-wei, ZHAN Yan-hui, <i>et al.</i> (2281)       |
| Stability of Ferrihydrite and Goethite Nanoparticles Under Different Environmental Conditions                                                                                                  | WANG Zhi-qiao, MA Jie, CHEN Ya-li, <i>et al.</i> (2292)              |
| Sunflower-Staw-Derived Biochar-Enhanced Fe(III)/S <sub>2</sub> O <sub>8</sub> <sup>2-</sup> System for Degradation of Benzoic Acid                                                             | SUN Peng, ZHANG Kai-kai, ZHANG Yu, <i>et al.</i> (2301)              |
| Non-activated Peroxymonosulfate-Induced Degradation of Sulfasalazine: Kinetics and Mechanism Investigations                                                                                    | DING Xi, ZHANG Xue-wei, ZHOU Run-sheng, <i>et al.</i> (2310)         |
| Pollution Characteristics and Removal Effects of Antibiotics in Wastewater from Large-Scale Pig Farms in Guizhou                                                                               | YANG Zhao, LI Jiang, XIANG Fu-liang, <i>et al.</i> (2320)            |
| Nitrogen Removal in Low-C/N Rural Sewage Treatment by Anoxic/Oxic Biofilter Packed with New Types of Fillers                                                                                   | ZHAO Yuan-zhe, YANG Yong-zhe, WANG Hai-yan, <i>et al.</i> (2329)     |
| Nitrogen Removal Performance and Nitrogen/Carbon Balance of Oligotrophic Aerobic Denitrifiers                                                                                                  | WEN Gang, WANG Tong, HUANG Ting-lin, <i>et al.</i> (2339)            |
| Bacterial Community Shifts and Nitrogen Removal Characteristics for a SNAD Process Treating Anaerobic Digester Liquor of Swine Wastewater (ADLSW) in a Continuous-Flow Biofilm Reactor (CFBR)  | QIN Jia-wei, XIN Xin, LU Hang, <i>et al.</i> (2349)                  |
| Characteristics of ANAMMOX Granular Sludge and Differences in Microbial Community Structure Under Different Culture Conditions                                                                 | JIANG Ying, GUO Meng-lei, XIE Jun-xiang, <i>et al.</i> (2358)        |
| Start-up of an Integrated Process of Denitrifying Phosphorus Removal Coupled with Partial Nitrification and Anaerobic Ammonium Oxidation                                                       | CHEN Ya, YIN Wen, ZHANG Xing-xing, <i>et al.</i> (2367)              |
| Construction and Application of an Evaluation System for Soil Environmental Carrying Capacity                                                                                                  | LI Xiao-nuo, DING Shou-kang, CHEN Wei-ping, <i>et al.</i> (2373)     |
| Synthesis of Magnetic Biochar and Its Application in the Remediation of Heavy-Metal-Contaminated Soils                                                                                         | WANG Jun-nan, CHENG Shan-shan, ZHAN Wen-hao, <i>et al.</i> (2381)    |
| Remediation of Heavy-Metal-Contaminated Soil by EDTA Washing Enhanced with Reduction Solubilization                                                                                            | ZHANG Jin-yong, ZHU Yu-ting, WANG Ming-xin, <i>et al.</i> (2390)     |
| Toxicity of Chromium to Root Growth of Barley as Affected by Chromium Speciation and Soil Properties                                                                                           | FU Ping-nan, GONG Xiao-fei, LUO Li-yun, <i>et al.</i> (2398)         |
| Effect of Fertilizer Reduction and Biochar Application on Soil Nitrogen Loss in Purple Upland                                                                                                  | WANG Shu, WANG Zi-fang, LONG Yi, <i>et al.</i> (2406)                |
| Relationship Between the Composition of Soil Aggregates and the Distribution of Organic Carbon Under Long-Term Abandoned Restoration                                                           | WANG Xing, ZHONG Ze-kun, ZHANG Xin-yi, <i>et al.</i> (2416)          |
| Effects of Biochar Application on Soil Microbial Nutrient Limitations and Carbon Use Efficiency in Lou Soil                                                                                    | WANG Qiang, GENG Zeng-chao, XU Chen-yang, <i>et al.</i> (2425)       |
| N <sub>2</sub> O Emissions from Tea Plantations with Sorghum Intercropping and Application of Big Urea Pills                                                                                   | ZHANG Ke-bin, LIU Xin-liang, KANG Man, <i>et al.</i> (2434)          |
| Effects of Different Forest Vegetation Types on Soil Nitrogen-Related Microbial Communities and Functions in Jinyun Mountain                                                                   | WANG Ying-yang, WANG Fu-hua, LUO Dong-hai, <i>et al.</i> (2445)      |
| Nitrous Oxide Emission and Denitrifying Bacterial Communities as Affected by Drip Irrigation with Saline Water in Cotton Fields                                                                | GUO Hui-nan, MA Li-juan, HUANG Zhi-jie, <i>et al.</i> (2455)         |
| Effect of Organic Matter Promotion on Nitrogen-Cycling Genes and Functional Microorganisms in Acidic Red Soils                                                                                 | CHU Cheng, WU Zhao-yue, HUANG Qian-ru, <i>et al.</i> (2468)          |
| Effects of Simulated Acid Rain on Soil Fungi Diversity in the Transition Zone of Moso Bamboo and Broadleaf Forest                                                                              | WANG Nan, PAN Xiao-cheng, WANG Chuan-kuan, <i>et al.</i> (2476)      |
| Differences Between DNA- and RNA-Based Bacterial Communities in Marine Sediments                                                                                                               | LI Ming-yue, YANG Yu-hong, MI Tie-zhu, <i>et al.</i> (2485)          |
| Spatial Patterns and Spatial Autocorrelations of Wetland Changes in China During 2003-2013                                                                                                     | ZHOU Ting, MA Jiao-jiao, XU Song-jun (2496)                          |